

Hain 3776

Goff K 15

Klebe 573,3 (m. EDr. v. Rhasis, fol. 33 vo. - 34 vo.)

Essling-I, 2, no. 588

Sander 3746

IGI 5239

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland



314 x 212 mm: noch breitrand, als das Domi-Ec.
aid. Messe 1964 (312 x 207)
BMC. V, 351 (284 x 174)

4.9716

24/12

Bl. e 3+4 doppelt
e 2+5 fehlen (Text)

ARISTOTILE

IPOCRATE

GALIE NO

AVICENNA

ALIBABATE

RASIS

MESVE

AVER

PETRVS
DE
MONTAGNANA

CAIVS DE
PLINI NATV
VS RALI
r t

CONCILIATOR
ISA AHC

APESO AR




Fasciculus medicine: Similitudo complexionum & ele- mentorum.

Sanguineus

Natura pingues isti sunt atq; io-
cates. Mores rumbros cupiunt au-
dire frequenter. Hoc ven⁹ & bacch⁹
delectat ferula risus. Et facit hos
plares & dulcia verba loquentes.
Dibus hi studiis abiles sunt & ma-
gis apti. Qualibet ex ca nec hos le-
uiter mouet ira. Largus amas pla-
ris ridet rubeiq; coloris. Lantans
carnosus satis audax atq; benign⁹

Colericus.

Est humor colere que conuenit ipe-
ruosis. Hoc genus est boium cupi-
ens precellere cunctos. Non leuiter di-
scunt necnon multum cito cresunt.
Inde magnanimi sunt necnon largi
iunima perentes. Iratus fallax ira-
scens prodigus audax. Astutus gra-
tilis fucus croceiq; coloris.



Flegmaticus

Slegma vires medicas tribuit la-
talq; breues. Slegma facit pin-
gues sanguis recedit mediocres.
Quia non studio tradunt sed cor-
pora semino. Sensus ebes tardus
motus pigritia senilis. Sic so-
nolentus piger in spumam mul-
tis.

Melanolicus

Restat adhuc tristis color substan-
tie nigre. Que reddat paruos tri-
stes semper alta loquentes. Et i vi-
gilant fucio recedens est redita
semno. Sicut et fucio. Et i nil
reputant ore graui. Non apers
fraudis timidus luteiq; coloris. In-
uides & tristis cupidus detrectus
senacis.

Incipit fasciculus medicine composuit p excellen-
tissimuz artium ac medicine doctorem: dominuz
Joannem de Ketbam Alamanum: tractans de ano-
thomia ⁊ diuersis infirmitatibus: ⁊ corporis huma-
nici: cui appneuntur multi alij tractatus per diuersos
excellētissimos doctores composui. Necnon ano-
thomia Mundini.

Et primo de expositione colorum in vrinis: Dein
de de eorundem iudicijs.



Vrina est colamentuz
sanguinis ⁊ est dua-
rum rerum significati-
ua pproprie: aut enini
significat passionem
epatis ⁊ venaruz aut
vesice aut renuz. Alia-
rum rerum est imp-
prie significatura. S-
in vrina consideran-
da sunt diuersa scilicet
substantia: color: ⁊ re-
giones: ⁊ contenta.

Aliud est causa substantie: aliud causa coloris: aliud
causa sediminis. Cum enim in humano corpore
sunt quatuor qualitates. scilicet caliditas: frigiditas: siccitas:
⁊ humiditas. Due. n. harum. scilicet caliditas ⁊ frigi-
ditas sunt cause coloris. Siccitas ⁊ humiditas sunt
cause substantie. Sciendum enim est qd vrina in
quatuor partes diuidit. Superior pars est circulus.
Secunda est corpus eius. Tertia perforatio. Quar-
ta fundus per circulum egritudo capitis ⁊ cerebri p
corpus eius egritudo spūalium mēbrorum ⁊ stoma-
chi per pforationem epatis ⁊ splenis per fundum re-
num ⁊ matricis ⁊ inferiorum mēbroz accidentia iu-
dicamus. Item in vrina sunt tres regiones. scilicet infima
media ⁊ suprema. Infima incipit a fundo vrina-
lis ⁊ durat per spacium duoz digitorum. Media re-
gio incipit vbi terminatur infima ⁊ durat vsqz ad cir-
culum: qd circulus est in summa regione ⁊ quando
in ista summa regione est spuma: significat ventositatē
ebullientē in vis vinalibus vel inflationē seu aliud
viciū pulmonis. Circulus vero grossus signifi-
cat nimiam repletionem in capite ⁊ dolorem ⁊ quan-
do in circulo sunt quasi grana alba signū reumatis
indigesti ⁊ oppilationis in epate in regione media.
Et si fila volitantia albi coloris: tunc est signū mor-
tale. Sed si ibi quedam nebula est in sanis malum.
Sed in febricitantibus si nebula sit diuulsa signifi-
cat principium digestionis materie morbi ⁊ si fuerit
vnita tunc significat plenam digestionem completā
⁊ cursum laudabilem ⁊ salutem. In infima regione
sunt alij lapilli arenosi: ⁊ tunc denotat qd patiens est
calculosus. Et si sedimen est nigrum: ⁊ tunc nisi fue-
rit per talem vrinam expulsio materie venenose si-
gnū est mortis.



Vrina rufa significat sanitatem ⁊ bo-
nam digestionē corporis humani.
Urina subrufa sanitatem signifi-
cat: sed non ita perfectam sicut omni-
no rufa. Urina citrina quando
circulus eiusdem coloris est lauda-
bilis est ⁊ etiam sub citrina licet non ita perfecte sicut
omnino citrina. Urina rubea sicut rosa effumera
febrem significat: ⁊ si continue mingatur significat fe-

brez quotidianam. Urina sicut sanguis in vitro
significat febrez ex nimio sanguine: ⁊ tunc statim de-
bet fieri minutio nisi fuerit luna in medio geminoz.

Urina viridis quando mingitur post rubeaz si-
gnificat adustionem ⁊ est mortalis. Urina rubea
claritate remota omnino declinationē morbi signi-
ficat. Urina rubea permixta aliquantulum nigre-
dini vicia epatis ⁊ calefactionem significat. Uri-
na pallida significat defectionem stomachi ⁊ impe-
dimentum scde digestiois. Urina alba sicut aqua
fontis in sanis significat crudelitatem humor ⁊ in
acutis febribus est mortalis. Urina autem lactea
cum spissa substantia si accidit in mulieribus nō ita
periculosum sicut in viris ppter indispositiois ma-
tricis tunc in acutis febribus est mortalis. Item
vrina lactea superius ⁊ inferius obumbrata circa
mediam regionē clara idropisim significat. Item
vrina in idropico rufa vel subrufa mortem signifi-
cat. Item vrina caropus significat multitudinē
humorum corruptorum sicut accidit in flegmatico
idropico podagrico ⁊ alijs. Item vrina nigra
potest esse de calore naturali extincto: ⁊ tunc est mor-
talis: vel potest esse ppter expulsiōem materie ve-
nenose que expellitur per vias vinales: ⁊ tunc si-
gnificat salutem in quartana. alis autem semper est
mortalis. Item vrina lucida sicut cornu indispo-
sitiones splenis: ⁊ dispositionem quartane signifi-
cat. Item vrina crocea ⁊ spissa sub nigra ⁊ est fe-
tida ⁊ spumosa significat ptericiam. Item vrina
rufa vel subrufa inferius habens resolutiones rotū-
das ⁊ albas superius aliquantuluz pinguis febrez
ethicam significat. Urina in fundo vasis vsqz ad
medietatem clara postea non spissa ⁊ tenuis gra-
uedinem pectoris significat. Item vrina spumo-
sa ⁊ clara ⁊ quasi subrubea dolorem in dextro late-
re maiorem qd in sinistro significat. Si vrina spumo-
sa ⁊ alba sit maiorem dolorem significat in sinistro
latere: frigidius est enim sinistrū latus qd dextrū.
Si circulus vrine nullo in quiescente tremulus ap-
paruerit de cursum flegmatis ⁊ aliorum humor
a capite per collum ⁊ per posteriora ad inferiora
significat. Item vrina tenuis ⁊ pallida ⁊ clara ace-
tosum flegma significat. Item vrina spissa plu-
bea circa mediam regionem nigra paralysim si-
gnificat. Item vrina spissa ⁊ lactea ⁊ pauca ⁊ cras-
sa inferius cum squamis lapidem significat vel
ostendit: si vrina sine squamis spissa ⁊ lactea pau-
ca fuerit fluxum ventris significat. Item vrina
spissa ⁊ lactea ⁊ multa gutta in superioribus par-
tibus vel membris corporis significat. Item vrina
inferius pallida in viris dolorem renū signifi-
cat: in mulieribus vitiū matricis significat. Item
vrina in qua frustra apparent si pauca sit ⁊ turbu-
losa vene rupturam circa renes ⁊ vesicam signifi-
cat. Item vrina in qua sanies apparet in fundo
vasis contigua renū ⁊ vesice putredinem vel a-
postemata significat. Et si in tota vrina sanies ap-
paret totius corporis putredinē significat. Item
vrina in qua frustra apparent parua ⁊ lata vesice
excoziationem significat. Item vrina atomosa
per multum tempus lapidem in renibus signifi-
cat. Item vrina alba sine febre in viris ⁊ mulie-
ribus aliquando dolorem renū aliquando im-
pregnationem significat mulieris. Item vrina

pregnantium si vnum mensem duos vel tres habuerit debet multum clara et alba esse et ypostasim debet habere in fundo. Si vero quatuor habuerit menses: vrina tunc debet esse serena et ypostasis alba et grossa in fundo.

Item imago in vase vrinale tanquam in speculo apparere si vrina sit mulieris conceptionem factam significat. Et si imago iudicatis apparuerit in vrina patientis febres interpellatas vel epaticam egritudinem prolixitatem morbi significat. **I**tem vrina spumosa ventositatem stomachi in mulieribus vel ardorem ab umbilico usque guttur et sitim significat. **I**tem vrina virginis quasi subcitra debet esse. unde vrina liuida et nimis serena virginem declarat esse constantem. **U**rina turbida in qua semen apparuerit in fundo vas mulierem iacentem cum viro significat. **U**rina mulieris densa eam esse corruptam tunc declarat: predicta vrina salte turbida in qua semen apparet in fundo vas. Si vero vrina talis fuerit in viro receniter eum cum muliere coisse tunc declarat. Si vrina turbida velut subiugarij um habuerit vulue matricis dolorem significat. **U**rina multum nigra mulieribus superueniens: si mota aliquantulum ruborem habuerit solutionem menstruum significat.

De modo iudicandi vrinarum.



Modus iudicandi vrinarum est. Consideratis omnibus que a medico debent considerari sic procedendum est. **P**rimo videndum est de coloribus. **D**e secundo de substantia. **T**ertio de cons-

tentis et sic poteris cognoscere quis humor dominatur in corpore humano.

Si igitur vrina apparuerit tenuis et alba melancolia dominatur.

Si vero apparuerit alba et spissa significat flegma dominari.

Si aut apparuerit spissa et rubea sanguis dominatur.

Si vero rubea et tenuis colera dicitur dominari.

Et nota super eadem.

Et nota quod sanguis in anteriori pre capitis dominatur.

Colera in dextra parte capitis.

Flegma in posteriori parte.

Melancolia in sinistra parte capitis dicitur dominari.

Circulus rubeus in anteriori parte capitis dolorem significat.

Circulus albus in posteriori parte dolorem significat.

Circulus niger in sinistra parte ipsius capitis dolorem ut factum est manifeste demonstrat.

Item predictum modum de iudicijs et demonstrationibus vrinarum sufficiat.

De modo iudicandi vrinarum. Consideratis omnibus que a medico debent considerari sic procedendum est. Primo videndum est de coloribus. De secundo de substantia. Tertio de cons-

De modo iudicandi vrinarum. Consideratis omnibus que a medico debent considerari sic procedendum est. Primo videndum est de coloribus. De secundo de substantia. Tertio de cons-

De modo iudicandi vrinarum. Consideratis omnibus que a medico debent considerari sic procedendum est. Primo videndum est de coloribus. De secundo de substantia. Tertio de cons-

De modo iudicandi vrinarum. Consideratis omnibus que a medico debent considerari sic procedendum est. Primo videndum est de coloribus. De secundo de substantia. Tertio de cons-

Due vene retro aures
ex vtraq3 parte valent
ad bonam memoriã
z ad mundificandum
vultus a pustulis z cõ
tra omne alias macu
las faciei.

Vena sub mento valet
contra dolorẽ maxil
larum z contra pruri
tum z fetorem narius
z dolores faciei z con
tra dolores z pustulas
pectoris.

Vena sub vtraq3 parte asel
le incisa facit hominem ridẽ
tem mori z talis vena balse
cos vel balsetes appellatur.
Omnes vene brachiorũ sunt
ante comitionem minũde.

Vena trãsiens a sinistro z cur
uo mõ in ambobus brachijs
debet incidi contra dolores
pectoris z pulmonis. Et inci
sio ipsius valet etiã illis qui
graniter anhelitum attrahũt
z spiraminis gravamen habẽ
ntibus.

Vena in ambobus lateribus
corporis debet incidi contra
pustulas antiquas z cõtra in
f rmitatem frigidam z lente
riam z quando homo nõ po
test habere digestionem.

Vena basilica z epati
ca solet aperiri p pas
sione epatis z splenis
aut pfectius edocetur
circa manũ sinistram.

Vena pulsatilis incisa
icardiaca passioẽ mul
tum profert.

Vetose postre sub renibus va
lent apostematibus coraz sca
bici podagre z ventositatẽ ve
sice z pleuresi.

Vena sub preputio
valz contra ydropi
siz z cõtra oẽs cor
poris tumores.

Due vene de coris z due de ti
bijs z vnaquõq3 in vtroq3 pe
de valet cõtra dolorẽ coraz z
tibiãrum z crurũ vtriusq3 pe
dis aut si firmitas euenit ex ve
sica artetica podagra sciatica
ydropisi valet etiã contra ner
uoz constrictionez et tumo
rem et menstruoꝝ subtraci
onem.


Due vene interiores sub talis
in vtroq3 pede valet cõtra are
nã z calculũ z valent mulieri
b post partuz nõ bene purga
tis valet et illis q nõ sũt bñ oi
spõsite ad recipiẽdũ semen et
etiã mlierib gius suũ ñ hũt.

Vena in vtroq3 pede su
pra pedicã maioꝝ valet
ptra obaalmiaz et ptra fa
ciei pustulas et mēstruoꝝ
retentiones et cõtra cõce
ptionem et ptra pustulas
crurum.

Due vene inferiores iuxta
preputium valent tunc
faciõibus testiculozum
et dolori renuz et siccitẽ
et vitio.

Vena supra preputiũ va
let contra tumores et in
flationes testiculozum et
cõtra omnia vicia vesice
ex arena calculo et cõtra
ata mala.

Vene saluælle in dextra pte
corporis valent contra pectõ
riam. ver. B. it saluælla mĩpĩ
plurima dona minuita. In na
turalem tollit de corde calozẽ
purgat epaz splenem pectus
pccordia vocem.



a Vena in medio frontis percussa valet contra apostemata oculorum et contra emigraneam et contra dolores capitis grauissimos et contra mentis alienationem et contra frenesim et contra nouam lepram.

b Due vene in collo inciduntur propter humores et reuma capitis. Nota omnes vene capitis post comestionem sunt minuende excepta vena sub mento.

c Vena iuxta nares incisa purgat caput et iuuat auditum.

d Due vene in faucibus oris quelibet valet contra pustulas faciei et contra scabiem capitis et contra dolorem dentium et mandibularum. Et etiam valet contra grauedinem capitis gutturis et oris.

e Vena labiorum contra apostemata in ore existens et etiam in gingiuis et etiam in carne qua radicantur dentes.

f Vena in summitate nasi valet contra grauedinem capitis et nimium fluxum oculorum.

g Due vene sub lingua valent ambe contra dolores dentium et gingiuarum et contra reuma capitis et contra apostemata gutturis et contra squinantiam et contra omnia vitia oris.

h Vena cephalica capitis percussionebus inciditur: ipse capitis vt melius ex alio latere in manu sinistra in principio. Item omnes vene manuum sunt post comestionem minuende.

i Vena cordiaca cordis seu coralis hoc est vena mediana inciditur pro passionibus spirituum et plenius in manu sinistra valor eius declaratur.

k Vena purpurea contra passiones minuitur interiorum.

l Vena iliaca et titillari aperitur pro passionibus inferiorum.

m Saluatella in dextra manu inuenda est quando peccat sanguis in qualitate vel in quantitate vel in viroque: quia epar est in dextro latere. matrix autem splen et renes ad sinistrum latus declinant.

n Vena in poplicibus incisa facit hominem incessanter incedere. Item omnes vene crurium ac pedum post comestionem sunt minuende.

o Vena sub viroque genu valet contra apostemata et dolores renum et lumborum coxarum et vesice et arteticas precisiones mirabiliter curat.

p Vena gibbo incisa purgat melancoliam et confortat renes.

q Vena veniens ad pollicem incisa valet idropis et inflatis et etiam contra ventositatem.

r Due vene secte in viroque parte coniuncte pudibundis valent contra omnia vitia verendos: strangurie et lenterie passiones et vesice et testiculorum dolores.

s Vena in viroque pede supra pedicam maiorem valet contra obtalmiam et contra faciei pustulas et menstruum retentiones et contra conceptionem et contra pustulas crurium.

t Vena super minimam pedicam incisa valet in viroque pede ad coleram.

u Vena inter pollicem et indicem in viroque manu valet contra dolorem capitis et contra dolores oculorum: contra febres et contra fellis effusionem: contra obtalmiam et contra ruborem et fluxum oculorum.

x Due vene exteriores saphene sub tales in viroque pede fleubotomia contra dolores Aluchaium et contra inflationes et apostemata testiculorum.

y Vena in viroque manu supra minimi digitum valet contra ictericam et contra omnia vitia splenis. Et contra frenesim et quacunque febrem.

3 Vena epatica habet initium a stomacho: a corde: et est posita vel locata ad extremam partem brachii: et si non bene incidunt predictum locum facit tumescere. Et etiam ex hoc generantur apostemata et spasmus in brachijs et digitis: et etiam stomachi et splenis: et etiam contra fluxum sanguinis de naribus: et etiam contra punctiones seu stimulationes lateris. Et incisio ipsius precipue et principaliter debet fieri in nonis maij: hoc est sequenti die post festum sancti Joannis crisostomi.

4 Vena mediana capitis initium suum a pulmone. Et est in medio brachii posita vbi non est mus. Et si non bene incisa fuerit dat spissum sanguinem. Et si bene inciditur valet contra omnes dolores membrorum cordis stomachi costarum et laterum. Et etiam si non bene incisa fuerit saniem plurimam et pessimam mitteret: et vulnera famosa: et ad perniciosum hominem deducit: et precipue et principaliter incisio vene predictae debet fieri in nonis septembris: hoc est circa festum Natiuitatis beate virginis Marie.

5 Vena Cephalica a capite habet principium et per illam venas transit alia vena quemus nuncupatur que aliquando inciditur loco cephalice per negligentiam: et talis incisio importat tumositatem et propinquam mortem. Sed incisio vene cephalice valet contra fluxum oculorum et contra omnes dolores capitis: et etiam incisio vene predictae valet contra caducum morbum: et incisio ipsius bona est sequenti die post festum sancti Ambrosij seu in nonis Aprilis.

6 Due vene in occipite ex viroque parte valent contra querelam capitis inani et stuporem mentis et amissionem rationis.

aa Vena in concanitate aurium ex viroque parte valet contra tremorem capitis et contra tinnitum aurium: et etiam valet contra nouellam surditatem.

bb Due vene in temporibus valent contra dolorem aurium: nimiam effusionem lachrymarum de oculis et contra emigraneam et secundum Auicennam non debent minui in quibus requiritur potentia generandi: quia per istas venas euacuatur spiritus: qui a natura missi sunt ad fetum generandum.

cc Vena in angulis oculorum in quelibet parte valet ad clarificandum visum: et contra omnes fluxus et maculas oculorum: et maxime albulam et nebulam et palpebre inuersionem.

Ista tabula tractat de iudicijs venarum et de mutationibus earundem una cum cautelis.



In iudicio alia per metatesin: alia per antifrasi-
sim. et si sit inueterata passio fiat minutio
per metatesin. Si hoc
recens per antifrasi-
sim. per metatesin debet
fieri quando ex eadem
parte in qua est egri-
tudo extrahitur san-
guis per antifrasi-
sim sit quando ex contra-

ria parte sit minutio seu flebotomia quod est idem.
Considerandum enim est an materia fuerit furio-
sa ut in antrace per metatesin: tunc debet fieri mi-
nutio. Similiter si quis punctus fuerit ab animali
venenoso per metatesin minuatur. Sed quia iuue-
nes humidant calidis humoribus: in horum cali-
dorum humorum causa debent flebotomari. Cum igitur
sanguis humidet ante tertiam et colera inter ter-
tiam et nonam et ipsi iuvenes in his horis debent fleu-
botomari. Si. n. humides frigidis humoribus et ma-
xime melancolia in hora melancolie. i. post nonam.
præterea ut ait Galienus in tegni. Si quis habet sto-
machum debilem cauere debet flebotomias et ma-
xime de venis que sunt implicatiuis brachiorum.
Et nota quod luna non sit in medio geminorum qua-
do minuitur de ipsis venis implicatis ipsorum bra-
chiorum neque etiam super spatulas veterose debent
apponi. Et si sanguis exierit niger tollatur usque sit
rubricundus. Si spissus usque sit rubricundus: et usque ad
tenuitatem. si aquosus usque ad grossiciem. Et si san-
guis non potest exire: clauso. n. flebotomie vulnere
cum digito postea subito cum maiore impetu exit san-
guis et fumosus.

Cautela alia.



In flebotomia quatuor potest atten-
di scilicet: tempus consuetudo: etas
et virtus. In tpe calidissimo non debet
fieri flebotomia: quia humores sunt per-
turbati: et sic exiret ita cito boni sicut
mali. nec in tpe frigidissimo quia humores sunt con-
tracti in corpore et difficiles ad educendum et citius exi-
rent boni quam mali. In noua vero luna non debet fieri
flebotomia: quia corpora sunt ab humoribus euacua-
ta sed per flebotomiam magis euacuarentur. Consuetu-
do debet attendi. si senex non consuevit flebotomari non
minuat per consuetudinem et debilitatem. Etas etiam
est attendenda quoniam ante duodecim annos nul-
lus debet flebotomari neque senex senio constitutus.
Tamen sunt quidam fontes et vigores et tales possunt
magis minui: virtus. n. considerat maxime: fortes
enim minui debent: debiles vero non: unde virtus et etas
magis attenduntur quam tempus et consuetudo.

Ista conueniunt flebotomiato.



Flebotomiato ista conueniunt. panis fer-
mentatus benecoctus triticus vinum le-
ue quod stomachum non grauatur oua for-
bilia pisces asprariles et carnes porcine ouine
arietina pulline. Iuuenium bestiarum parua poma que
tunc reperiuntur: caules non comedantur: quia generant
venenum in stomacho neque caseum nec aliqua que de eo

cocta sunt. Alii namque Galienus Ippocras. ampho. lxxij.
periculis quænt. lac dare febrientibus vel caput do-
lentibus pessimum est: ipsa die somnum vitetur. Nam per
somnia solet quidam parua accensio febrium accendi et
lippothemia incurrere. i. defectum cordis vel tenebro-
sitate oculorum ut quibusdam extasim pariat.

Utilitas flebotomie.



Flebotomia. n. mentem sincerat: prebet
memoria: sensum subtiliat: vocem subtilia-
do clarificat: lumen acuit: auditum repara-
tione digestionem purgat: stomachum adiuuat:
sanguinem malum expellit: naturam confortat. Et cum ipsa
malos humores extirpat. Et longius vite sanitatem
ministrat. unde ait Auicenna quarta primi. capi-
tuli. in principio. Flebotomia est vniuersalis eua-
cuatio omnium humorum: laborans ex sinotho. i. ex
nimio sanguine vel ex sinothio. i. ex sanguine putre-
facto statim minuatur omni tempore cum nisi quod luna fue-
rit in medio signo geminorum. Dicitur autem a si-
nocho quod est febris et nocha quod est sanguis versus.
Sinocha de multo: sed sinochus putrefacto.



Aborans effimera contra sinotham in
flatam minuat de vena madiana et de
vena cordiaca dextri brachii in estate.
sinistri vero in hyeme. Effimera enim
est febris que durat per unum diem vel
parum plus vel parum minus. Laborans effi-
mera ex causa calida vel ieiunio minuatur de vena
capitis vtriusque brachii. Laborans effimera ex
ieiunio et frigidityte caueat minutionem. Labo-
rans ex frenesi minuatur de vena capitis vel de ve-
na in medio frontis. Laborans effimera ex de-
bilitate minuat cum setis porcinis de naribus suis.
Laborans effimera ex litargia minuat inter me-
dium et auriculare. Laborans ex squinantia
minuat de cephalica vtriusque brachii. Labo-
rans effimera ex apostemate minuatur de vena venie
te ad auricularem digitum. Laborans effimera
ex pleuresi minuatur de vena cordis per metatesin
hoc est si pleuresis sit in sinistro latere fiat minutio
in sinistro brachio. Et si pleuresis in dextro fuerit
brachio seu latere: tunc fiat minutio in dextro latere
vel brachio. Laborans ex quotidiana interpel-
lata minuatur de vena mediana id est de vena cordis.
Laborans ex quotidiana ex vtroque flegmate mi-
nuatur de vena dextri brachii in estate. sinistri ve-
ro in hyeme. Laborans ex flegmate salso cum
puritatem fiat scarificatio in tibis. Laborans
ex tertiana minuatur de basilica id est de vena epa-
tis dextri brachii in estate. sinistri autem in hye-
me. Laborans ex quartana minuatur de saluatel-
la sinistre manus inter medium et auricularem. La-
borans ex quacunque acuta minuatur de basilica usque
ad quartum diem. Laborans ex febre ethica
minuat de mediana. i. de cordiaca. Laborans
ex ydropisi quacunque minuatur de vena epatis dex-
tri brachii in estate. sinistri autem in hyeme. La-
borans ex ictericia de basilica vtriusque brachii in
estate et in hyeme. Laborans ex melancolia ina-
nia et frenesi minuatur de vena que est in medio fro-
ntis. Laborans ex epatis calefactione minuatur
de basilica dextri brachii. Laborans ex vitio
splenis minuatur de saluatella sinistre manus. La-
borans ex vitio renum matricis et vesice minuatur

de saphena interiori idest de vena que est sub ta-
lo interiori vtriusq; pedis. **C** Laborans ex ven-
tositate et inflatione incidatur vena que dirigitur
ad pollicem vtriusq; pedis. **C** Laborans ex parti-
bus inferioribus minuat de saphena interiori et
exteriori pedis. **C** Laborans ex sciatica minuat
de saphena exteriori pedis partis dolentis. **C** La-
borans ex podagra minuat de saphena et de ba-
slica interiori et exteriori vtriusq; pedis.

Remedium.

C Contra inflationem venarum post minutionem.
Recipe rutam absinthium et ordeum hoc totum co-
tunde et in patella calida coñice ex illis ad modum
emplastri et liga super tumorem et sanabitur.

Aliud remedium.

C Contra debilitatem venarum cum homo senserit
quod est piger et gravis in toto corpore et plenus do-
loribus ante et retro in capite suo talis minuat san-
guinem de vena epatica quod mirabiliter per hoc cu-
rabitur. Super isto dicit Galienus quod generat hu-
mores pessimos in sanguine illo: intrinsecus san-
ies et vlcera magna generantur et oriuntur si cito
minutio non occurrat per venas naturales. Et quasi
eederet vena naturales non recuperantur quod sunt de-
bilitate per naturam imundam hominis sine im-
minutione quod sunt obstructe sanguine malo. Ideo
aperiri debent alio destruerentur: sicut aux quod diu se-
pelitur et calidatur in igne. Taliter etiam homo
destruitur si sibi minutione mediante non succurra-
tur vel aliis medicinis. Item dicit Ipoctas ampho.
prima quod homo nimis languoribus debilitatus
per minutionem sanabitur et dissolvitur.



S igitur tempus bonum flebotomi-
nandi secundum electionem et non necessitas
tem quatum ad locum lune et non aliam
rum planetarum quod tamen est neces-
sarium pro tempore multo bono et lau-
dabili optas scire. Nota primo regulas genera-
les. Prima in tempore novilunii et plenilunii non
valet flebotomia. Et si luna non fuerit in bono si-
gno. item incidere mēbrum cum ferro luna existen-
te in signo illud mēbrum respiciente horēdū est.
item luna existēte in signis aeris vel igneis plus
valet operatio vene quod ipsa existēte in signis terre
nis vel aquaticis. Quapropter iuvenes vel viri in
augmēto lune sunt flebotomandi. senes vero in
defectu versus. Luna vetus veteres: iuvenes no-
ua luna requirit. item tpe veris et estatis flebo-
tomia fieri debet de parte dextra. Tēpore autem
autūni et hyemis de pte sinistra. versus. Uer estas
dextras autūni hyemis quoque sinistras. Incidunt
venas morbofo sanguine plenas. In se vel iuue-
ne si sint vene sanguine plene. Omni mense bene
confert incisio vene.



C Um igitur quatum ad signum lune tēpus
minutionis scire volueris tūc predicta vi-
deas quādo luna fuerit in signo bono et
valente pro minutione tūc ipso die minu-
tio erit bona. Stante illo quod eodē die nec
sit novilunium nec plenilunium: et sic de alijs regulis
put dictum est obseruatis. Et si potes aspectum lune
ad alios planetas et ascendētia cōseruare bonū erit.
Nam stat quod luna sit in bono signo. sed forte coniun-
cta vel aspecta aspectu malo a saturno vel a marie.

Et si quidem ex parte signi lune valet apertio vene.
tamen propter coniunctionem vel aspectum non valet. Si
tamen hec omnia haberi non possunt: habeatur tamen luna
in signo bono et satis ad presens erit: pro tpe electio-
nis: et iste sunt regule astronomicales.

C Medicinales vero sunt alie multum necessarie que
alibi videri debent: obseruentur tamen iste. Primo quod
aer filius diei sit clarus temperatus: non multum frigi-
dus: aut calidus: non turbidus: aut pluuiosus: aut cor-
ruptus. versus. Jan. feb. april. maij nouē. sep. atq; de-
cēber. versus. His minue venam lunam dum videris
apta. In his festis cōmuniter celebrat flebotomia.

C Item alij versus. Martini Blasii Philippi Bar-
tholomei. Venas precidat ut longo tempore viuāt.
In his metris continentur festa circa que festa proprie
cōtingit fieri cōiter flebotomia. Non quod semper va-
leat in illis festis sed proprie illa festa.

De iudicio cruoris.

Iudicandum cruorem de vena amissum.
Primo si est spissus male se habet cir-
ca pectus. Si flauus male circa splen. Si
glaucus male habens circa secur. Si autē
durus et niger nimis timuisti. Si est rufus habes ni-
grum circulum est causa debilitatis capitis. Si autē
est rufus niger durus et coagulatus time paralysim.
Si autem est niger et aquosus nimis time febres quā-
tanas. Quādo enim est aqua inferius et aqua super-
ius tūc ydropisim. Cum autē est cruor valde rufus et
parum aque habens superius. bilarem vultum fa-
cit: et est signum sanitatis.

Uersiculos nota quibus cernes experimenta.

Sanguinis emissi de venis ordinetali.

Si cruor est albus hominis quasi spuma repertus.

Tussim designat: pulmōni dolorque paratur.

Et si ceruleus sanguis fuerit speculatus:

Est de seruoze: tunc dolor in iecore.

Sanguis preterea et nare videtur in vnda:

Sificus hunc hominem pati dicit lapidem.

Si fucus sanguis fuerit varijs coloris:

Et velut collum columbi sit rubensque:

Talem paralysis vexat ubique satis.

Si sanguis pure pellis vino scitur esse:

Inter cutanea pestis ibi tunc dominatur.

Si natiuant globuli tunc fiant vulnera causam.

Si rufus pulcher sit et vnda parumper.

Est talis sanus non tibi sit iste dubius.

C Debet autem minutus sibi cauere maxime in pri-
mis tribus diebus a supfluo cibo et potu aut forti ex-
ercitio. i. labore et supfluo sono maxime in prima
die: tristitiaque et sollicitudine: hec. n. sanguinem cor-
rumpit et in genus melacolie cōuertit. Quartoque
die vel quinto postquam vult solidatū fuerit. balneum
irare et tpe ibidem manere iuuatiuū est: fiat autē
ipso die existēte in balneo moderata et suavis fri-
catio circa corpus: exiens autem a balneo canet
sibi a frigore: immo oportet ut inuolutus sudario
et sufficientibus operimentis vestitus maneat in
domo temperati aeris.

Uersus.

Prima dies vene gaudet moderamine cene.

Altera leta dies: tertia vero quies.

Postque dies quartus cunctos exterminat actus.

Hincque dies quintus virtutes colliget inuis.

Balnea sexta petit: sed septima vult spaciari.

Precipit octaua ludere cum domina cara.

C Sequitur de .xii. signis zodiaci: et primo de ariete.
Luna existente in ariete bonum est sanguinem minuere de brachijs. balneum intrare. scribere incipere. Seminare falcare. Ad mercatum ire. foras emitti incideret. Et omnia quecumque igne sunt bonum est operari: malum est medicari. Turris et castrum vel domum edificare incipere: non est bonum sanguinem de manibus minuere nec vetositas ponere debes. **Taurus.**

Luna existente in tauro bonum est sanguinem minuere: hortos facere: seminare vineas. et arbores plantare. Nam cito crescunt et multum durabunt: bonum est mansiones edificare: vxorem ducere: et omnia lignea operari incipere: bonum est terras emere sicut agros et homines arare incipere: malum est medicare collum: oculos: guttur: et ungulas. **Gemini.**

Luna existente in geminibus bonum est incipere ea que pertinent ad duo. scilicet ad matrimonium: ad societatem: de amicitia tractare: bonum stabilia facere. Incipere plantare. Ire ante iudices: malum est medicare in humeris: scapulis: brachijs: vlnis et manibus: seu ungues de manibus incidere. Item incipere minuere de brachijs: bonum tamen potionem sumere.

Lancer.

Luna existente in cancro bonum est sanguinem minuere et medicinam sumere: et facere ea que cum aqua sunt ut sunt: molendina: piscine: et aqueductus intrare nave: iter accipere: novam domum intrare: et mutare de una domo in aliam: et vxorem ducere: et bestias mactatas emere: ut porcos: oves: capras: et consimilia. Malum est medicari pectus: pulmonem: et splenem: et domum edificare. **Leo.**

Luna existente in leone bonum est incipere ea que cum igne sunt: fundare castra: domum intrare: logothetas seu principibus: confirmare matrimonium. malum est medicari stomachum: Cor: et pectus: latera: potionem et medicinam sumere. Malum est etiam medicari Spem et omnia interiora iter longum incipere: non est vestem induere. **Virgo.**

Luna existente in virgine bonum seminare: et colere terram: et plantare vineas: et arbores: et hortos facere: scribere incipere: et omnia operari que vis geminari: tractare pacem: induere novam vestem. malum est medicari ventrem: et omnia interiora ventris. malum etiam est vxorem ducere quia sterilis erit aut paucos filios generabit: locum mutare: et facere ea que cum igne sunt. sed medicinam sumere multum laudabile est.

Libra.

Luna existente in libra bonum est sanguinem minuere: et ponere. Emere vendere potestatem omnia que sunt ponderabilia. malum est medicari interiora ventris. Renes et vesicam et ea que sunt usque ad pudibunda: et omnia incipere facere que cum terra sunt.

Scorpius.

Luna existente in scorpione non video quod sit aliquod bonum facere: quia tunc est in suo casu et infortunio. Ideo ipsa debilitatur et impeditur in bonis operationibus tunc bonum est balnari et ea facere que cum aqua et de aqua sunt. Malum est medicari membra virilia ut preputium: anum: vel aliquem vulneratum: arbores et montem ascendere. Item facere et precipue per terram vel per navium.

Sagittarius.

Luna existente in sagittario bonum est sanguinem minuere: balnea intrare: caput radere: capillos precipingere: discordes reconciliare: copulationem inter

amicos facere: societatem firmare: puerum ad artem applicare: matrimonium intrare seu ordinare: sed non proficere quia sterilis erit vxor in pueris et superba. bonum est facere omnia que pertinent ad constructiones domorum: terram colere: et hortos facere: malum est facere medicari coras: semora adducere membraorum.

Capricornus.

Luna existente in capricorno. bonum est facere ea que cum terra et de terra sunt ut seminare et vineas plantare venari aucupari: et omnia instabilia exercere. Iter incipere versus meridiem. malum est vxorem ducere: et facere ea que cum igne sunt. Non est bonum minuere nec potionem sumere: nec in genibus nec in nervis facere medicinam: nec in aqua laborare.

Aquarius.

Luna existente in aquario bonum est vxorem ducere intrare domum. Iter incipere ad orientem loqui placet et omnibus aliis dignitatem habentibus. malum est medicari tibias et cetera usque ad cauas pedum. Iter longum incipere.

Pisces.

Luna existente in piscibus bonum est sumere medicinam et potionem. Et quicquid pertinet ad geminationem ut amicitias tractare: rationem ponere: vxorem ducere. Et ea facere que ad aquam pertinent ut molendina et aqueductus. Iter per aquas incipere: et fundare ecclesias et alia edificia. malum est pedes medicari et omnes partes eorum.

Taurus

Virgo

Capricornus.

frigida et sicca

Lancer

Scorpio

Pisces

frigida et humida

Aries

Leo

Sagittarius

calida et sicca

Gemini

Libra

Aquarius

calida et humida

Et nota ea que dicta sunt de flebotomia de .xii. signis zodiaci debent intelligi solum secundum motum lune: et non aliorum planetarum quo ad tempus electionis pro sanitate conservanda: non autem ad tempus necessitatis igitur nec signum nec horum considerare: quia indigenti nulla lex est imposita. Indiges igitur aut expectare debet: sed minuere in nomine domini nostri Iesu christi dum necesse est: et omnia. versus. Ar li de vena bene fundunt vena sagitta.

Can capis vir media cetera dico mala.

Flebotominandum est omni tempore si necessitas viget: et maxime luna. iij. viii. xi. xiii. xvi. xvii. xxi. xxiii. xxvi. Quia tunc minutio melior est quam alijs diebus.

Item sanguinem minuere utilissimum est ab. viii. kal. Julii usque ad. xv. kal. Augusti: quia tunc crescit et augmentatur sanguis. Dies canicularis intitulatur a. xv. kal. Augusti usque ad nonas septembris in quibus non est flebotominandum: nec potio est accipienda. flebotomia non est utilis ab

viii. kal. octobris vsq; ad. viii. kal. decēbris vt no-
cuius humores quos estiuū tempus cōtraherat:
Autūnus deperdat ⁊ sicca colera vsq; ad scōm au-
tūnnū securus eris.

Sanguinem non minuas nec de anserē
comedas: neq; potionem iumas. viij.
⁊ ix. die April. ⁊ kal. Augusti: ⁊ vltima
die Decēbris presertim ⁊ vltima die

Junij: quia tunc venē nimis plene sunt
Ideo in hominibus ⁊ pecudibus fleu botomie in-
cisis vel alijs animalibus vulneratis periculosum
est: homo etiā qui in istis diebus natus est vel
fuerit: aut morte mala: aut maximo labore peribit.

Item die Januarij vltimo ⁊ Februarij vult pri-
mo: homo qui natus fuerit post mortem suā nūq̃
putredine soluetur. Et nota q̃ homines sani de ma-
ne habent vzinā albam. Ante prandium rubēā.
Post prandium candidā. Et ante cenā calidā.

Cauendum est etiā si quē in aliquis in subno-
ctis diebus minuat: quia pericula ex hoc eueniūt
infra scripta. Si sexto kalendas Januarij aliquis
sanguinem trahit: aut moritur infra annum: aut vi-
sus: aut alius sensus ei minuetur: aut febre capiet.

Si octauo kalendas Februarij: aut mortē aut spa-
smū cordis: aut paralysim patietur. Si pridie ka-
lendas Martij: aut moritur: aut spasmus: aut pa-
ralysim: aut febrem succurrit: etiā si quis quocūq;
die alio in predicto in Martio minuetur ille in Au-
gusto febicitabit.

Si tertio idus Aprilis: aut statim
aut quarto die morietur: aut patietur febrem: aut
spasmus. Si tertio vel quinto kalendas Maij:
aut moritur aut febres incurrit: aut dissolutionem
mentis habebit. Et si primo nonas Maij: aut mo-
ritur: aut emigraneas patietur.

Si tertio idus Ju-
nij: aut epilepsiam: aut elephantiam incurrit. Si
Octauo kalendas Julij: aut moritur: aut in extasi
vertitur: aut in iecore dolebit. Et si quinto nonas
Julij: aut moritur: aut obliuiosus erit: aut viscera
in frigora sustinebit.

Si nono kalendis Augusti:
aut statim: aut quinto die moritur. Et si eodem die
potionem sumpsit ante trigessimā diem morietur.
Si tertio kalēdas Septēbris: aut infra an-
num morietur: aut frenesim patietur: aut visus o-
culorum eius extinguetur: aut scabiem: aut prurigi-
nem: aut sudorem fetidum sustinebit.

Et si tertio
nonas ipsius Septēbris: aut moritur: aut spas-
mum habebit. Si duodecim kalendas Octobris
aut moritur: aut ebetudo sibi occurrit: aut terti-
us erit.

CSequitur de duodecim mensibus.

CDe Januario.

Iniano clavis calidis cibis potiaris.
Ne tibi languores sint aptos sumere li-
quores.

Nec minui cogita: ⁊ traria fercula vita.
Balnea sint grata hec potio sit moderata.

CFebruarius.

Signitur occulta febris tibi multa.

Si comedis betam necnon aucam vel anetam.

Potio sumatur: in pollice tunc minuat.

Frigida vitentur sed balnea sana videntur:

CMarcus.

Marcus referat humores: gignitq; dolores.

Summe cibum pure coctana si placet vire
Balnea sint assa nec dulcia sint tibi casta
Vena nec habenda nec potio sit minuenda.

CAprilis.

Se probat in vere vires aprilis habere.

Cuncta renascuntur poti tunc aperuntur.

Hincq; scalpescit corpus sanguis quoq; crescit.

Ergo solvatur venter cruor at minuat.

CMaius.

Maius seculare laxari sit tibi cure.

Scindatur vena sed balnea dentur amena.

Cum validis rebus sint balnea seu speciebus.

Potibus astricta sit salua cum benedicta.

CJunius.

Qui vult solamen iulio pbet hoc medicamen.

Vena non cedat: nec ventrem potio ledat.

Somnum compefcat: ⁊ balnea cuncta pauescat.

At venerem vita sit anetam salua tuta.

CAugustus.

Quisq; sub augusto viuat moderamine iusto.

Rare dormitet: frigus coitum quoq; vitet.

Nec minui cogita: contraria fercula vita.

Potio vitatur: ac lotio nulla paratur.

CSeptember.

Fructus maturi septembre sunt valituri.

Sed pira cum vino: panis cum lacte caprino.

Atq; diuretica potio tibi fertur amica.

At venam pandas species cum semine munda.

COctober.

October vina prestat: valetq; ferina

Nec non ancina caro conuenit ⁊ volucrina.

Quantum vis comede: sed non pæcordia lede.

Quauis sit sana tamen est repletio vana.

CNovember.

Ista nouembre datur tibi regula medo bibas.

Si vita queritur mel ⁊ zinziber comedatur

Balnea cum venere tunc nullum constat habere

His vir senescit ydropisis quoq; crescit.

CDecember.

Sane sunt membris calide res mēse decēbris

Caulis vitetur: capitalis vena seccetur

A frigore caput tegas vt sanus bene degas.

Nenimis egrotas cinamoma repubrica potes.

CAries in prima constitutione cepit videre: hoc

est q̃ hominis caput habere dicitur.

Taurus: habet collum ⁊ guttur.

Gemini: spatulas vsq; ad manus.

Cancer: pecus ⁊ pulmonem.

Leo: stomachum.

Virgo: epar: ⁊ intestina: ⁊ circa ventrem.

Libra: renes. anchas: ⁊ vesicam.

Scorpius: circa verebunda: ⁊ vasa seminaria.

Sagittarius: coras.

Capricornus: genua.

Aquarius: tibias.

Pisces autem pedes.

CEt ita membra humani corporis per signa sua

per celestia diuiduntur.

CLuna existente in signo membri patientis nul-

lum medicamen facias illi membro.

Aries est signū mensis martij. Malum est mederi in capite et tunc qui in capite percutitur: aut moritur aut remanet lesus.

Taurus est signum mensis aprilis. Malum est mederi oculis collo et gutturi: ac gargarismus facere.

Gemini est signū mēsis maii. Malū est mederi spaliis brachijs: et manib⁹ sicut bos et mīd.

Cancer est signū mensis iunij. Malū est mederi pectori: spleni: pulmōni et oculis.

Leo est signū mēsis iulij. Malū est mederi: stomaco: cordi: nerulis: lumbis et dorso.

Virgo est signum mensis augusti. Malū est mederi: ventriculo: et diafragmati.

Libra ē signū mēsis septēbris. Malū est mederi: inferiorib⁹: ventri: Sic semonanchis et plus et q̄ si fieri ad pudē.


Scorpius est signū mēsis octobris. malū ē medei: virilib⁹: mēbris sicut testiculis: vului: vesice: et ana.

Sagittarius est signum mensis Novembris: et malum est mederi coxis: natis et posterioribus.

Capricornus est signus mensis decembris. malum est mederi genibus et eorum nervis.

Pisces est signum mensis februarii. Malū est medicari pedibus et nervis eorū et doctibus podagre: et his similibus.

Aquarius est signus mēsis Januarii. malū est mederi: nris et cruribus.




Targia
 Lephalica
 Latus capillorum
 Amphialgia.
 Totū i fronte añ ⁊ retro
 Omnis calor de humo
 re de ambulatorio ⁊ de
 ventositare que vagan
 tur de loco ad locum.

Ungues mali

Secundina est quedā
 membrana in qua ta
 cet puer in matrice.

Yetericia . ficitas hu
 mor lepra morphea pa
 ralefis ex frigida causa
 vel calida frigus cōstri
 ctio pororum.



Melancolia
 Adama
 Frenchis
 Menopeya
 In fronte ante et retro
 Emptōica.
 Empima
 Pleurefis
 Pafis
 Fluxus reumatia
 Fluxus oculorū

Ungues mali x

Sequit ordinarie in ifra
 scriptis circulis de cōcep
 tōe quō mulier volens
 cōcipe se hēre dbeat mu
 lier cōcipe volētes vide
 at ne matris sit hūorosa
 nimis nec nimis ficca
 nec feruida nec nimis fri
 gida feruato ordine mē
 struali pregnationis nec
 habūdās varijs liquori
 bus vī albis s; sanguine
 is ⁊ nec plurimis ⁊ nec
 paucis sitq; mulier faci
 lis digestionis et pserue
 tur corpus intemperie.

Diafragma ē pellicula
 diuidens nutritiua a spi
 ritualibus

Yetericia ficitas humor
 lepra morphea palefis
 ex frigida cā vel calida
 frigus pstrictio pororū

Notanda sunt aliqua signa cōceptionis ipsius mulieris. Primus .n. signū ē
 q; ex pte coitus cognoscat. Si .n. mulier qñ fuit in coitu cū viro post coitum
 frigus sentit ⁊ dolores in renibus signum est cōceptionis. Itē si color faciei
 vltra modū ⁊ fm mores solitum est mutatus signū est cōceptionis. Itē si ali
 qua cibaria cōcepifcat sicut terrā vel carbonēs signum ē conceptionis. Itē
 si vis scire virū masculus vel femina ē cōcepta si color faciei ē rube⁹ leuis
 ⁊ venter in dextra pte tūc scit ⁊ rotūdat ⁊ lac de mamillis spissum ⁊ bene co
 ctum ⁊ digestus exierit: ⁊ si ponatur sup aliqd corpus bene pollut⁹ ⁊ tersū
 ⁊ non diuiditur secundum parē sed constabit tunc est masculin⁹.

a Quando mulier dolet vbera. Recipe plan taginē z cōtunde bene z super vbera liga: vel re cipe cepe z pista z cōcute cum antiqua arungia: sed prius arungia mitte in aquā vi sal extrahat z postea emplastra super mamillam.

b Si mulier lactans puerū deficit lacte bibat medonē z ceruisiam iuvenē z pncipaliter caueat ne bibat vinum: simul excoquatur feniculum cuz semine suo in iuueni ceruisia z suauī z bibat illō z comedat etiā illud semē feniculi z abūdabit in lacte copiose. Sera. Coli. Ysaac. Haly. Plinius li. ij. caplo. ij. Itē accipiat pulgiū z misce cuz vi no z da bibere nutriendi puerz omni die z habe bit lac copiose. Macer. Item menta de mane co mēsta pdest mulieribus pueros lactantibus.

c Ad expellēdum fetū de muliere nouiter cōce ptum. Recipe castoreū z coque in vino vel in bra ris z bibe mane z sero et exiet si erit masculus. Si autē femella fuerit nullo modo expellens eam.

d Cōtra hoc quando secundina post partū nō educitur tunc pulueriza lapidē q agates appel latur et da in potu. Item fac subfumigationē cuz pennis gallinaz et fac eam desuper sedere q ad se recipiat fumū et curabitur. Item semen planta ginis post partum mulier bibat in potu assidue et deducit secundinam.

e De cōceptione Embionis primo mēse fit coa gulatio sanguinis: scōdo expressio corporis: tertio mense fit cōnexio corporis et anime: quarto acce pit vngulas: quinto accepit similitudinem patris vel matris: sexto facit nervorum ptractionē: se ptimo medulla cōsolidat: octauo ossa et neruī cō firmanē: nono naturam mouet et infans oīum re rum beneficijs implet ex tenebris ad lucē veniet.

f Ad libidinē excitandū. Accipe succi verbene duos ciatos et grana piperis. xij. et sel bircinum vel alterius animalis quātum tibi videt hec tria cuz melle simul cōmisce vt sumi possit et serua et cum opus fuerit da cum vino bibere. Item renes cerui decoquant cuz vino bono z bibe quando volueris z videbis mirabilia.

g De exitu fetus in quo mēse habebat bene suū exituz vī egressuz. Si. n. in octauo mēse hz egressuz sic raro viuīt. cā huius est oīs fetus naturaliter tē dit ad ortum in septimo mense: si tunc in octauo quiescit a labore quē habuit in septimo. Si vero in nono mēse exit sanus ē: qz. quē a laboribz vt dixi: sed si statiz in octauo exierit nō viuīt. Rō qz debilitatus ē p laborē septimi mēsis z nō quēuit.

h Per quē modum puer exit de vtero nota: qbusdā. n. mulieribz plus accidit dolor: qbusdā minus accidit q fetus aliquādo pndit manum vel pedem in egreditēdo: z hec oīa nociua sunt: z sic tunc obstetrices diligēter strudunt fetum: z ex isto maximus dolor generat p quē plures mulie res nisi sint valde fortes debilitant vsq ad mortē sic tunc mulieres bene z expte in hoc ope debent haberi: qz quedam obstetrices vtunt quodā vnguēto quo vngunt vuluā mulieris: z tunc fetus exit liber: z scias: qz fetus naturaliter caput protē dit in exitu z hoc valet.

i Ad mēstrua puocanda viola cuz myrrha po nat in vno vase z repletuz vas aqua pluuiali po nat ad bullēdum: sed vas ita obstrue q fumus

nō possit exire sicqz coquat cōtinue p septē horas z excipe ollā de igne: z mulier recipiat fumuz seu vapore p inferiora qn calidius sustinere potest hoc medicamē facit et ad eas q nunq habuerūt mēstrua. Accipe absinthium z rutam z decoque in vino: z adde quinqz grana piperis z bibat.

k Cōtra nimīū fluxuz mēstrui. Cortex Juniperi tritus cū vino vel aceto: z fructus ei⁹ appositus vel comestus cōpescit mēstruū. Itē lac asine suma tur cum melle z felle leporis vel et lac asine cum pso po sumptuz decoctuz pescit mēstruū. Itē cā nerem rane viridis in saculo secuz portet: z nihil amittit de sanguine kir. Et si volueris pbareliga puluerē pducituz ad collum galline: z post vnum diem iterfice eā: z nō exibat sanguis de ea.

l De purgatiōe mēstrui petrosilijz potui iposi tuz: da bibēdū mulieri matricē ei⁹ bene purgat ysaac. haly. vel et recipe radicē violaz vna cum folijs: z coque bñ in ceruisia: z da mulieri mane.

m Ad expellēdū mēstruū post ptuz. Recipe costā d capite capōis: z cōtere i puluerē z bibat i potu: z calide bibat d illis radicibz videlicet Mil lesolij z hec ad expellēdū mēstruū qn fluit de muliere ptra debūz moduz: videlicet post ānos qn quagita. vel pone myrrhaz ad pomuz scissum: z postea claudē cōtra: z pone sup ipm qn coquis: z ibidez assetur: z postea sumas z da ei comedere cuz myrrha: vel ponat abrotanuz ad sothulares z ambulet in eis: z sanabit.

n Medela muliez in puerperio verbenā illa radix valet mulieribz in puerperio si ipsaz circa se seruauerint: qz remouet fantasmatā: z vexatio nes magnas nō patiē: qetē bonā habebunt: z infanti si collo alligat siue manibz nō fatigabit grauedine aliq: sed fruet qetē. q et dormire nō pnt habeant circa se verbenā: z dormient bene z qescent. similiter si remote egare volueris liga sub coma eque verbenam cuz artemisia: z non fa tigabit equus in equitando.

o De facili ptu mulieris. Recipe radicē Insu ga mi z alliga sinistro femori mulieris: z dum facis fac noduz vt faciliter relegari possit: vt mox vuz pariet statiz soluas noduz: id vt vitalia seu ītesti na nō sequant. Itē hoc remedium multas libera uit i ptu. recipe lauri foliū z cōmasticatuz sup vm bilicuz pone: z statiz piet cū admiratiōe exptum ē.

p Mellicratuz tali mō fit. Recipe vnu coclear d melle fluxili: z tria aq tepide z misceant i simul sic des mulieri bibere. Que mulier in partu labo rat. Accipiat myrrhā z terat: z in vinum mittat z sic bibatur z liberabitur.

q Modo cōtrario. Si femella fuerit cōcepta mulier tunc ē grauis z pallida: z vēter est oblon gus in dextra pte: z in sinistra rotundus: z mamil la in sinistra pte turgescit: z lac magis idigestuz liuidum z aqum: z fusu sup corpus polituz diui dis pars ei⁹ aperte sicut aq: z si lac sup vrinaz eius dez mulieris fuerit fusu: z nate: z sic de alijs. Itē experimētum scio: vey est: z exptum. Si concepit vel nō des ei mellicratum bibere: si tunc circa vm bilicum corrossiones habuerit concepit: si vero nō minime. Jpoc. ampho. lx. particule quinte.

r De tpe apto ad ipregnādū maxime adueni ente vel determinate pgnationē cum corpus nō

Id est dicitur q mē
strua nō quāt.

est plenum cibo: neq; deficiens ē cibo: et vino nō
ultra modū sumpto. Incipiēte igitur purgatione
minus apta est conceptio: sed cum minuitur in vi
ro: et muliere: corporis. n. temperantia adiuvat.
Dalle. liij. reg. tex. comment. xxxvj.

f. C. Piques mulieres min⁹ apte sunt ad pgnādū
seu concipiendum: eo q; pudenda non cōueniūt:
et par locū relinquit: nec valde tenues apte sunt.
Si igitur aliquē impregnānt a malis humorib⁹
expurgent: et ad hoc nil melius q; Theodoricon.
Nicolai et ierapig. et dyamargariton hoc est cum
cognoueris in proximo menstrua venire.

i. C. Si ex nimio calore sit sterilitas quod signat
paucitas mēstruorū cū dolore existēs: et vlcera pu
dendo: et calor totius corporis dabisq; ei q; me
diocriter infrigidant et humectāt: vt lactucas: mal
uas: butyr: porulacas: atriplicē. Si aut os mīricis
sit aptū dicta stipita: fomēta: et medicamēta: sicut
carnes granatorū lēscir: radix rubi mirtus et galla.
Si tunc torqueat matrix curat cū mollificatiuis.

u. C. Ad cōcipiendū: vīscū qd in quercu nascit te
re cū vino: et da ei bibere: et hec deficiēte mēstruo:
et concipiet. Plinius lib. xvi. capi. vltimo. in fine.
Item vulua leporis comedit in cibo. Item aqua
decoctōis lactuce mane da mulieri infecūde: et ea
dem die ad cōceptionē cōuertit: et quando ē ipre
gnata euomet: et retinere non pōt. Similiter si ler
montanū datū apīs vel alijs animalibus ad mā
ducandum quando coire voluerint: et statim con
cipient post coitum: et puluis testiculorū verris da
tus mulieri post menstrua.

x. C. Si ex pinguib⁹ humoribus nō sit cōceptio
purget cū theodoricon et ierapigra: dabit quoq;
superius gūm anidotum in quo mīrit euforbiū:
piper: et thus. Cū aut emēdano facta fuerit men
struis bene exeuntib⁹ cōmīscant cessante pgnā
tione q; si ventositas cōceptionē phiberet his si
gnis scitur in fractiōe hz matricē. his igitur cibis
educat: primo minuat dabisq; ei anisum: ciminuz:
rutaz: anetum: semē feniculi: fenugreci: et similia.

y. C. Si ex clusione matricis ptingit ipediri cō
ceptio q; Aperiat cū calida. i. cū apozimate i quo
decocta est malua et semē lini: fenu greci: butyrū:
oleū: et mel: cū fortiorib⁹ et camomillā: in vuluam
mitte ter bentinā: vitrū: ficus: cassiaz: et sic de alijs.

3. C. Alia bona d' cōceptiōe si mulier vel vir bibat
spumā quā lepus hz circa os qn rodit herbas sta
tim concipiet. Item testiculus dexter mustele tera
tur cum vnguento ypericon: et cū lana pessariet
et coeat: et statim cōcipiet kir. Itē da ei bibere de la
cte eque: et illa hora cōmiscere cū ea: et concipiet
Albertus magnus lib. xxi. cap. Equi. in fine.

7. C. Ad oup partum da dragmas. ij. diptami cū
aqua fenu greci Dias. Plinius li. xxvj. cap. xv. Et
nidus yrundinis in aqua lotus: collocatus: et bi
bitus: et fenu grecū appositum cū melle pdest vel
diamargariton bibitū multuz pdest. Plinius. xx
ij. cap. xix. Serapio cū aqua ciceris vel fastels
bibitum et muscelino pbatum est. Itē lac alteri⁹
mulieris bibat et artemisia ad eius vmbilicū li
getur aut ponatur: et statim ptus exitum habebit.

2. C. De facili partu hec est qn fetus est mortuus
folia iuniperi cum aqua et melle decocta: et bibita
fetus mortuū educunt: et secundinam sanguineaz

post partum eliciunt Haly. Item lac alterius mu
lieris cum oleo bibitum fetus mortuum educit.
Item iaspis hz bonā virtutē ad fetū educēdū. Itē
lac caninū cū vino et melle bibitū statim expellit
fetus. Itē myrrā cū vino bene trūa et calefactaz:
bibat multum pdest. Auicēna Serapio.

p. C. Ad pbandum virginitatē. Recipe semē por
tulace: et sparge sup carbones: ita vrilla sumum
ad se recipiat: et si est corrupta videbis mirabi
lia. vel recipe apium cum radice sua: et appone ca
piti ea nesciente.

aa. C. Nota si ppter humiditatē cōceptio fieri nō
potest signa sunt hec: quoniā humectantur in co
itu: menstrua sunt tenuiora: et si multū his sicca fi
ant dicta supiora membra laborant: et fricentur
vomitu sumant: siccis cibis vtantur os matricis
cum stipticis confortet: scz cū apozimate lentisci
myrrē roseē: balaustie: cimaz rubi: et gallaz: ma
trice sicca: tamen existente cōtraria humida fiat:
sicut balnea vnguenta: et huiusmodi cibi humidi
vinum temperatum et paucum.

bb. C. Ad purgationē mulier q post partuz pur
gari non possunt. Recipe semen lini: et contūde
p optime: et hec decoque cū iuueni arungia: et da
ei ad bibendū. Si vulua mulieris ex coitu inflat
se deat in aqua i q malua ē decocta et liberabit.
Item si mulier nimis luxuriosa fuerit betonicam
et solsequium cum aceto bibat et cessabit.

cc. C. Ad restringendū menstrua seu cōmpsiōnē
eorūdem experimentū verum tres rubus de plā
ragine hoc est tres radices cum folijs decoque in
aqua fluuiali: et da potare mulieri patienti fluxuz
et statim stringit absq; dubio. Ad idem aqua ro
sea potata de sero et mane stringit supfluum flu
xum matricis: et hoc faciat mulier que nimiz flu
xum patitur p ebdomadam integram.

dd. C. De coitu. Nota q inordinat⁹ coitus impe
dit fetum conceptū: hoc est quando femella cum
viro est in coitu: et si ipse masculus inordinate ia
cet similiter et femella: vt si i latere iacuerit sup fe
mellā: et vnum puez generauerit in vno latere cur
uum: et in vno pede claudum et tortuosum et cā hu
ius est: qz inordinate pcessit coitus ab eis.

ee. C. Ut mulier abortiuū non patiat. Recipe cā
crū fluuiale contere eundez: et da mulieri in vino
veteri bibere. Plinius. xxij. cap. vj. Nota aborti
uum dī qd adhuc non est pfecte pductum in na
tura hominis: sed aliquo modo in massam carne
am vel materiam lacteam: illud autez accidit eis
qz plurimū: vel qz materia mēstruorū corrupta ē
vel p prauum motum per quē matrix rumpit vel
per alia mala: et talia: vel q frequenter exire labo
rat in septimo mense.

ff. C. Quomodo fetus nutriat in matrice. Ipo
cras dicit māmillas habere quandā colligantiaz
cū mīrice p qsdā venulas qz abscindunt obstetri
ces: et p illas lac fluit ad vmbilicū puerorū: vnde
falsum est q dicit qdam q puer nutriatur per os
qz sic stercozaret quod falsum est.

gg. C. Ad cognoscendū si fetus in muliere est sa
nus vel non si mulieri impregnate lac fluit d mā
milla significat debilitatem fetus: qz lac fm Ari
sto. et Ipo. ampho. liij. pticula gnte: est ppriū fetus
sic qn fluit de māmilla signū est q fetus ex eo nō

Ad pbm virginitatē

nutrit: sic fetus debilitat. Si si māmilla est idura-
ta: tūc puer est sanus: rō ē qz mēstruū cōuertit in
lac: r tale lac vltius sufficienter nutrit puerū: r
non fluit ex quo oritur feti seu pueri fortitudo.

bb **Ad pbandum sterilitatem videlicet virum**
mulier sit sterilis vel vir. Recipe vinas ambo-
rū in duo vasa separatim: r in illis fursures fer-
menteos: r in cui⁹ vīna vermes sūt ille vel illa
sterilis est. Ad expimentū sterilitatis. Recipe se-
ptem grana ordei: r septē grana fabay: r septē
grana tritici: r pone in ollam: r mingat super ea:
r si creuerint infra septē dies non est sterilis. si
aut non creuerint est sterilis. Albertus niagn⁹
lib. x. tractatus. ij. capi. i. prope finem.

ii **Ut māmille non crescant.** Recipe herbas
que vocat vildinaltem: r contunde bene: r sup
māmillas pone. Itē recipe papauer: r decoquas
in aqua pluuiali: r intingas lineū pannū r sup
pone māmillas p tres dies: r hoc quanto calidi-
us sustinere potest.

Sequuntur problemata de membris genera-
tionis de matrice: r testiculis seu de secretis mu-
lierum.



Quare aialia coeat.

Rñ. fm Arist. q. d
aia sup illa littera
naturalissimū ope-
rū. rē. q pp obser-
uationes spēi: qz si
coitus nō esset oēs
sensus dudū defe-
cissent. **Quid sit**
coit⁹. Rñ. fz Auer-
royz q coitus ē ine-
ctatio maris r fe-
mine p infra depu-

tata a nā ad esse specificatū r pseruādū: ergo dicūt
theologi q qñ coitus sit pp gnationē sibi similis:
tūc nō est maxime peccatū. **Quare coitus tpar⁹**
sit valde conueniēs. Rñ. fm Auiicē. tertio canonis
r cōstantinū in suo libro de coitu: qz pmo coitus
alieuat corpus aīam exhilarat: irā remouet: caput
r sensus pfortat: r aufert multas egritudines me-
lancolicas: qz expellit sumū spermatis a cerebro
r expellit materiam apostemofam: r ergo fm Aui-
cennam vbi supra ex dimissione coitus est tenebro-
sitas oculorū r vertigo capitis: vnde sperma viri
vltra debitū tps retētū cōuertit in venenū. **Qua-**
re distēperatus coitus r nimis assiduus sit valde
nocuus. Rñ p pdictos: qz destruit vīsum: corpus
exiccat. qz dicit Arist. in lib. de generatiōe animalū.
Luxuria est emissio pura humiditatis r cerebrum
consumit vt exptus est: inducit ē febres acutas fz
Auiicennā r maxime abbreviat vitam. fm Arist.
de longitudine r breuitate vite. r Albertus idem
declarat de passere q ppter nimium coitū viuit tñ
tres annos. **Quare** v p p per sensum mulieres p
coitum fiunt fortes r multum formose. Rñ. p Ari-
sto. qz calor spmatis qui expellit a viris p coitum
in eis recipit q calor hz ista opari. **Quare** melā-
colicis r colericis vltra alias cōplexiones vniuer-
saliter magis noceat. Rñ qz eos multū exiccat cuz
per se sunt sicca: ergo eis ethicam inducit. **Qua-**

re flegmaticis r sanguineis: vt dicit Auiicennā va-
let coitus qz in eis est multum de tali materia quia
necessario expellitur a natura. **Cum aristoteles** vi-
cit qz omne animal pingue sit pauci spmatis r se-
minis qz nutrimentū transit in pinguedinē: r ergo di-
ctuz aristotelis itelligit de ericio qd modicū hz sp-
matis: qz totū vadit in spissitudine. **Quare** fe-
melle oīum bzutoz non appetunt coitū post ipze-
gnationē. Rñ. fm albertū qz tunc matrix est firma
clausa r menstrua tūc sunt retēta: ergo ē tūc reti-
nēt appetitus. **Quare** tūc mulieres r eque post
impgnationē appetant. vt dicit aristo. viij. de aia-
libus. Rñ. de mulieribus. fm Salienū recordabā-
tur r arriaban ad coitum: r qz mulieres recordā-
tur ad delectationē in coitu pcedente post impze-
gnationē appetūt. Sed de equa rñ dētur qz ē aial
valde multū comedēs r digerens: r ergo multū se-
minis habet r menstrui ea generant: r calefaciēs
vuluam appetitum r libidinē ducit. **Quare** re-
pleto corpore non ē coeundum. Rñ fm aristo. qz
phibet digestio. **Quare** non sit bonū ventre fa-
melito r manico. Rñ. qz tunc nutrimentū debilitat
r raro factū pcreat mēbrū. **Quare** non sit bonū
post balneū imediate. Rñ. qz tunc pori adhuc sūt
apti: r calor p totū corpus dispus: r ergo coitus
sequēs balneū multū frigescit. **Quare** post vo-
mitum r solutionē ventris minime valeat coitus.
Rñ. qz valde periculosum ē habere duas purga-
tiones. **Quare** qd sit tempus aptissimū ad coi-
tū. Rñ. digestionib⁹ celebratis: scz spaciū mediū
inter mediā noctē r aurorā: qz fm Constantinū val-
de sanū ē dormire post coitū. **Quare** aialia agre-
stia sunt valde furibunda ante coitū vt bzuta: vt
p p de coruis: qz tunc maxime crocitāt: r de asinis
qz tūc maxime solēt insanire r discernere. Et dicit
etiam Constantin⁹ auctoritate Jpocratio. Rñ ga-
tūc oīa mēbra sunt accensa ex appetitu venereo: r
natura laborat ad expellendū supflūū que incēso
disponit ad iram: r ad furore: vt p p aristo. in p-
emio libri de aia: r ergo post coitū statim fiunt mā-
fuenta r mitigata sicut agnelli. **Quare** homines
tpe coitus ē non fremant. Rñ. qz verecūdia q fm
aristo. est prima sensus rōnis non dimittit: sed ta-
mē vt p p sensibili oīs vir tpe libidinis: r coitus ma-
gis dispositus ē ad iram qz alio tpe. **Quare** in
coitu sit tanta delectatio. Rñ. qz coitus est opus
despectū in se in tantū malū ita q oīa aialia abhor-
rent ipm: r si non esset tanta delectatio in eo: ergo
natura in tali delectatione ingeniose egit. **Qua-**
re decisio seminis tpe coitus facit delectationem.
Rñ. fm aristo. ij. de aialib⁹. delectatio causat ex
cōicatione cōueniētis cū cōueniēte q bene ē i cō-
iunctione seminū pp eoz dispositionē adinuices.
Aliter rñ. r melius: r naturaliter: r qz senē qd de-
ciditur ē talis sic sua caliditate facit titilationem in
virga virilī: r qz talis virga est venosa: ergo ex hoc
magna delectatio recipit. **Quare** frequenter co-
euntes non habēt tantā delectationē: sicut raro co-
euntes pp tres causas. rñ. primo q seminis mea-
tus ē bene largus r amplius: ergo semen ibi facit
meatū cuius meatus facit delectationē. Scda cā
ē qz in talibus loco seminis aliqñ emittit sanguis
crudus r idigestus vel alia materia aquosa: r hec
non ē calida: ergo non facit tales delectationem.

Quid sit coitus.

Ex coitu utilitas

Interpretat⁹ coitus.

In mulier a viri coitu magis delectatur.

Utrum in viris vel in mulieribus sit maior delectatio in coitu. Rñ. s3 dictum medicorum q2 maior est in viris intensius generaliter semē eorum est calidū. Sed maior est in mulieribus extensius: q2 ppter semen emittunt et aliud recipiunt: ergo delectatio coitus est minor: vt dicit Aristot. vij. ethicorum. in principio de animalibus. **Q**uare pisces et non coeunt cum nullus piscatorum vidit eos coire: vt dicit Aristot. in ij. de generatione animalium. Rñ. fm Aristot. ibidem q2 imo vere coeunt: sed q2 eorum coitus velox est: ergo non percipit per visum. **U**trum coitus possit fieri per os: vt dicunt quidam de cornicibus q2 rostris suis de osculando coeunt et concipiunt: vt dicunt quidam de muskela q2 concipiat et pariat per os. vnde Aristot. arguit ita. quicquid intrat per os hoc intrat in stomachum et digeritur. sed si coitus fieret per os: tunc digerendo concumeretur nec ad matricem pueniret. Sed beata virgo concipit per aurem: hec non fuit naturaliter: sed miraculose. **Q**ueritur vnde generetur semē viri et q2 sint hic opiniones oppositae medicorum et philosophorum: sed dicendum est q2 humor superfluous conueniens digestionibus viri et mulieris assimilatus: et ab anima figillando susus diuersis formis et figuris. sed alij dicunt q2 sperma sit ex cerebro susum: et decoctione dealbatur: et ergo scdo de generatione animalium debet concipi quod est superfluum humidum multum quod vt sanguis per totum corpus distribuitur. **Q**uare semē viri sit albus: tamē semē mulieris sit rubeum. Rñ. q2 melius decoctum est: et q2 in testiculis dealbatur quorum caro est alba vt in mammillis. **Q**uare fluxus spermatis non sit mensurabilis tempore sicut menstruum. Rñ. quia ipsum non est venenosus vt menstruum: ergo natura ipsum non reijcit: sed ad generationem seruat: aliter respondeo quia non generatur in tantam quantitatem in viris: vt menstruum in mulieribus: ergo menstrualis impulsione non indiget. **U**trum sperma decidatur a membris vel ab humoribus. Respondeo q2 alij dicunt q2 a membris et probant: quia videmus q2 pater claudus generat claudum filium: et pater truncatus generat truncatum filium pater habens cicatricem generat filium cicatrizatum. vt dicit Aristot. de partu animalium: et hoc non fieret nisi decisis fieret a membro. scdo rñ. fm veritatem q2 decisis sit ab humoribus: q2 sit ab ultimo nutrimento: modo nutrimentum non est membrum vel membrorum: sed est humor: sed quid ipsi de patre truncato et filio. Rñ. fm Aristot. in ij. de generatione animalium. q2 sit ppter imaginationem matris de clauda patre existente in coitu q2 generet claudum filium: vt p3. **Q**uare imaginatio matris de clauda generat claudum filium: vt dicitur q2 vna mulier imaginabatur vnum ethiopem depictum in lecto suo et concepit ethiopem. Rñ. fm Aristot. q2 imaginatio de clauda facit hominem claudum: et de leprosa facit hominem leprosum sic in proposito virtus imaginatiua est superior formatiue fetus: ergo percipit sibi fore talem filium quale fuit imaginata. **U**trum semē viri ingreditur in naturam vel in matricem fetus. Rñ. pmo fm medicos q2 sic: q2 tam semen patris q2 matris intrat substantiam embryonis fetus et pbat q2 aliter materia et efficiens coincideret quod est contra Aristot. ij. philosophorum. consequenter p3: q2 semē viri est principium effectus illius: puta vt domificator domus. Item ex alio eadem est materia nutrimenti et generationis

vt p3 scdo de anima. p Aristot. quia eisdem sumus et nutrimur. Sed sperma non dicitur esse materia nutrimenti. fm auerroyum in libro Colliget: ergo nec generationis: vnde et fm veritatem est sciendum quando semina ambo clauduntur in matrice: tunc semen viri disponit semen mulieris ad receptionem anime quo facto conuertitur in fumum: et exhalat per poros matricis: et sic patet q2 solus materia menstrui est materia fetus. **U**trum semen viri vel mulieris sit animatum. rñ. philosophice et medicinaliter q2 non formatur animatum: sed virtualiter: quia mediante spiritu sibi intrinsicis qui est datus operatur vitam. **Q**uare matrix ita auide trahit semē viri: vt dicit auerroyus in lib. Colliget: q2 vna puella sedens in balneo: vbi vir prius spermatisauit concipit et impregnata fuit ex contractione seminis. Respondeo s3 auerroyum q2 ibi matrix a tota materia: et forma specifica attrahit ipsum ad propriam perfectionem. **Q**uare mulieres habent semē rubeum: scilicet menstruum. Respondeo q2 est superfluum scdo digestionis quia celebratur in epate et epate est membrum rubeum: et ergo ipsum similiter est rubeum. Aliter respondetur quod menstruum est sanguis corruptus et indigestus: ergo habet colorem sanguinis. **Q**uare menstruum quarundam mulierum sit liuidum vt cinis. Rñ. aliquando ppter infirmitatem aliquando ppter nimiam frigiditatem et terrestre itatem: aliquando propter sui adustionem. **Q**uare in mulieribus generantur menstrua. Respondeo per omnes medicos et philosophos: quia frigide respectu virore: ergo totum non possunt conuertere in sanguinem: et ergo multa pars transit in menstruum: et dicitur a mense q2 omni mense a muliere debite etatis et sana expellitur: et dico debite etatis: q2 ante. xij. annos non fluunt. et dico sana: quia aliquae mulieres infirme non patiuntur menstruum. **Q**uare menstrua fluunt et expelluntur a mulieribus. Respondeo q2 est materia venenosa: q2 dicit Aristot. primo de generatione animalium. si menstruum cum fluit tangit arbozem vel ramum crescentem arefcit. Item aristot. dicit si canis gustauerit de menstruo tercia die rabidus efficeretur: et ergo natura omni mense expellit a mulieribus: ergo retentum in mulieribus ultra tempus debitum facit molam. fm Aristot. et inducit syncopes et extases passiones et infirmitates. **Q**uare ante tredecimum annum non fluunt menstrua. Respondeo q2 iuencule sunt: et adhuc valde calide sunt ita quod bene digerunt totum cibum: et ergo menstrua non generantur ante illud tempus et per consequens non expelluntur: et hoc est verum nisi malicia vel bonitas complexionis impediat. **Q**uare mulieres vetule post quinquaginta annos non patiuntur menstrua. Respondeo q2 tunc sunt steriles. Aliter et melius. Respondeo q2 tunc natura debilitata est: et non potest ipsum expellere: et ergo congregant in semateriaz malam: ita q2 efficiuntur imunde q2 suo anhelitu inficiunt pueros: et ergo catarrus et tussis in eis humidat et alia multa mala: et ergo fm consilium medicorum summe abstinendum est a vetulis. **Q**uare mulieres sunt ita venenose et non inficiunt seipsas. Respondeo quia venenum non agit in seipsum sed in aliud obiectum. Aliud rñ. et melius quia mulieres consuete sunt in tali materia: ergo eis non nocet: q2 dicit Albertus:

q̄ quedam puella que ad eum ducebatur in *Sonia* comedebat omnes araneas: et fuit ei cibus apertissimus: et Aristoteles de regimine principum ad Alexandrum de puella que nutrita fuit venenosus a regimine indicat Alexandro missa fuit. Quare mulieres impregnate non patiuntur menstrua. Respondeo quia tunc menstruum transit in lac: unde nutriatur puer: et ergo si mulier impregnata patitur menstruum: hoc est signum abortionis.

Quare mulieres lactantes pueros non patiuntur menstrua. Respondeo ut iam quia menstruum transit in lac: dicunt medici q̄ mulier impregnata lactans alium destruit puerum in utero et illum extorcat quia nutrimentum quod uni deberet non potest sufficere duobus: et maxime si ex alio viro sit impregnata. Plinius libro septimo capitulo de cimo sexto in principio. Quare quedam mulieres non lactantes: nec impregnate non patiuntur menstrua. Respondeo ex grandi infirmitate: scilicet ex defectu virtutis expulsiue. unde et medicos in tali casu bene habet minuire de saphena id est vena apud collum: quia hec vena incisa menstrua nimia influentia constringit et ipsa retenta ad fluxum perducit. Quare in primis tribus mensibus menstrua adhuc mulieribus fluunt. respondeo quia propter paruitatem et nouitatem adhuc non permittunt: quia adhuc possunt sumere tantam materiam. Quare oculus mulieris menstruose inficit speculum: ut dicit Aristoteles de somno et vigilia. q̄ nubes sanguinee generantur in speculo. respondeo valde naturaliter q̄ propter talem modum quando menstrua fluunt in muliere: tunc fumus venenosus resoluatur ab ea qui ascendit caput mulieris petens ibi exitum: et ergo tunc mulier dolet caput cooperiens ipsum multis velis et peplis: et quia oculi sunt porosi: ergo ibi petit exitum ille fumus et inficit oculos. ita q̄ vene sanguinee apparent in eis: et oculi sunt guttulosi et lachrymosi: et fit aer contiguus oculis ab oculis inficitur: et ille aer iterum alium usque ad speculum obiectum: et quia tale mundum est et politum. ideo facilius inficitur: et ergo dicit Auicenna q̄ oculus mulieris menstruose proijcit camelum ad foueam. Quare femelle brutorum: scilicet piscium et volucrum non patiuntur menstrua. respondeo per Aristotelem et Albertum q̄ in grossilibus menstruum transit ad pilos: et piscibus ad squamas et auibus ad pennas: et quicumque vult considerare bene potest cognoscere q̄ inter bruta animalia femelle frequentius sunt hirsute quam masculi et piscium femelle magis squamose et auicularum femelle magis plumose. Quare menstruum recipiat nomen a mense. Respondeo q̄ mensibus spatium temporis mensuratur: et motus lune: et quia luna motum suum perficit in .xxix. diebus et octo horis modo luna habet dominium super humida in secundo metheteororum. per aristotelem. et in posterioribus: ubi dicit nulla crescit in fine lune: et quia menstruum est humidum: ergo a mense facit denominationem vel capit. Dicunt enim rustici q̄ omne humidum crescit in luna crescente et ipsa decrescere decrescit. Quare quedam mulieres patiuntur diutius fluxum et quedam breuius ut in sex diebus et quedam in septem diebus: continue autem per tres ut frequenter in iuuenibus. Respondeo

q̄ sunt frigidiores: et ergo in eis plus generatur de menstruo: ergo longiori tempore expellitur: sed alie sunt calidiores: ergo in eis pauca generantur. Queritur ubi referantur menstrua ante fluxum. Dicunt aliqui q̄ in matrice: sed illud auerroys in libro Colliget: reprobatur et dicit matrix esse tantum locus generationis: sed tale menstruum nihil facit ad generationem: ergo respondeo sicut dicitur batur de fluxu emorroidarum et est quedam vena circa spinam dorsum et referuat ipsa menstrua: et huius signum est q̄ mulieres habent isto tempore maximas punctiones in dorso propter expulsionem eius a natura. Utrum menstruum de quo generatur fetus et q̄ omni mense expellitur si idem.

Respondeo q̄ non quia ipsum est impurum et indispotum ad generationes: sed primum est valde purum: et dispositum ad generationes sicut sanguis est valde clarus et aptus generationi. Quare mulieres tempore menstruorum impregnate generant

pueros leprosos et imbecilles. Respondeo quia ut patuit q̄ hec materia est venenosa modo philosophum in libro de causis similitudo cause relictur in effectum. Quare mulieres vni formiter in eodem tempore mensis non patiuntur menstrua: quia quedam in nouilunio quedam in plenilunio et quedam in defectu. Respondeo q̄ hoc est propter diuersas complexionum mulierum: unde licet omnes mulieres respectu virosum sunt flegmaticae: tamen inter se est una magis sanguinea: et sic de alijs. Modo lunatio quilibet habet quatuor quadras: et ille habent quatuor complexionum. Prima est sanguinea. Secunda colerica. Tertia melancolica. Quarta flegmatica. Quare mulieres sanguineae patiuntur in prima quadra sanguinea. Respondeo secundum Galienum in libro amphorismo. et secundum Gilbertum in sex principia tale additum tale facit ipsum magis tale talis: ergo quadra lune sanguinea augmentat sanguinem: ergo tunc sic expellitur. Quia noua luna requirit iuuenes mulieres que sunt magis sanguineae iuxta verbum. Luna vetus veteres iuuenes noua luna requirit. Quare ut frequenter omnes patiuntur in fine mensis seu lune menstrua. Respondeo q̄ est propter defectum lune: ergo eius frigiditas operatur frigiditatem mulierum: et sic patet ut breuiter ista questio. Quare mulieribus ille fluxus magis sit in hyeme quam in estate: ut ipse sciunt. respondeo q̄ in hyeme operatur ad incrementum augmentum: sed in estate per sudorem multum de tali consumitur: ergo tunc minus fluunt.

Quare in tali fluxu mulieres patiuntur dolorem. respondeo quia est confamilis dolori sanguineae projectionis urine guttatis et paulatim: quia sicut stranguria fit ex potu indigesto vias urinales multum subiles ledit. ut fit post balneum. Sic materia menstrualis que est terrestris et indigesta multum vias per quas transit offendit. Quare post fluxum menstrui facilius mulier concipit. Sed hoc est verum quando est coiens cum viro. respondeo quia tunc est melius disposita ad concipiendum: quia tunc est mundificata a mensuris ad generationem non requisitis: et ergo paucae inueniuntur steriles et infecunde sed sunt multum prolificae: ut legitur in Exodo. Cum iudei essent in Babilonia q̄ in breui tempore augmentabatur super babilones. Non fuit alia

id in mēstruo recipiat

25/1/100

ratio quia verſus indei non coeunt cum eis niſi prius ſint purificate ⁊ mūdare a mēſtruo: ⁊ tunc ſunt apte ad concipiendum. ¶ Quare colores multorum mēſtruofarum mutantur in palliditatem. reſpondeo quia talitēpore recedet calor ab omnib⁹ mēbris ⁊ vadit iuuando naturam ad expellendū mēſtrua. ¶ Quare pſuatio caloris in facie facit palliditatem. reſpondeo q̄ mēſtrua ſunt crudi humoris: ergo iſtis fluentibus habet diſcolorare faciem ⁊ pallidare. ¶ Quare mēſtruantes abhorrēt capere cibum. reſpondeo quia natura plus laborat ad expulſionem q̄ ad indiſteſtionē: ergo ſi caperet cibū crudum remaneret crudus. Et crudum abhorreret crudū. ¶ Quare viri coeunt cum mulieribus mēſtruofis efficiunt rauri. reſpondeo q̄ vir ille p̄ anhelitum ad mēbra ſpecialia ⁊ inſtrumenta vocis attrahit aerem a muliere infectum: qui aer attractus facit rauritatem. ¶ Quare aliquę mulieres ſunt ſteriles: ⁊ non concipiunt. reſpondeo ſm̄ medicos q̄ propter multas cauſas. aliquādo ex parte viri: primo ita q̄ frigide nature ē vir tunc ſuum ſemē eſt ineptum generationi. Secundo q̄ ſemen eius aquoſum ⁊ ſtatim a matrice fluit non faciens ibi moram. Tertio propter breuitatem virge virilis vel ineptitudinē: quia tunc ſemē non poſſicitur ad locum debitum. Quarto quia ſemen viri ⁊ mulieris ſunt indiſpoſita: ac ſi vir melancolicus eſſet: ⁊ mulier ſlegmatica. ¶ Ariſtote. in primo de generatione animalium. ⁊ ſcdo de aia. ſicut agens ⁊ patiens debet eſſe proportionata. alias actio impidiretur. ¶ Quare mulieres pingues raro concipiunt. reſpondeo quia habent matricem lubricam a qua ſemē receptum elabitur nec retinetur. Aliiter reſpondeo ⁊ melius quia mulieres pingues habent oriſcium matricum valde ſtrictum quod ſemē impedit intrare: ⁊ cū intrat tūc tarde itat: ita q̄ ſemē in tpe eodē inſrigidatur: ⁊ ineptū fit generationi. ¶ Quare mulieres valde calide raro concipiunt. rñ. q̄ ſemē extinguit in eis ⁊ conſumit: ac ſi pauca aqua ad magnū ignē fundere: ⁊ ergo videmus q̄ mulieres maxime colētes appetitū laſciue ⁊ libidinis maxime concipiunt. ¶ Quare meretrices ēt nō concipiunt. rñ. q̄ p̄ diuerſa ſemina eaz inſtrumēta concipiēdi obfuſcant: ⁊ lubricant: q̄ ſemen eaz non retinet. ¶ Quare vt dicit experientia Alberti: mulier bibens ſaluā coctam cum vino alio anno illo non cōcipit. rñ. q̄ ſaluia eſt multum frigida ⁊ frigiditas vt patuit impedit conceptionē. ¶ Quare mulus ſit ſterilis q̄ non concipiat illud p̄blemma multū laborat ariſto. in de generatione aialium improbando Empedoclez ⁊ Democrituz ⁊ tunc ponit poſitionem iſtam dicens q̄ generatur mulus ab equo ⁊ aſina modo equus ⁊ aſinus ſunt aialia ſterilia: ergo generatū ex iſtis efficiē totaliter ſterile. Alia ponit Ariſto. rōnem q̄ ſemē equi ē valde calidum vt probat pulchre: ſed ſemen aſine magis ē frigidū: ergo qñ iſta ſemina admiſcentur ex eis generatur mulus bene: hec ſunt monſtra diuerſa generatiua in animalibus diuerſaz ſpecierū mulus ex aſino ⁊ equa: ⁊ ecōtrario burdo ex equo ⁊ aſina: priſ ex capris ⁊ porcis: thitirus ex oue ⁊ hyrcos: muſtiria ex capra ⁊ ariete. Sed que ficta cētaurus ex homine ⁊ equa. Monicentaurus ex homine ⁊ aſina. Jte p̄pocētaurus ex homine ⁊ equa.

¶ Quare quedā mulieres concipiunt maſculos. rñ. ſm̄ Conſtātinū ⁊ Ariſto. quando ſemen cadit a dextro teſticulo ad dextram particulam matris: tunc generatur maſculus: q̄ hec eſt pars calida: ⁊ ergo ſm̄ Albertū calor operatur ad maſculinitatē: ⁊ ergo ſm̄ Albertū. Dextra pars vētris magis tumens eſt ſignum maſculi in vtero. Sed alij reſpondent cum ſemē patris vincit ſemē matris: tunc generatur maſculus. Sed cū ſemē matris vincit ſemē patris tūc generat filia. ¶ Quare quedam mulieres concipiūt femellas. rñ. q̄ ſemē cadit ad ſiniſtrum latus matricis qd̄ eſt frigidū rōne ſplenis adiacentis qui ſplen operat femininitatem. ¶ Quare vt expreſſus eſt Albertus mulier iacēs in dextro latere poſt coitum concipit maſculum. in ſiniſtro femellam. rñ. ſm̄ eum: q̄ mēſtrua reclusa fluūt ad illā p̄tē matricis in qua iacet mulier: ⁊ talis ſexus formatur. ¶ Quare mulier habeat matricē. rñ. ſz Auerroyz in libro de Colligēt: q̄ eſt locus p̄p̄ius generationis: ⁊ eſt ſituata in medium mulieris ſicut cloaca in medio ciuitatis: ⁊ ſicut ad cloacam fluunt immundicia ita ad matricem conſiſt ſanguis mēſtruofus ⁊ imundus. ¶ Quare aliquę mulieres pariunt filios graciles: alie breues ⁊ ſpiſſos. reſpondeo ſm̄ Auerroyz vbi ſupra: ⁊ ē ſm̄ Salieny q̄ puer format ſm̄ quātitatez matricis: ⁊ que habet matricē longā ⁊ ſtrictā ēt pueri erūt longi ⁊ ſtricti ⁊ graciles: ſed aliquę p̄ oppoſitū: ergo ⁊ pueri per oppoſitū generantur. ¶ Quare aliquando mulier plures concipiat pueros: aliquando ſc̄z gemellos. reſpon. ſm̄ Ariſtolezes in libro de humana natura in matrice ſunt ſeptem cellule ⁊ receptacula ſeminis: ⁊ tot generaliter poſſunt generari pueri in quot cellulas peruenerit ſemen: ſi diuiſum fuerit: ſed tamen tres ſunt in dextro latere in illis poſſunt generari. Similiter tres alie ſunt in ſiniſtro latere in quibus poſſunt generari tres filie ſeu femelle: ſed ⁊ alia eſt in medio eorum vbi autentici dicunt generari hermofroditum id eſt hominem habentem vtrūq̄ ſexum: ſc̄z vuluam ⁊ virgam: ⁊ ergo ſi pariet vltra ſeptem pueros hoc potius miraculoſus ē q̄ naturaliter. ¶ Quare gemelli ſunt homines ſemi non ita fortes ſicut alij. vt dicunt leges iſtos in duello reputando p̄o medio homine. reſpon. naturaliter quia ſemen ⁊ materia que deberet tranſire in vnū puerum tamē hoc trāſit in duos: ergo ex hoc debilitatur: ⁊ aliquando non diu viuit vel frequenter moritur. ¶ Quare vt dicit Ariſto. impoſſibile eſt gemellos eſſe diuerſi ſexus: ita q̄ vnus ſit maſculus ⁊ altera femella ſz ſēper due vel tres maſculi: due vel tres femelle. Rñ naturaliter non eſt poſſibile q̄ vna p̄ ſemis cadit ad dextram partem matricis: ⁊ alia in ſiniſtram partem: ſed ſemper cadunt ad vnā partē dextram vel ſiniſtram. ¶ Quomodo generatur hermofroditus. reſpondeo per talem modum q̄ in matrice ſunt tres cellule principales vna in dextro: alia in ſiniſtro: tertia in medio in qua viuunt ſemen clauſum generari hermofroditū per talem modum quia natura ſemper intendit generare maſculum: ⁊ nūq̄ femellam: quia femella ē vir occaſionatus ⁊ monſtrū in natura: vt patet in libro de animalibus: ergo quādoq̄ formatur maſculus quo ad omnia mēbra p̄cipalia: ſed tan

Modus q̄
fa.

1 q̄ mulier concipit
ut p̄ am.

dem propter indispositionem materie: et inobedi-
entiam qualitatum seminis non possunt perficere masculum: tunc generat femellam: et ergo dicunt quod hermofroditus sit impotens et membrum virili: et de hoc patebit. **¶** Quare natura non generat duo membra virilia vel duo feminea: sed unum virile et aliud muliebre. **¶** Respondeo quod in natura ponetur frustratio: quod est contra Aristotelem primo celi et quarto metaphisice. quia deus et natura non facit frustra. **¶** Utrum iste sit habendus pro viro vel muliere videtur quod consideranda est quantitas unius membri super alterum: et dicit considerare secundum quod membrum sit potens in actu venereo: et sic secundum muliebre: tunc est mulier: si secundum virile tunc est vir. **¶** Utrum talis debet baptizari in nomine viri vel mulieris. **¶** Respondeo quod nomine viri ratio nomina imponuntur ad placitum: ergo secundum dignius debet imponi: modo vir dignior est muliere: quia omne agens prestantius est suo passio: ut patet per aristotelem tertio de anima. **¶** Utrum ipse debet stare in iudicio loco viri vel mulieris. **¶** Respondeo secundum viam iuris quod primo debet iurare antequam mittatur ad iudicium quo membro possit uti: et secundum hoc est admittendum et si uteretur ambobus membris: secundum tamen occasionem ipse esset crematus et sic semper queritur problema. utrum possit procedere ad sacros ordines. **¶** Respondeo secundum iam dicta. **¶** Quare natura facit monstrum: ut patet per aristotelem secundo philosophorum. quod sic: nam priuatur suo fine monstrum: ut patet per aristotelem ex indispositione materie vel effectu sit constellationis specialis: ut temporibus Alberti in Colonia generabatur puer ex applicatione lateris dextri omnes sere aperiebantur: et applicatio nelateris sinistre econuerso claudiebantur. Item albertus dicit quod in quadam villa vacca peperit filium semihominis: tunc rustici suspicabantur de pastore coxisse cum vacca volebant eum cremare. Sed astrono. dicit veritatem non fuisse. Item verba alberti nos vidimus equum habentem mensi pedes anteriores: posteriores portabat circa collum: et os non texit super terram. Item hec verba asserere albertum nos vidimus bicorporum et corpora in nullo iuncta erant nisi in dorso et habebant duo capita quatuor brachia: alias et quatuor pedes et ibant ad quamcumque partem vertebantur. **¶** Item verba alberti narrauerunt nobis quedam sincere digne quod viderunt talem hominem in quo erant duos homines contincti in dorso: et unus fuit iracundus: et alter mansuetus et vixerunt duos annos unus prius moriebatur: alter tandiu vixit donec ex fetore fratris moriebatur. **¶** Queritur quomodo hoc sit. **¶** Respondetur per talem modum cum semen funditur ad cellulas per generationes duorum gemellorum: tunc contingit quod intersticiis et pellis medianas inter illa duas cellulas rumpatur et sic semina confluent: et ita in dorso ramificantur: et coniunguntur habentes dua capita distincta. **¶** Utrum hec sit unus homo vel duo. **¶** Respondetur secundum aristotelem quod respiciendum est ad cor. unde qui duo habent corda duo sunt homines. **¶** Quare aliquando generatur puer cum magno capite vel cum sex digitis in una manu vel quatuor tantum. **¶** Respondetur secundum albertum super secundum

philosophorum quod propter superfluitatem vel defectum materie. Unde quando materia superfluit: tunc generatur caput aliquando magnum vel sex digiti in manu vel in pede. Sed quando materia deficit: tunc aliquando generatur membrum minus quam deberet esse. Aliquando generantur membra pauciora quam deberent esse: et hec Albertus et Averroys distinguunt in secundo philosophorum. de quantitate continua et discreta. **¶** Quare ex inordinato coitu: scilicet laterali vel stationario sepius generantur pueri indispositi et menstruosii. **¶** Respondetur: quia tunc semen inordinate locatur in matrice. ergo inordinate formantur: unde aliquando generantur gibbosi pueri et quamplures defectus habentes. **¶** Quare mulier sit monstrum: et dicitur quod non sit homo. **¶** Respondetur ex secundo philosophorum: omne occasionatum est monstrum: sed mulier est vir occasionatus: ergo est monstrum: probatur minor: quia natura nunquam intendit generare femellam: sed semper masculum. Sed quia natura femellam generat hoc est causaliter propter materie dispositionem: et inobedientiam. ut dictum est. **¶** Quare quidam puer totaliter assimilatur patri: et quidam totaliter matri. **¶** Respondetur quod quando semen matris vincit semen patris: tunc puer totaliter assimilatur matri. Si autem semen patris vincit semen matris: tunc totaliter assimilatur puer patri. Sed si semen in parte vincit: et in parte non: tunc in parte puer assimilatur patri: et in parte matri: sed si menstruum et materia fetus trahit ad se semen operationis spermatis: tunc erit similitudo ad matrem: et potest esse temporaliter: aut in membro principali: et non in secundariis: tunc puer erit similis in complexione cordis et sexui. Sed in aliis membris patris aut econuerso etiam puer erit similis in complexione: et corde patri: et in aliis membris similis matri. Et sic videmus pueros aliquos fratres multum assimilare patri: et alios etiam videmus pueros totaliter matri assimilari: et alios totaliter patri: et alios partim matri: et partim patri. **¶** Quare pueri ut frequenter assimilantur magis patri quam matri. **¶** Respondetur quod hoc est propter imaginationem matris et dispositionem patris in coitu. **¶** Quare pueri ut frequenter assimilantur aui et auius quam propinquis parentibus. **¶** Respondetur per Aristotelem quia virtus auorum est impotentia in cordibus parentum generantium. aliquando propter similitudinem nutrimenti: tunc fetus formatur in similitudinem aliquorum auorum. **¶** Quare ut dicit Aristoteles similitudo puerorum ad auos non extendit se vitra quatuor generationes. **¶** Respondetur secundum Albertum quia omnis virtus quatuor gradibus mensuratur: ergo generatiua. Sed Aristoteles dicit quod aliquando puer assimilatur auo cuius a populo et seculo non est recordatio. **¶** Quare pueri sunt de diuersa dispositione: quadam magis dura et quadam magis molli. **¶** Respondetur quod propter dominium diuersorum elementorum: et quia ossa fiunt ex parte menstrui magis terrestri: ergo semper dominatur: sed medulla et cerebrum de parte eius magis aquea: sed spiritus vitalis naturalis et animalis ex parte magis aerea: et calor naturalis ex parte magis ignita. **¶** Quare fetus succels

Vacuus peperit semihominem.

sive sit fortior. respondeo quia in primis sex diebus
semina habent colorem lactis: sed in novem sequen-
tibus ab illis sex diebus: tunc semina habent co-
lorem rubeum: quia tunc transmutantur in natu-
ram sanguinis ipsi et coagulati non fluentes. si-
cut massa carnea: quia ex propinqua dispositione
ad carnem: sed in .xij. diebus post illos. ix. sequen-
tibus illa materia condensatur et solidatur ut pos-
sit recipere organizationem et formationem: quia
res nuda non tenet impressionem: ut patet per
Aristotelem. ij. de anima. et sic singulis diebus usque
ad partum aliter disponitur: sed quomodo per sin-
gulos menses regatur a planetis hoc est in libro
Boetij. Unde nota secundum Galienum in primo men-
se fetus sit purgatio sanguinis. in secundo mense
expressio sanguinei corporis. in tertio formantur
ungulae et capilli. in quarto movetur fetus: et ergo
tunc mulieres nauseant. in quinto tunc recipit simi-
litudinem patris et matris. in sexto nervorum con-
strictiones. in septimo ossa formantur. in octavo
natura incipit movere ad exitum et fetus dei bene-
ficio completur. in nono ipsum a tenebris in lucem
producit secundum communem cursum. Utrum puer
in utero stercoreizat vel non. respondetur secundum inter-
tione medicorum et philosophorum quod non: et
ratio est quia non habet primam digestionem que
est in stomacho: quia cibus non venit ei per os: sed
per umbilicum: et ergo non urinat sed sudat quod
videtur esse parve quantitatis et reservatur in pa-
niculis matricis et secundina: et in alijs: et in partu
pueri exeunt in magna quantitate. Quare secundum
communem usum et cursum pueri exeant in nono
mense respondetur: quia tunc est totaliter perfectus
vel quia tunc regat planeta benivolus: scilicet Jupi-
ter qui est amicus nature. Nam secundum Aristotelem est hu-
midus et calidus: et ergo temperat malitiam satur-
ni frigidi et siccitatis ergo omnes pueri nati in hoc men-
se ut frequenter sunt sani. Quare pueri exeun-
tes octavo mense omnes moriuntur. respon. quia
illo mense super puerum saturnus habet dominium
qui est contrarius et planeta maliuolus: quia frigi-
dus et siccus: et utraque pars contrariatur vite: vi-
citur etiam saturnus quasi satur annus per con-
trarium: quia per eum esurimus. Quare pueri
exeuntes septimo mense ut frequenter moriuntur
et dicuntur illi pueri exeuntes septimo mense ut fe-
tus lune. respondetur quia luna est frigida: et ha-
bet dominium super puerum: et ergo habet ipsum

necare. Quare puer exiens statim flet. respon-
detur quod propter subitam mutationem aeris et in-
frigidationem que frigiditas maxime ledit suam
teneritatem. Quare ut dicit Aristoteles. fetus post
septimum mensem laborat ad exitum. respondetur
quia tunc ligamenta quibus matri alligatur il-
la incipiunt debilitari: quia propter sui magnitu-
dinem consumitur nutrimentum ipsorum ligamen-
torum. Quare puer cum exit ponit digitum suum
ad os. respondetur naturaliter: quia puer exit de
matre: ut de calido lauacro. ergo intrans aerem
frigidum ponit digitum ad os propter caliditatem
oris. Quare ut sciunt mulieres. puer exiens et
clamans in utero sit signum malum. respondetur
quia est signum quod non vivens exibat: et ergo dicit
Theologus: quia tunc cognoscit se privari intuitu di-
vino propter carentiam baptismi: ergo clamat.
Sed aliter respondetur: nam si non maxime pate-
retur nec clamaret: ergo clamor est signum passio-
nis et mali. Quomodo puer exeat. respondetur
quod primo capite premisso: et si aliter exit per crura
vel per brachia interficit matrem: et seipsum. Qua-
re mulieres comedentes infecta cibaria abortiunt
respondetur quod ex illis generatur semen infectum
quod anima abhorret: et projicit ab agro nature
scilicet matrice quia non est apta quod ei forma no-
bilissima infundatur scilicet humana. Quare co-
rea et lactatio et saltus ut aliquae pessime bene sciunt
abortivum faciunt. respondetur quia per tales mo-
tum ligamenta embryonis solvuntur et laxantur: et
per consequens abortivus sequitur: quia materia
diutius retineri non potest. Quare iactus fulmi-
nis et tonitruum faciunt abortivum. respondetur quia
vapor ibi adustius qui faciliter ledit matricem in-
fantium per omnia tenella intrans per poros ipsius
occidit. immo Albertus dicit quod si puer actualiter
vivit in utero materno per fulmina tonitruum in-
terficitur. Quare mulieres iuvenes: et non anti-
que abortivum faciunt. respondetur quia corpora
iuvenum mulierum sunt magis porosa et rara: er-
go vapor fulminis citius intrat faciendo abortivum.
Sed mulieres vetule sunt compacte: ergo non se-
quitur occasio in eis. Quare ut dicit Aristoteles. ni-
mium gaudium facit abortivum. respondetur quod tem-
pere gaudium calor vadit ad exteriora: et sic matrix
propter paucitatem caloris facit abortivum. Eadem
ratione timor facit abortivum. quia tunc calor vadit
ad cor relinquens matricem.

Causa abortus.

Unguentum album ad oculos qui oculi sunt sã gumolent et fluitent. Recipe pulueres tunc quartã partes et de butiro q in malo mente è laboratum partes tres et de oleo olive duas ptes et liquefac et cõmice simul et illos pulueres sperge in illum cõfectũ et cõmice bene donec i frigidabunt.

Contra casus de alto vt si aliquis de alto ceciderit et sanguis ex lesione in ipso coagulatus fuerit et vt tunc sanguis ille spergatur et dissoluatur in homine Recipe tres carbões viuos q̃r̃cinos et extingue eos i vino bono albo et mane calidum hoc sepe bibatur.

Nota si aliquando mēbrum mutiat seu amputatur tunc debet bene curare cum dialtea. tale vnguentum sic factum. Recipe fenugrecum et semen lini et contunde in pulueres et sparge illum puluerem i butiro et permute p vnũ vel tres dies. postea recipe fenum grecũ et semen lini. Require residuum in iutera.


Contra incisionē vene magne in collo ita q̃ si sanguis cessare non possit tunc cõsumat illa vena pulchre ad inuicem vt sanguis nō possit exire hoc pacto sperge et cõcure pulueres rubeos sup illud vulnus. pone super eo emplastrũ et permittat facere ad diē quartũ illud debet fieri ex ciaro oui et thurcum stupis mixtus post hoc medefi sicut alia.

Ad vicus maturadi decoque semen lini cū butiro et suppone tandiu donec sufficit. Mobile vnguentus contra apostema et vlcera et consequenter antiqua vulnera ruptora. Recipe sepum bouinũ et liquefac in patella et obhapet et cola ad altq̃ vas et moue tā diu do. nec fiet odoriferus et q̃to plus mouebis tanto melius erit ad oia vul.

De variolis et variole vocat venice sicut puri solent habere frequētius et quadoq̃ antiqui habent et sunt duobus modis. vno modo sicut a be alio modo iunt ruo. si abbe fuerint mouatur totus corpus in panum ancum. Requiere residuũ in isa.

Lesio capitis cum buca lapide col esto vel quouis alio instrumēto sine aliqua apertura.

Albula in oculos. Surditas. Nasus incisus vsq̃ ad aures. Apostema retro aures. Sacule faciei. Labia vlcerosa.



Recipe surfures tritici et excoquant. deinde ad datur arugia et fiat pulmentum cū pinguedine et hec ponat ad loca tu morosa et inflaturam si aut hec non pderint si bitu: precidat cutis in capite et videat si aliqua ossa fuerint cõfracta i capite. Require in iutera.

Apostema solet i tribus locis euenire in corpore humano retro aures vt in collo hoc est in regione animata et tũc fustienbotomia d cephalica vtriusq̃ brachij pl̃tamen de parte sana iuxta vlcutes tenous vt si nō est antiquus plus minatur.

Versus. Hec sunt pensanda medico curare volenti. Ars etas regio virtus complexio forma. Mors et simphonia cõmixtio tempus et aer.

Incisio vene vbi sanguis cessare non vult.

Contra fixum aut pfudum vulnus. si huiusmodi vulnus multum cruentauerit tũc debet cõborri loder in pulucrem et spergi super tale vulnus. Etia recipe sub stantia quã pergamentis de pergameno excoctant et pone super tale vulnus et etiam clarũ oui cū canapeis stupis mixtũ et emplastrũ ex eo factum.

Si aliquod vulnus fixum fuerit pfude et sanguis nō exiit cū tamē instrumentũ sit iaz excoptũ tũc debet iacere sup ipm vulnus vt sanguis et imundities exierint ante et cū adhuc putredo et imudicie nō exierint debet tantũ sufficere in vulnus et tũc tali anp. lru. exbit totum Requidũ require in iutera.

Contra vulnera que suntelo sigittata tũc lignũ de ipso telo non debet extrahi alias ferrus nestretur inueniri. sed si lignum fuerit extractũ et ferrum interius retinetur tunc debet queri spatula sine acutie eius

Si vero fuerit apostema in inguibus circa pubes tunc minuitur de vena vaginali hoc est de vena que est sub talo et dicitur vena mēstruosa mulierum seu vena vaginalis.

Contra tumorem et inflaturam vulnerum. Recipe thus contunde in succo lolij et cardũs cū farina ordeacea tũc tumores et inflature p cū inungat seu emplastretr in arcum vulnris et beuiter curabuntur.

Remedium de paralisi et vnguentum. Recipe artemisiã cum semine suo et millefolium cum semine suo et semē vrtice et iusquiami ius radice et semine et accipieram et xungiam. Requiere in iutera.

Contra verrucas. Accipe siccus caninus et terrã in qua vrinatur et decoque i vrina ppria et emplastretr sup verrucas i mper renouado et deat. Item hecidis curat papm vagit verbon bohmice noua hõsh.

a Cum nasus inciditur ad ipsas aures: tunc d³ consui filo tenui et subtili adinuicem: et post hoc debet conficere sibi emplastrum ex claro oui cum albo liquore mixtū bene cū stupis: et hoc emplastrū ponat sup vulnus eius: et radiū pmittatur in vulnere donec patiens estimabit qd sit vulnus: curatum in toto: attamen cāna debet intrudi ad nasū: ideo vt foramina non succrescēt: et vt patiens possit suspirare. Aliud est verum recipiat illud emplastrū de vulnere: tūc nāsū p̄matur bene manibus adinuicem: et tūc ex nouo tale emplastrū vt prius facere nō p̄matur donec fiet durum: deinde detur talis potus. Acc. zambi benedictam globosaz spēs tiriace et vneytrauth cū floribus: hec oīa decoque simul in vino aut ceruisia: et hoc si fuerint herbe sicce. Sed cū fuerint virides: tunc debet cōtundī: et dare patienti ad bibendum: et sanabitur.

b Contra fluxum vulneris in capite fuerit vuln⁹ et tergat imundities siue putredo cū aliquo pānīculo subtili de vulnere eius: eo qd cerebrū putresceret in capite hoc facto debes conficere pulueres rubeos: qd illi sanant omnia vulnera: et fistulam: sed ita qd prius debet mundari a putredine cor: poris etiam istum puluerem secure potes seminare super vulnus ipsius capitis.

c Contra offensionē capitis cum baculo cultello lapide vel quocūq; alio: ita qd multūz dolet: et sensum aliquādo p̄dere machinat: et totaliter p̄didit: sed tamē caput eius non est incisum: sed solum infractum per verbera hūc ita curabis: minuatur sanguinem de vena cephalica: donec sanguis sanus exeat: et conficiatur super loca dolorosa istud emplastrum vt inferiori circulo docetur.

d Etiam sūme considerandū est aliquis efficiat vulneratus: et principaliter ad caput: tunc maxime deberet precauere: vt non bibat vinum forte: et non sumat carnes non bene coctas: et non accedat mulierem neq; intueatur. Similiter non loq̄tur multa ne rōnem perdat. Sed si nimīū fuerit infirmus: ita qd comedere non poterit: tūc detur sibi p̄fusiō tenuis cū caseo decocta ad bibendū. Etiam potest sumere pulmentū cū ceruisia coctūz post tres aut quatuor vel quicūq; dies dentur ei seruicula delicata et hoc si fuerit calidus in seipso: et seruicula debent ei dari que ipse appetit.

e Contra surditatem remediū probatū. Captatur sal pro vno denario: et ponat ad mūdā ollā: et cooperiat bene vt nullus vapor exeat ponatur super ignem: et suffletur ignis recēter sub olla: ita qd per calorem magnū sal liquefiat: et confluetur in globū. Et tunc remoueat et infrigidet: postea bene cōcute in mortario: post hec perfora raphanum: aut rapam. aut maguderum: et repleatur illo sale: post hoc cooperiat bene illud foramen cū illa particula quam prius extraxisti de raphano vel de rapa: post hoc fode in terram in mūdo cellario si terra fuerit humida multū et foris: et cooperiatur viceruēsa qd taliter maneat per triduum: et tūc recipe per tres dies: et serua istud in vitro: et sic fundatur in aures.

f Contra tumorem et vlcerosā labia vnguentum. Recipe sepū hyrcinū cū pice noua: et arungia ancazum: et cū sepo ceruino conterant simul in q̄titate equali vnius cuiuslibet liquefac ad ignē:

et vngelabia: et sanabuntur in breui: et si fuerint labia tumorosa fiat minutio de ipsa lingua: et cessat tumor labiorum.

g Unguentum ad maculas faciei probatum. Qui vult priuari maculis in facie existentibus.

Recipe limacem cū sua concha: et concham ranarū: et alumen: et alestem: et gyantku: et contūde illa simul: et scute ad nouam testam: et combure bene: et illos cineres commisce cū lixiuio de vitibus facto: et ex illo faciem mane et sero laua.

h Pulueres corrosiuos qd carnem superfluum de vulnere crescentem bohemice d³ vniemāio appellat sic fac. Recipe vitriolum viride: et impone in ollam nouā: et obstrue cū luto sapientie: et impone ignem forte combure bene: et postea effunde parum de aceto vini: et statim post hoc contūde et habebis puluerem corrosiuū: et illū sup carnes predictas sparge: et corrodet eas.

i Si aut apostema generatur sub brachio fiat flebotomia de mediana: aut pulmatica: aut p̄pe paruum digtum in parte opposita: et fm finimodum de eodem brachio.

k Quando aliquis esset trāfixus gladio vel hasta da ei bibere ceruissiam tepidam cū pinguedine serpentis.

l Si intestinū magnū incidet: aut stomachus hunc debes consuere filo sericeo: et subtili et spargantur super illa vulnera pulueres rubri.

m Unguentū cōtra vulnera tumētia: sed non fluentia qd sūt percussione sicut plage: vt puta fistibus et baculis: vel quibuscūq; instrumentis. Recipe duas libras plantaginis: et duas libras garbei: et millefoliū: vitriolum albū. i. quartale: Salinam: et vitergiō: quatuor libras contūde bene cū iij. lib. arungie: et cūz. ij. lib. zuchari: ista oīa simul bene decoque et misce bene cum spatula inferius vt bene cū aruina temperent: postea expulne totum simul p pannum et tere herbas que manserunt post expressionem: et illa contūde cum arungia et serua.

n Oleū ad vulnera qd in pedibus sunt quasi incurabilia qd boies cōiter habent: et illa vulnera habent foramina profunda illud oleū sic fac. Recipe lignū iuniperi: et incide in partes minutas: et recipe ollam vnā et fode in terrā: pone super eā aliā ollā multis foraminib⁹ perforatam in fundo: et loca eā sup illam in terra sepultā loco cacabr: et ipone in eam partes de iunipero incisas: et sic tūc circūlinias ollas cum luto sapie: et pone ignē fortē i circuitu ollaz: et sic stillabit oleū qd valet aux et argētū: et p̄cipue ad vulnera p̄dicta sanāda.

o Si alicui clauus ferreus vel ligneus vt qd cūq; aliud acutūz ad pedē intrauerit hoc sic curabis. Recipe saxifragā: et cōrunde: et pone sup locum in quo sit talis clauus. Idē faciunt flores fabe supposite aut stercoza murilegi: et exibat clauus ferreus vel quodcūq; instrumentum fuerit in ipsa carne.

p Cōtra pruritū magnūz cūz lixiuio ex vitib⁹ paruis vngeloca fricādo: et sanaberis sine dubio vel vitice decocte cum vino et collate per pāniculum in balneum corpus tali brodio illinitū fricando cessat. Sed prius liniatur quādo sudari incipiat.

q Si telus vel sagitta fuerit in pede: lignū nō est excerptū excipiat p te: si ad vtrāq; partem vulnus penetratū fuerit: tunc debes laborare p illud foramen tentā extrahere sicut in vulnerib; vsus est: ita vt attigat vna tenta: aliam ⁊ sanetur sicut ⁊ alia vulnera.

r Si vō tam pfunde fuerit intrinsecus q excipi nō valeat: tūc recipiat genziana: ⁊ d; poni ad foramē vt fiat vulnus amplū: ⁊ foramen magnum vt sagitta eo facilius exire possit ad hoc capiat apostolicon magnū dimergans. Steinyuorcz. ⁊ polipodiū ⁊ contūde bene adinuicē: et ex illo fac emplastrū ⁊ pone sup vulnus ⁊ extrahet sagitta.

¶ Aliud emplastrum.

f Et si tale vulnus fixū aut pfundam multū cruetauerit. Accipe thus albū sanguinē draconis vinuz nigrū: sel vnd plustein. i. lapidis ematit: hec omnia contunde in simul: ⁊ fac emplastrum cum claro oui: ⁊ illud confectum super stupas ponatur ⁊ vulnere applicetur.

t Contra vulnera fluētia ⁊ dolorosa. Recipe anguillam ⁊ excoque ⁊ accipe pinguedinem ⁊ conserua in mūdo vasculo: ⁊ excoque gallinam non intingēdo cū aqua pinguedinē ⁊ congrega ipsi pinguedinē ⁊ accipe sucū saluie: rute: ablinthij: ⁊ marubij: ⁊ mente siluestris: ⁊ tempera in simul: ⁊ vnge quando vis cicatricem ⁊ sanabitur.

u Unguentū bonū ad sanguinē retinēdum: vbi fuerit vena incisa. Conface thus: ⁊ alce: adinuicē ⁊ admisce clarū oui hanc tēperatiōē optime commisce: ex illa fac emplastrū donec vene ⁊ vuln; adinuicē claudent: ⁊ hoc fiat donec vulnus sanabitur in toto semp emplastra noua preparādo.

x Cōtra putridas carnes ⁊ mortiferas. Recipe argillā de fornace bene cōcrematā: ⁊ tēpera cum aceto ⁊ appone cucumeres equaliter sumēdo: ⁊ sine vt bulliant: ⁊ tūccola p panniculū hoc facto recipe tertiā partē illius cocti ⁊ pmisce cū oleo: ⁊ fauo mellis ⁊ vttere bis vel ter ⁊ sanaberis.

y Contra inflaturam faciei vel alias vbicunq;. Recipe scabiosam ⁊ decoque eam vsq; ad consumptionē modice aque: ⁊ cū hac aqua madida bene inflaturam pannum inunctum superpone inflature predicte quo siccatō iterum madida ⁊ fac sicut prius ⁊ in triduo sanaberis.

z Contra struma que in collo generatur. Accipe sucū raphanī: sal: vinū: acetū: ⁊ confice totus in sinigmate in aliquo vase ⁊ mittas ita per noctē stare illo vnge apostema seu strumam ⁊ decider peribit illa struma si sepius hoc feceris.

⁊ Contra panaritium hoc est quando quedam pustule albe i circuitu vulneris generantur bothonice: pizymiet. Recipe arūgiā antiquā nō saltam ⁊ vermes quōdā q multos pedes habent ⁊ sunt oblongi ⁊ parui ⁊ ab aliquibus centipedes vocant seu appellantur hos vermes contūde valde bene cū aruina antiqua ⁊ emplastra sup dolorem.

⁊ Ad solidandum ossa fracta. Accipe lumbri cos ventris ⁊ contere in puluerem ⁊ cōmisce puluerem de lumbri cis factum cū oximelle: ⁊ emplastrum inde fac ⁊ ossibus fractis superpone ⁊ mirabiliter consolidat ossa fracta.

⁊ Unguentum contra omnia vulnera quod cito generat carnes ⁊ replet. Recipe o oleo oliue

quatuor lotb fani mellis. iij. lotb. gūmi arabici ⁊ thus verum de quolibet. j. lotb. ⁊ molle sicut farina: ⁊ misce simul totum: ⁊ liquefac super ignē modicum: ⁊ moue continue in olla ne comburetur ⁊ operare illo vnguento quando vis.

aa Contra incisionē cerebri vel iecoris vel visceris: hec. n. oia sunt mortifera ⁊ insanabilia. Si vō intestinū magnum aut stomachus incisus fuerit hūc debes cōsuere filo sericeo ⁊ subtili: ⁊ seminetur sup talia vulnera pulueres rubei de gbus patet alibi hoc facto curant vulnera huiusmodi habita sanguinaria cū saluia: ⁊ si nollēt curari: tūc cerebrū est incisum hoc taliter cōsiderare debes q vulneratus rōnem pdet: ⁊ oculi eius rubei erunt oia quecūq; comedit nō valebit retinere. Et non poterit sedē habere lingua eius magna efficit: ⁊ palpat sup caput ⁊ lamabit emplm d capite suo.

bb Cōtra offensionē capitis q fit multipliciter. Aliquādo. n. cerebrū penetrat: ⁊ aliquādo solum cutis offendit ⁊ inflatur cerebrū vulneratū: ⁊ inficit modo si cerebrū vulneratum erit: tūc videri bene debet ne ossa essent in vulnere: hoc facto excipiatur ⁊ imponatur ad vulnus ei; sericeus panniculus. Si vero sericū nō habet: tūc panniculus ali; subtilis ⁊ paruus. Et idē panniculus illiniri debet prius mūdo lardone pro eo vt tercio die facilius de vulnere excipiat: post hoc videri d; vtrū cerebrum fuerit incisum ⁊ vulneratum: q; si cum claro oui supponeretur: tūc siccare in vulnere ⁊ affumeret cerebrū secus: ⁊ ex illo homo mortem intraret. Ideo debet panniculus illiniri quin facit tpa putrefieri ⁊ immundiciā effluere ab eisdem.

cc Nota q prius vulnera singulis dieb; bina vice debent ligari: ⁊ hoc cito facere nō plangando ⁊ primitus lesus non debet spaciari nec deambulari: ⁊ cum tam ipsa vulnera sanient ceperint: tunc semp mundus panniculus d; imponi tps vulneribus q; per hoc subito curant ⁊ succrescēt.

dd Si aliquis homo ceciderit super caput: ita q collū ei incuruatur: ⁊ post hoc loqui non pōt. Illi statim os aperiatur ⁊ ponatur lignū inter dentes eius ne claudere possit: ⁊ debet calcare super humerum eius ⁊ trahere caput eius fortiter vt ad locum priorem caput ⁊ collum situetur: post hoc vngatur dialtea ⁊ sanabitur a timore.

¶ Ista residua deficiunt in aliquibus marginibus figure precedentis vbi consimiles littere alphabeti comprehenduntur.

A Tūc excipiatur: ⁊ post hoc curari debent sicut p scriptū est de sanatione vulnerum ⁊ conficiat emplastrū de apostolicon ⁊ ponatur sup vulnus: q; istud exhit totā imundiciā de vulnere ⁊ cito curabit.

B Et ipone i aquā ⁊ mitte per quatuor dies stare ⁊ si vis potes calamētum apponere modicū: ⁊ sic infunde in sacculū ⁊ exprime sucū illum: ⁊ accipe maluam campestrē: ⁊ coque simul cum omnibus supradictis herbis in butyro ⁊ cola per sacculum: ⁊ tunc recipe ceram ⁊ resinā: ⁊ galbanū: ⁊ liquefac oia in simul: ⁊ tūc cōmisce cū omnib; supradictis.

C Aqua inunctū ⁊ decoctū in lentibus ita calidū vt cū lingua canis expertū est: q; attrahit statim materiā. Si fuerint rubee inuoluant in pannū rubeū circa oculos tūc vttere repcussiuū seu recuperatiuū ne exeant p oculos: ⁊ circa gulā cū gargarismis.

D veterem et resinam seu picem albam castoreum novum recem et oleum oliue et accipe medullam cervi vel equi iuuenis et vinum vel acetum coctana si habere poteris et hec omnia simul coctum de valde bene et post hoc pone in modum ollam et cum aceto vel vino bene decoquantur ad bonam horam et tunc per pannum exprime et in pixidem pone et ex hoc mane et vespere locum dolorosum unge bene.

E quod in vulnere continetur malum et post hoc in fundo sed modicum vinum ad vulnus quia illud modum dat vulnera et putrefieri non permittit.

Unguentum contra siccitatem membrorum. Quod aliquod membrum exsiccat in homine sic conficiatur.

Recipe luttum integrum et impone ad vnam aucam et assa aucam vnam cum catto et pinguedinem que in de stillauerit collige et serua et cum eodem membra que exsiccati incipiunt perunge. Si vero totus homo exsiccat seu omnia membra hominis tunc recipe cattulos iuvenes et excoque eos in caldari et sic ille humectetur in caldari illo seu in brodio in quo cattuli sunt decocti et sanabitur deo iuvante.

Confectio vnguenti attractivi.

Recipe sepum cervinum seu arietis castrati vel hyrcinum et liquefac in patella et appone parum de creta munda et modicum de resina hoc est quartam partem resine respectu sepi et oleum oliue et contunde totum bene in mortario.

Unguentum fuscum contra vulnera fetida ubi non sunt crescere carnes.

Recipe oleum oliue et lardum sub vno potere et pone ad patellam ut simul buliant paulatim postea pone tertiam partem de resina et tunc recipe pulveres thuris et myrrae nigrae sit de myrra plus quam de thure et coque hoc totum simul et sic postea appone partem de galbano et indurare debes cum cera modica.

Unguentum dyaquilon et vnguentum prutenicum pruskmaztb.

Recipe litargirium et coctere simul. Lenobrium et insperge in oleum oliue et pone in patellam eream et mitte bulire semper mouendo cum spatula et quando videbis quod incipiet rubescere tunc appone modicum de cera plus quam de galbano et effunde super aquam mundam et si vis habere pulchrum tunc appone serapinum et erit multum delectabile.

Unguentum album sic fit.

Recipe cerusam et thus album et appone de galbano modicum et lapillos albos qui in cancro reperiuntur et contere omnia in puluerem et liquefac cum aqua rosacea et contere bene usque ad consumptionem aque et commisce cum oleo oliue et fac bulire.

Unguentum retentiuum ad vulnera fetida.

Recipe mel et liquefac in igne et aquam rute commisce illis simul et habebis.

Unguentum populeon quod vulnera inflant.

Recipe nodulos de populo de tali arbore et contunde illos cum noua axungia que tunc temporis haberi potest et serua et cooperi bene in pixide vel in olla vitreata postea recipe folium iusquiamini et acrimoniae plantaginis et millefolij trifolium et marubium balsamum mentam et mentam equinam zembis feniculum et omnia illa simul equali pondere accipe et contunde et pone in vinum et mitte stare per aliquos dies et tunc excipere herbas predictas quando tibi videbitur conueniens et appone confectum quod prius feceras de modulis po-

puli et aruina noua et commisce simul et pone ad caldarium paruum et buliat simul totum et postea in sacculum funde seu cola.

Syrupus vulneratorum.

Recipe tomentillam agrimoniam diptamum illam herbam et myrram rubeam et coque bene in ceruisia antiqua et cola per panniculum lineum et quando infrigidabit da infirmo sero et mane ad bibendum.

Unguentum ad paralysim sic laboratur siue sit in capite siue in alio membro.

Recipe iuniperum et aruinam galline et contunde bene simul et pone ad patellam ut liquefiat et cola et sint ambo sub pondere equali.

Ad paralysim et fiat ignis bonus et sic vngatur.

Recipe medullam de ossibus equi et liquefac in patella et unge locum dolentem ubi regnat paralysis. Et nota quod viris debet esse ex ossibus equi mulieri bus vero de ossibus eque.

Contra paralysim cui statim oculis.

Recipe vinum bonum et fauam mellis in eadem mensura et radices celidone et feniculi si vis cum herbis et concute illa bene et postea calefac circa ignem et cola et emplastretur super oculos.

Unguentum ut quasi vno die vulnus sanetur.

Recipe lanceolam illam herbam et illa est confamilis plantagini sed planiora habet folia et longiora et contunde eam cum noua aruina et postea in patella dissolue et fac emplastrum et pone super vulnus sed pulueres sentias facies de eis et cum eadem herba potes humectare inflatones in circuitu vulneris.

Unguentum rufum et valebit maxime quando aliquis leuans graue pondus offendit se vel inflat ab intus vel habet spatulas ab intra.

Recipe herbas quasdam rubeas. Rubea tinctorum vel vngulosa maior bethonica Eseruene korz venper et ablue bene postea vero post ablutionem deponere corticem superiorem et pone ad butyrum quod in Maio mense est laboratum si habere potes et coque simul valde bene sic tamen fac quod herba butyrum preualeat et appone radicem vnam vel duas de acrimonia. Et si non potes habere butyrum Maio tunc recipe illud butyrum quod est laboratum in vna septimana ante natiuitatem beate virginis Marie vel quod est paratum ante festum sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum tertio die vel prima.

Contra combustionem ignis vel aque.

Recipe fursures filiginis et combure in noua testa hoc contere bene et contritum da in circuitu manui vel pedi et sanaberis.

Remedium bonum ad paralysim.

Unge locum ubi turbaris in calida stupha vel circa ignem vino cremato vel etiam si pes vel manus incuruat a paralysi taliter fac et sanaberis.

Unguentum sanatiuum et quod facit crescere carnes.

Recipe sepum ceruinum et plantaginem cum semine et radice. Si autem semine plantago non habuerit sic quod esset in mense Maio tunc recipe radicem cum folijs contunde simul cum oleo oliue et decoque super lento igne sic ut buliat per integram horam primitus postea appone resinam et commisce hoc totum simul ut buliat ita diu donec illa resina liquefiat sed non amplius postea cola per pannum

num ad nouam patellam: post hoc recipe tria vel quatuor coclearia de vino bono: et infunde in illud confectus: sic iterum tere ad bonam horam et postquam illud vinum consumetur: tunc iterum funde tantum de vino ut prius: et sic semper extere et effunde modo predicto: et hoc fac ita diu donec non erit vnguentum album sic abiectum: et donec adheret mortario: sicut bitumen: et postea appone ceruse dimidium alterum loti: et hoc si fuerit vnum quartale: tunc de cerusa appones: et hoc illuc insperge et contere bene: et serua in pixide: et vtere eo quando oportum fuerit.

Unguentum dialtee contra siccitatem.

Recipe medullam de ossibus caninis: et medullas de ossibus equinis: et antiquam aruinam: et herbam que crescit in segetibus et vocatur Ermodactilus: et est hec herba precise sicut cepe: et omnia illa simul bene decoque: et contunde: et liquefac in patella: et cola ad pixidem: et membra que exsiccantur sepe iungantur.

Contra calculum.

Recipe zinziber: balsamum: et zeduiam: et flores muscati: et longum piper: et lapillos cacti: de quolibet vnum loti: et contere hoc simul valde bene et da infirmo ad bibendum in vino: et precipue in balneo.

Ad idem.

Hec est quedam brevis medicina que a solo deo venit. Accipe succum feniculi: petrosili: apij: et in succo istarum pone micam panis: et pone super renes: et super vesicam: et non tantum vrinam prouocat verum etiam lapidem frangit.

Ad idem.

Idem facit paritaria comesta vel bibita cum vino vel puluis eius cum albo vino potatus.

De calculo frangendo.

Hec quedam veneranda optima et perfecta ad frangendum lapidem medicina. recipe radicem feniculi: et saxifragie: petrosili: equaliter de omnibus. Item radicem bardane siue lappe ad quantitatem omnium istarum rerum: et hec in partes minimas diuidantur et ponantur in tanta aqua quantum videbitur sufficere bullaturque usque ad consumationem tertie partis aque: et post hoc sumat patiens mane et sero ad quantitatem mediocris ciat: et si aqua predicta nimis amara fuerit bullatur de liquiritia cum aqua predicta quantum videbitur. et si malum patientis recens est curabit ad octo dies. si vero antiquum fuerit ad quindecim dies.

Ad arenas expellendas.

Talis enim cura supradicta est seruanda nisi quod loco saxifragie due vel tres partes plantaginis apponantur et operandum est in praxi predicta.

Unguentum contra combustionem.

Recipe olei rosarii. 3. s. cere. 3. ij. cerusam. 3. s. clarum oui vnius: hoc totum optime verberetur et in corporetur: et fac vnguentum: et vngatur ex eo locus combustionis quotidie et mirabiliter prodest.

Unguentum ad scabiem.

Recipe aloepaticum: oleum laurinum: argentum viuum: et saluiam: et fiat vnguentum: et cum illo scabies perungatur.

Aliud experimentum probatum.

Recipe auri pigmenti. 3. ij. argenti viui. 3. i. plumbi vsti. 3. j. et ducantur fortiter: et misceantur cum oleo

et aceto vini: et ex illo scabies perungatur.

Experimentum magistri Petri hispani contra omnem maculam oculorum.

Recipe feniculi: verbene: rute: rosarum: eufragie filicis montani: bethonice: celidonie: capillorum veris: ana quassa bene: et impone in albo vino per diem naturalem. Secundo die distilla per alembicum: et quod primo stillauerit quasi argentum: secundo quasi aurum: tertio quasi balsamus habetur: et hoc seruetur in tribus ampullis: et cum opus est detur nobilibus et delicatis pro balsamo. alijs vero pro auro et argento.

Isti sunt pulueres optimi super omnia vulnera que sequuntur.

Recipe vinum nigrum: hoc est rubeum nimis et plustein cuiuslibet. j. loti: gummi arabici. iij. loti: muscatum: et thus album cuiuslibet. j. loti sanguinem draconis: et mumiam. j. loti. ista omnia contunde ad inuicem: et fac puluerem ex ipsis: et illos serua ad necessitatem quando indigeris.

Apostolicum tale vnguentum sic fit.

Recipe nigram picem arabicam cuiuslibet. i. libras. Recipe etiam galbanum: et serapini: armoniaci: opoponacis: colosonie cuiuslibet. j. loti: et ceram vj. loti. Esca media libra: hec omnia misce ad inuicem: et coque modicum: et postea accipe mastice: et albeam: siue olibanum: et contere bene in pulvere: et terbentinam cuiuslibet. i. loti: hec omnia misce ad inuicem: et mitte liquefieri valde bene: et exprime per panniculum super aquam frigidam: post hoc excipe de aqua: et volue illud bene in manibus ad ignem cum oleo: ut sit modicum molle: hoc emplastrum sanat vulnera fistulam apostema: et omnem fluxum imundum in carne cessare facit et sanat.

Unguentum bonum ad vulnera sananda.

Accipe picem arabicam. i. picem non temperatam: ceram simplicem oppoponacum flores iris cuiuslibet medium loti et holuorum. Aristologia rotunda: thus album cuiuslibet medium loti: stragiri. ij. loti. Ista omnia excoquantur in vino quartali acceti fortis valde ita bene ut molle fiant. Et postea ista videlicet: cera: picem: et picem arabicam: et. ij. libras olet: et illa omnia per mitte successiue liquefieri inuicem: et sic excoque vides bene ne comburantur aliqua parte: deo debes interius continue misce et mouere: post huiusmodi abice et refrigera modicum pone ad pixidem: et isto vnguento vngatur paniculus: et ponatur super vulnera: et hoc contra hic: et curat sanguinem malum de ipsis vulneribus.

Unguentum ad vulnera quod cito generat carnes.

Accipe de oleo oliue quatuor loti: faui mellis tres loti: gummi arabicum: thus verum de quolibet medium loti: et mole sicut farinam: et misce simul totum: et liquefac super ignem modicum: et misce continue siue moue in olla ne comburantur: et opera re illo vnguento quando vis.

Unguentum quod dicitur gratia dei.

Recipe terbentine. libras. lii. resine. lib. i. olibani: mastice ana. 3. i. myrre. 3. ii. cere virginet. 3. lii. bdelii. 3. i. verbene: pimpinelle: bethonice: cum adhuc recentes existunt: ana manipulum. i. et decoquant in vino albo usque ad consumptionem tertie partis: postea coletur et colatura super ignem ponatur

ad buliendum. Et impone ceram resinā: et masticez: olibanū: myrrā: bdellium: quousq; bene cōmisceatur semper agitando cum spatula: post hoc impone terbeninam: et aliquantulum de oleo oliue: et iterum agitur cum spatula: donec infrigidetur: et quod notat colligeret: residuū vero valet podagricis.

¶ Uel et p̄dictum taliter pōt laborari.

Recipe succi verbene: pimpinelle: bethonice: bzunte. i. consolidate plantaginis lanceole: ana lib. 5. succi api. quar. iij. resine. lib. i. terbetine lib. v. mastice: olibani ana. 3. i. myrrē. 3. i. cere virginē. 3. iij. et in vino odorifero bullant succi: et valet p̄tra cācrū: et q̄ morsum venenosum: et puncturā: valet et ad omne vulnus recēs et et sanat apostemata in costis: et in epate: et in splene: et in p̄ncipio foris emplastretur.

¶ Unguentū bonum ad gingiuas.

Recipe aluminis vnum loth: et mellis. ij. loth: et illa duo simul cōmisceant: et cū illa dentes et gingiue iungant: et curabit putredo eoz.

¶ Ad vulnus sanandum.

Recipe myrrā: thus: attramētū cuiuslibet. i. loth: et ad ampliādū vulnus appone medullā sambuci et vñ loth: et illa oia simul cōfice in puluerē: et sparge modicū ad vulnus: post hoc calefac bene et suppone vulneri: et trāstet adinuicē sub illo et sanabit: sed debes cōprimere vulnus bene duobus digitis adinuicem: et sic postea quarta die eligetur multum pulchre: post hoc sanetur velut alia vulnera.

Ad idem puluis bonus.

Pulueriza piper cum pulvere carbonis quercini et suppone die vno vel duobus et sanabitur.

¶ Aliud antidotum ad vulnera sananda.

Recipe mel: et vermes longos q̄ infimo crescut: hec duo cōfice in puluerē: et sparge ad vuln⁹ et sanabit: et hoc vtriusq; ana: et cōburi d̄z in testa noua: et vulnus sanabit sine oīum fluxu imunditiarum.

¶ Contra dolorem capitis.

Recipe thus: myrrā: piper: saluiam: acetum: olenz: et illa oia simul cōmisce et decoquas bene: et tunc cū illo caput perunge et liga lintheo.

¶ Unguentum ad vulnus qd̄ d̄r lupus.

Recipe albū thus: et tere modicū ad modū pulmēti et cōmisce optime cum claro oui adinuicem: et tūc line supra p̄niculum canapem: et si istud habere non potes: tunc recipe barbā iouis: et forma ex ea emplastrum: et tali dolozi superpone.

¶ Antidotū emplī boni et optimi sup vulnera.

Recipe thus: et aloē: et cōtundant adinuicē cū clāro oui: et istud ponat sup vulnera vbi vene fuerint incise et cruentat multū. Istud tādū p̄mittat super vulnera donec vene et sanguis adinuicem creuerit si tñ magis indigeret: tūc laborez huiusmodi medicina et emplm ex nouo et supponat vulnēti totiens donec crescat adinuicē pampubili et malue simul cōtrite et sup vulnera posite curant vulnera sanguinolenta et fluentia: et fortius: et melius q̄ aliud emplastrum. Si aut cum axungia cōtunditur: et super vulnera ponitur sanat summe bene vulnera.

¶ Aliud emplastrum super vulnera.

Serpilliū romanū. i. romischkol cōtū dat cū vino et sup vuln⁹ ponat sanat multum bene. Item absinthium concussū et recēter super vulnus positum sanat ipsa vulnera.

¶ Unguentum bonū ad omnia vulnera.

Recipe aruinā leporis: et aruinā porci nō castrati siue ap̄z: et totū simul cōfice qd̄ densum fiat: et caua illud et post hoc in melle decoque: deinde recipe absinthium: vel succū absinthij et tempera cum predictis ad horam vnius diei: et hoc vnguentum seruabis q̄diu placet.

¶ Ad mundationem vulnērum.

Recipe cōsolidā maiorē talē herbā et deponē superiorē corticē: medietatēq; eius abijce: residuū vero cōtunde: et misce cū aqua: et pone sup folium nigri oleris. Suuarczkol et superpone vulnēri et sanabitur in octo vel nouem diebus.

¶ Unguentum ad vulnera.

Recipe oleū oliue. iij. loth. saumellis. iij. loth gūmū arabicū: et thus vetus: de quolibet mediū loth et molle sicut farina: et misce simul totum et dimitte vt liquefiat sup ignē modicū: et cōmisce continue in olla vt nō cōburat et opare illo vnguentū qñ vis.

¶ Contra scabiē et p̄uritum.

Recipe aquā in q̄ porcus vel sus mūdatus ē a carnifice post interfectionē illam cū dormire volueris calefac et laua pedes ex ea et pone ad aquam eadē vsq; genua et inuolue pedes in pannū et de mane cū surgis d̄yaltea et populeon: et illa duo vnguentā simul cōmisceant: et unge pedes scabiosos: et etia tere seu frica bene pedes cum pilis qui sunt in scropha depositi in aqua p̄dicta: et sic cū vnguento p̄dicto perunge et sanaberis.

¶ De emplastris.

Emplastra bona sunt ex rosis et violis: cera: pice: melle: et oleo oliue: illa fac bulire simul: et exprime p̄ pannum et intinge pannos: et pone ad pixidem et serua ad placitum tuū quando indigeris.

¶ Unguentum Ipocratis.

Recipe anguillā et decoque in aqua: et supnatantē pinguedinē collige et cōgrega. post h̄ recipe aquā piguē et gallinā et decoque sine sale: et simili modo pinguedinē supnatantē collige: et tūc recipe succū saluierute: et absinthij: et elebori: qd̄ iacet i terra: et herbā q̄ vocat lingua canis. Ista oia simul cōmisce: et quodcūq; vulnus fuerit vntū nō indiget emplō.

¶ Unguentū fuscū laboratur sic.

Recipe mastice: galbani: terbetine: ana. 3. i. et cōficiant sic oleū oliue i caldari sup ignē mittat et addat cera: et liq̄facta ponat colofonia: deinde gūmū serapini: et terbetine: deinde mastice: et olibani: et hoc cum spatula semper agitet donec coctum fuerit: deinde infrigidatum vsui serua.

¶ Unguentum album.

Recipe ceruse lib. ii. litargirii. 3. i. olibani. 3. 5. mastice. 3. i. vnaqueq; res p̄ se terat: et puluis ceruse cum pauco oleo oliue distēperetur: postea addat litargiriū: deinde mastix: et olibanū addat et cū pistello paulatim agitetur quāto melius pōt et vltima vice de aqua rosaz parum addat: et tādū ducatur donec spissum vel liquidū fuerit et serua vsui.

¶ Contra paralīsim.

Recipe anserem: et pone in eam anguillam in frustra sectam seu diuisam: et assa: et cum illa pinguedine unge locum vbi turbaris.

¶ Contra paralīsim.

Recipe murilegū nigrum: et impone in eū sinapi: et similiter assa et pinguedinē que inde stillauerit collige: et locum paraliticū perunge.

Sensus cōmu-
nis.

Cellula ymagi-
natiua.

Cellula estimati-
ua seu cogitativa
et rationalis.

Cellula memo-
ratiua.

Allopitia
Appoplexia
Asina
Arterica
Ascites
Arteriaca
Arumeron
Antrax.
Amissio rationis
Apostema.
Bollismus
Easus capillozum
Cephalea
Eouza.
Catarrus
Colica
Calculus.

Squinan

tia:

ungues mali

Butta

Arterica

passio:
cardiaca

Arterica

Arterica

Arterica

Ungues mali

Cancer testicu-
lorum

Cancer
Eiragra
Eardiaca
Diamireo
Dissenteria
Diana
Diabetes
Erimera
Emigranea
Epilentia
Empima
Exitus ant.
Emonoydes
Febres
Fistula
Ficus
Frenesis
Fastidium
Fluxus sanguis
Gomouea
Butta
Douplaris

Idrosorbia
Imperigo
Incubus
Iliaca passio:
Ileos
leucostegmati
yposarcha
Ascites
timpanites

Idrops

podagra

podagra

Zepia
Zitargia
Zienteria
Zumbici.
Zdorophca.
Zadania.
Zleufresis
Zpilatio ner-
uorum
Zbthalmia
Zpilatio splenc
Zaralefis
Zperipleumo-
nia.
Zleuresis
Zpifis
Zproflunius
Zdolipus
Zpodagra.
Zcuma.

Scotomia et
verigo.
Stupor mētis
Sternutatio
Spasmus
Squinantia
Sincopis
Singultus
Stranguria
Satiriasis
Suffocatio ma-
tridis
Sciatica
Serpigo
Scartia
Tetanus
Tenasmon
Tusis
Venenum
Vicerana
Vertigo
Vicerano lin-
gue.

Epac cor stoma-
chi caput et sple-
nes man² et ren.
matrix vesica st
officialia mēbra.



Allopicia est casus capillorum cum vlceribus. Cura: vngule capre vste: et cum pice liquida trite et illinite: allopiciam sanant. Auicē. Serap. kir. Alber. lib.

xxij. **A**ppoplexia ē passio cerebri officialis aurens sensum: et erectionem toti corpori repente et subito magna voce precedente propter oppillationem in meatibus et ventriculis cerebri tam principalibus quam non principalibus. Cura: vtiaris triaca cum vino. Auicē. prima quinti. et genitalibus cunctis que sint cocta cum ruta. **A**lma ē difficultas anhelandi sine sonitu. Cura: decoquantur malue in olla: et ex illa lauetur calide infirmus et etiam sumatur scutella plena sursuribus illa coquantur cum butyro: et condiantur modicum: et hoc imponatur sacculo: et consuatur super sacculum illum locetur infirmus: et resanabitur: et ubi in balneo esset: sedere super istas coctas herbas: et istud sepius facere tenet et sanabit: et post hoc vngat opaltea cum isto butyro hoc facto minuat de pede inferius sub talo. **A**rtetica ē passio ab articulo dicta: et species gutte. Cura: accipe rantarides: et puluerem piperis: et sparge super ceram calidam: et sic pone super locum dolentem per vnam noctem: et mane inuenies vnam vesicam: tunc impones ceram extrahens aquam et sanabit. **A**scites ē species ydropis: pisces ex grossa ventositate effecta. Et dicitur ab ascle grece quod est venter latine. Cura: vide de ydropisi. **A**rteriaca passio ex asperitate sit trachee artarie cum voce mansueta: et rauedine: et excreatione cum difficultate. Cura: taplus barbatus cum vino rubeo et forti decoctus et loco frequenter cataplasmatum multum valet. **A**ximeron ē genitalium partium oppilatio. **A**ntrax est quedam pustula pessima que quando fit in homine comburit carnem circum quaque: et facit foramen antrum: et putrescit caro versus ad ossa. **A**missio rationis fit quando homo frenesim patitur: quando tunc solet fatuizare veluti fatuus vel amens. Cura. recipe crocum et vinam propriam: et de mane bibat et curabitur. **A**postema patet quod se quid sit. Cura. Recipe bolum armenicum et terram sigillatam: et incide et virumque ad calidum vinum pone: et de mane bibe et scito quia non permittit ad cor ascendere ipsum apostema.



Bolismus ē immoderatus vel caninus appetitus vel irrationalis: et ē passio stomachi ex frigida causa. Cura alibi videatur de passionibus stomachi.



Calus capillorum est quando crines descendunt de capite: et hoc maxime fit post infirmitatem. Cura: adeps vrsi capiti illinitus multum prodest. Sextus et Plinius lib. viij. capitulo. xxvi. et lib. xvij.

cap. x. **C**ephalea est dolor totius capitis. Cura: thus myrram piper saluiam acetum alleum commisce et decoquas: et vnge caput et liga lintheo. **C**oriza est contractio narium a poro cerebri decurrens ad nares. **C**atarrus est fluxus a capite versus petus: et causatur multipliciter: aliquando ex frigore magno: aliquando ex crapula: aliquando ex calore superfluo. Si fuerit ex calore superfluo: tunc minuatur de vena cephalica: et vngatur frons vnguento et oleo rosarum: similiter et caput: oleo baccharum lauri vel cum opaltea. Si autem ex crapula: tunc sume precauere ut ne nimis comedat aut bibat: et mo-

derate. **C**olica est passio intestinozum gravis que sit iuxta umbilicum. Dally. Cura: stercus caprinum loco dolentis illinitum curat. Sextus. stercus canis.

Calculus dicitur esse lapis in vesica vel in renibus generatus. Cura: grana iuniperi mixta cum medone simulque concussa et expressa per paniculum: et iterum de nouo succus per pannum coleum et detur patienti in balneo sedenti. Lir. oleum ex tigno eius. **C**ancer est quedam vulneris species carnes corrodes et quasdam habens venulas circumquaque distentas ad modum crinum canceri. Cura: stercus aserinum fixatum bene cum butyro iterficit cancerum: et ubi prius per panem colari: et sic illiniri vulnus in circuitu. **C**iragra est paralisis manuum. Cura. Recipe succum mellis et misce cum farina ordeacea: et decoque quasi pulmentum et fac ex eo emplastrum et suppone dolori calide. **C**ardiaca est infirmitas ex qua cor trepidat et evenit multipliciter. aliquando evenit ex calore magno et ex sanguine superabundanti. Cura: et tunc debet minuire de manu sinistra: et vnge cum vnguento populeon. et oleo violarum: et vti electuario isto. recipe violarum rosarum nouellarum vel titiradys Julii. si militer vtatur carnibus nouellorum pullos et iuuenus et alias carni: post hec facies sibi emplastrum. accipe rosas violas linum recens: hec omnia coque et pone super stomachum et priusquam coquantur contundi: et sic decoque. Si vero infirmitas illa evenit ex frigore tunc assumat diamargariton. Nicolaus et hac medicinam recipiat. Cinamomum gariophilos cubebe lignum aloes: et os de corde cervi cuiuslibet coniunctim: et contunde bene inuicem et appone. Recipe violarum vnum fertonem anisum vnam libram: quia illud confectum fortiter fortificat omnes artus in homine. Si autem illa infirmitas sit ex sudore nimio: tunc repurgetur: ut non sudet magis: alio cor pus corrumpetur: vel cardiaca passio est quando totum corpus resoluitur in sudorem continuum et dicitur diaforetica. id est apertio pororum.



Damires ē inuoluntaria urine emissio in somnis. Diffuria ē difficultas mingendi. Cura: oleo petroleon corpus vngatur circa partes dolentes. Lir. **D**ysenteria est fluxus ventris sanguineus cum

corrosione et vlceratione intestinozum. Cura: lac asine bibatur stomacho ieiuno. Dally. et Plinius libro vigesimo octauo. capi. nono. **D**iarrha est fluxus ventris simplex quando fluunt humores diuersi de ventre. Cura: stercus canis sola ossa comedentis constringit ventrem fortiter et hec magister aucenna docet. **D**iabetes est immoderata renum attractio vel est immoderatus fluxus urine hoc est quando totiens mingitur quotiens bibitur. Cura: pone agrimoniam ad saccum et excoque cum vino antiquo donec tertia pars ebullierit. et adhuc appone modicum salis cocti et bibe illud et sanaberis.



Effimera est febris ex distemperantia spirituum procedens ultra diem tertium secundum sui naturam non se extendens. Cura: contra effimeram diuersam vena aperiantur ut in tabula de minutionibus.

Emigranea est dolor medie partis capitis siue interioris. siue exterioris. Cura: contra emigraneam sciaticam colicam et iliaticam. recipe calcem viuum ciminum tartarum olibanum bacca lau-

ri sinapi: mel erudum ⁊ fac confectionem empla-
stri ⁊ superpone volenti loco. **E**pilenſia eſt mor-
bus cerebri officialis auferens ſenſum ⁊ erectionē
toti corpori cum perturbatione motus maxime
propter opilationē in ventriculis cerebri non pri-
cipalibus. **C**ura: detur ſimus ciconie i aqua ⁊ mel
le mixtus ad bibendum infirmo curat: **A**luctor pā-
dectarum. **E**mpima eſt ſputum ſanioſum in cō-
cavitate pectoris exiſtens aut pulmonis vel empi-
ma eſt paſſio quando ſanies excreatur. inde empi-
ma. i. ſaniem expuentes quia empima grece ſanies
latine dicitur. **E**xitus ani eſt quando quoddam
intestinum homines egreditur per anum. dum va-
dit ad ſeceſſum. **C**ura. **R**ecipe aloes epaticuz ⁊ li-
quefac poſtmodum inſrigidato inunge intēſtinuz
⁊ trude viceverſa ⁊ ſi amplius exierit iterum inun-
ge quouſq; manebit. **S**era. ⁊ **A**luicen. **E**mozroi-
des ſunt quinq; venule exiſtentes in ano per quas
ſolet fluxus fieri vel emozrois eſt apertio vene in-
ferioris que cuz ano exit. emachim. n. grece ſanguis
dicitur latine. inde emozrois. i. ſanguinis fluxus p-
inferiora talis infirmitas aliquando generatur ex
ſanguine ſuperfluo. **C**ura: contra hanc infirmitatē
minuatur ſub talo. ſi autem talis paſſio fuerit re-
cens ⁊ primo orta tunc. **R**ecipe oleuz oliue ſereniſ-
ſimum ⁊ madidetur in eodem panniculus ⁊ pona-
tur ſuper dolorem eundem.

Febbris eſt calor innaturalis mutatus in
igneum ⁊ eſt multiplex vt ſuperius cir-
ca imaginē videri pōt. **F**ebbris continua
eſt que ſit de ſlegmate putrefacto. **C**ura:
accipe ſolſequiū cuz radice ſua ⁊ in par-
tes incide minutas ⁊ cuz aceto bene decoque ⁊ da
patienti de mane ⁊ de vespere. **F**ebbris tertiana eſt
que ſit de colera putrefacta ſimiliter in corpore. cu-
ra: recipe pimpinellam ⁊ benedictaz albam ⁊ has
herbas decoque pariter cum aceto ad bonam ho-
ram diei ⁊ tunc cola per pannū ⁊ da bibere paci-
ti de mane ⁊ vespere. cura cōtra quartanā. **R**ecipe
petroſilium ⁊ cū radicibus decoque pariter cū ace-
to ad bonā horam diei: ⁊ tunc cola p pannum ⁊ in
vitrum infunde ⁊ cooperias per noctem mittens ſic
ſtare ⁊ mane iterum per pannum debet colari ⁊ da
patienti bibere ieiuno ſtomacho ⁊ intinge pannū
in eadem aqua ⁊ caput eius circunliga. **F**ebbris
effimera patuit de ſe. **C**ura: ſucus cubebe mixtus
cum oleo roſarum ⁊ inunctus pulſibus ⁊ ſuper cor
illintus omnem calorem februm mitigat. **F**eb-
bris ethica idem eſt q; ptiliſ plantarius habuit
quendam patientem viribus defectū ⁊ poſuit ipm
in balneum aqueū in quo fuerūt reſoluta cornicis
oua ⁊ poſt balneū forſificatus exiuit. **I**tem cibis
optimis ethicis: terantur pupille alarum gallina-
rum ⁊ trite diſtemperantur cum lacte ouino ⁊ ad-
dantur vitellam ouoz ⁊ parum polente frumen-
ti ⁊ buliat ad ſpiſſitudinem ⁊ adde parum de zu-
charo. **F**ebbris acuta idem eſt qd febris occul-
ta. **F**ebbris autem cōtinua hoc habet remedium.
Ad mitigandum feruorem in febre cōtinua. **C**ura:
Solia caulis coquantur cum aceto veteri ⁊ teran-
tur cum oleo roſa. ⁊ emplaſtretur ſuper ſtomachū
multum prodeſt. **E**t idem poteſt fieri cum ſolis ſa-
licis: ⁊ folijs albarum vitium roſaz ⁊ ſimilibus.
Fiſtula dicitur eſſe quoddam vlcus qd non ple-

narie reſeruatur ⁊ ante reſeruatiōē cicatrix illius
vulneris clauditur ⁊ ſic illa ſanies que prius d- vul-
nere plenarie non exiuit facit ſub cute latum lo-
cum. in ſuperficie vero vulneris valde ſtrictuz ha-
bet foramen. **C**ura: excoquatur aniſum in aceto ⁊
illud bibat patiens ⁊ fiſtula ceſſabit in eo. **I**tem fi-
ſtula multa foramina habet ⁊ non recta ſed obli-
qua q; medicina intrare non poſſit etiam nil me-
lius eſt qz ſtercus caprinum temperatuz cum mel-
le ⁊ tepide ſuppone: quia omnem tumorem ſoluit
putredinem extrahit. ⁊ iniciatos vermes occidit: ⁊
purgat ⁊ ſanat fiſtulam ⁊ cancrum: ⁊ dolorem mi-
tigat. **F**icus eſt quoddam vlcus quod ſolet cre-
ſcere in ano vel in virga vel in naſo vel in oculo. cu-
ra: contra ficum in oculo. **R**ecipe medullam de os-
ſibus bouinis ⁊ vitellum oui ⁊ oleum: hec omnia
in patella coquas ⁊ exprime per panniculus ⁊ vn-
ge moxbum ⁊ ſuper pannuz pone ⁊ ſuperpone do-
lozi donec ſanetur. **A**lia contra ficum vbi cunq; ſit.
Recipe plantaginis manipulos tres ⁊ millefolij
⁊ mētaſtri ana manipulos quatuor. hec omnia cō-
tundantur ⁊ ſucus exprimatur. ⁊ addantur qua-
tuor grana piperis triti: ⁊ vij. grana maſtico ieiun-
ne patiens bibat hanc potionem nouem diebus ⁊
continue renoua medicinam. **F**renetiſ eſt apoſte-
ma natum in miringa cerebri de ebullitiōe ſangui-
nis vel calore vel vtriuſq; miringa vero pellicula
circundans cerebrum ⁊ eſt in aure que ſi rumpe-
retur perpetue ſurdus efficeretur. **C**ura: **A**ena in
medio frontis aperiatur. **F**aſtidium eſt infirmi-
tas repugnans comēſtioni ⁊ appetitum deſtruēs
bonum. hec infirmitas ſepius generatur ex languo-
re nimio ipſius ſtomachi ⁊ omnium membrorum.
Aliquando ex nimia ſede peruenit ⁊ ſuperflua ſumi-
ptione potus. ⁊ interdum peruenit ſimiliter ex fri-
gore magno. **T**unc ille ſumat zucharum roſaceū:
⁊ etiam ſuauat illum qui habet ſuperfluam: ⁊ ſtoma-
chum confortat vel etiaz ſibi detur diaaradon ab-
batis. **S**i vero euenit ex frigore modo: tunc ei de-
tur diacitoniten **S**alie. **A**luicen. aut zinziber con-
ditum: quia illa inducunt aliquo modo calorem ⁊
faciunt appetitum bonum. **F**luxus ſanguinis ē
multiplex de ore: de auribus: de naſo per anum: ⁊
fm illa omnia diuerſas ſortitur medicinas. cura:
contra fluxum ſanguinis per anum. **R**ecipe ſemē
plantaginis ⁊ concute in liquefactum butyrum te-
pidum: ⁊ ſtatim ſuper hoc incute oua ⁊ appone
modicum de croco: ⁊ hoc non contrito: ⁊ da ei co-
medere.

Contra fluxum ſanguinis de naribus. cura: ve-
na cephalica incidatur.



Dmozea eſt inuoluntaria ſpermatis
emiſſio. **S**utra eſt quedam paſſio in
ſcapula quando homo brachium le-
uare non poteſt: ſi leuat tunc cum ma-
gno dolore. cura. **R**ecipe abſinthiu ⁊
coque in melle ſiue malaxetur ⁊ cōiundatur ⁊ fiat
emplaſtrum ex illo ⁊ doloz ſuperponatur.



Dripilatio eſt erectio crinium pre ti-
more vel diſpoſitio in qua inuenit cor-
pus diuerſitatem in frigore ⁊ punctio-
nem in cute ⁊ lateribus: ⁊ antecedit
eam pigritia ⁊ fractio eſt quaſi mane-
ries eius.



Droforbia dicitur passio melancolica in qua homines abhorrent aquam mūdā: et etiam sonum eius. **C**Impetigo et serpigo sunt infectiones cutis de colera subtili mixta cum humore grosso.

Incubus est fantasma in somno comprimens corpus et aggrauans motum et loquelam perturbans. **C**Ilia est passio intestinoꝝum gracilium cum stipatione ventris frequenti vomitu et dolore vehementi tanq̃ si intestina terebello perforarentur. **I**leos est idem. Et notandum q̃ interdum ilia ca fit ex siccitate nimia: tūc vrina fit rubea et tenuis et tunc magnum calorem patitur infirmus. Ille curatur sic. Ungatur oleo violarum et vnguento populeon: post hoc detur ei exisatra. j. lib. illud sumatur mane et sero semper iria coclearia cum aqua calida: post hoc sumat sucum rosarum et scamonee mixtum cum vino calido valet sibi contra idem: hoc facto minuat sub talo in pede exterius. **C**Idrops est error virtutis nutritiue in toto corpore sequens mutationem virtutis digestiue in epate. Et sunt ei⁹ quatuor species scilicet yposarcha. Ascites: timpanides: et lentoflegma. In timpaniti et asciti solum venter inflatur et pes sicut postiora maceratur. In alijs autem speciebus totum corpus inflatur. cura: contra idropisum. Recipe enulā campanam et contunde et sucum eius exprime per pannum et colligatur in testam oui et distemperetur cum fauomellis: et da infirmo omni die plenam testā de succo: hoc fac vnde cū diebus luna decrescit vel deficiente quia etiaꝝ homo in ventre decrescit. **C**Impetigo est siccitas scabies in cute vel in corpore. cura: due vene in faucibus oris incidantur.



Ep̃ra est morbus corumpens formam et compositionem membrorum et finaliter soluens continuum: proueniens de materia melancolica sparsa per totum corp⁹. cura: Recipe oleum de ligno fraxini frustratim incisum: fac ad modum aque rosacee et vngatur corpus sepius multum prodest.

Clitargia est apostema in posteriori parte cerebri sub tus carnem: vel litargia est apostema fleumaticum cum febre impuere cerebri natum: et cū mētis obliuione: et litargia alia vera: alia non vera. vera litargia est quando homo semper dormit. Non vera inest qua homo non potest dormire. cura: capilli proprii vlti conficiantur cum aceto. et modica pice: et naribus apponatur: potenter excitat litargicos. **C**Lienteria est fluxus ventris: in quo comesta et bibita egrediuntur in eisdem qualitatibus et quantitativis in quibus intromissa sunt propter debilitatem contentiue stomachi et intestinoꝝum superiorum. cura: recipe sepum hyrcinum ceruissiam litargirum corticem glandium: emethich: sanguinem draconis cuiuslibet vnum loth. misce adinuicem: et hoc mixtū trudas super lienem: et sparge desuper modicum puluerem concrematum: et sic trudas ad corpus viceversa et sanabitur eger. Si autem homo fuerit inflatus multum: ita q̃ lien subintrare non potest: tunc accipe allei vnam libram et decoque illud in medio quartale aque: et tunc super vapores illos ponatur eger: ita vt possit humentare corpus eius sue postiora: q̃ potest hoc corpus demolitur: et sic lien poterit bene imponi

viceversa. Cum vero ibit ad sedem tunc intrudat intestinum digitorum hoc facto. Recipe pulueres crematos de cornu ceruithus et mastice isti pulueres superseminantur lienem et posterioribus et sanabitur. Et isti pulueres etiam reformant matricem mulieris si super scudantur secretis ipsarum. Deinde accipe thus et colofoniam. Isti duo sparge super carbones ignis locans infirmum super illum fumum q̃ intret corpus ipsius et sanabitur lien.

CLumbrici sunt vermes qui nascuntur in intestinis hominis seu alterius animalis. cura: comede zeduarium ieiunus attamen prius tene ad vnam horam in ore. et post hoc glutire debes: et tunc incōtinenti moriuntur omnes. Sequitur aliud remedium contra lienteriam passionem quando quis magnas sedes patitur et homo estimat vt viscera ei⁹ exirent hec infirmitas interdum fit ex comestione nimia et ferculis malis: et talis egritudo mortificat hominem sepius. Et sic interdum detur ei zucharum rosaceum diaaradon abbatis vel rosatam nouellam. Et adhuc vngatur oleo rosarum et emplastrum conficiatur ex rosis: et ex pomis quercinis mastice et margaritis: hec omnia condiantur et excoquantur in aceto: et fiat positio super corpus ei⁹. Si autem illa infirmitas ex feruore processerit: tūc sibi vnguentum ex menta: et balneum ipsius aque in qua cocti sunt rose vire grich que cum costo: et scias q̃ hec medela multum prodest.



Morphea est defecatio cutis maculosa: vel morphea dicitur esse casus crinū et barbe: et est differentia inter Allopiciam et morpheam: q̃ allopicia est casus capillorum et crinū capitū. cura. Recipe oua formicarum et ebulum. j. atib contunde et succum: et acetum bonum: et aurum purissimum puluerizetur: et cum eo vexura: idest locus perungatur. Item fel caprinum et sanguis vespertilionis perunctum caput aut barbā curat. **C**Mania est insania vel alienatio mentis. vel sic: Mania est corruptio anime sine febre. cura: fercula eius sint leuia sicut caro capria: et pulli et noua oua assature molles et bibat vinum limphatum: et cum aqua permixtum balneetur et commisceatur cum mulieribus: quia per hoc ira sedatur et vesania mitigatur et inciditur ei vena circa pedicam paruam: quia talis minutio firme bene curat vel etiam alia minutio communis. Melancolia vero a nigro fel le est dicta.



Neuorum oppilatio dicitur esse passio quando nervi oppilantur. cura: nervi adipe seu pinguedine accipitris sepius inungi debent. **C**Neufresis dicitur esse dolor lumborum.



Ophthalmia est apostema nascens super albedinem oculorum. cura: vena in utroq; pede supra pedicam maiorem incidatur et multum prodest. **C**Oppilatio splenis vel epatis est quando epas vel splen oppilatur vel obscuratur et non perficit opera digestiōis. cura. Recipe stercus vacce siccum et sucum vrtice tria oua olei optimi sulphuris confice hec et fac emplastrum et optimum splenetidis: epaticis: ydropicis: et hoc absconde q̃ donum dei ē pensare volenti.

Paraleſis eſt neruorum mollificatio cū ablatione ſenſus ⁊ motus. Cura: recipe ſtercora pulloꝝ. ciconie cum ad huc ſiunt in nido contunde ⁊ cribra ꝑ pannum ſubtile: poſtea recipe axungiam porci ⁊ liquefac: ⁊ impone puluerem ⁊ fiat unguentum cum quo unge locū dolentem. ¶ Paſaleſis viſcerum eſt que cauſatur in viſceribus. Cura: recipe hyrundines iuuenes: deinde excoꝛia ⁊ viſcera eoꝝ bene mudentur: ⁊ imponantur viceuerſa: ⁊ hoc caſſari debet: ⁊ mundare ⁊ comedere ꝑ tres dies. Aliud recipe ter quantum ad manus ꝑotes capere de bacchis lauri viridibus ⁊ tantum de ſaluſia: ⁊ decoquas bene in bona ceruiſia tritici: ⁊ bibe ieiuo ſtomacho. ¶ Peripleumonia ē apoſtema canalium pulmonis vel peripleumonia eſt collectio circa pulmonem: ſit autem de humore collectio in partibꝫ pulmonis. ¶ Pleureſis eſt apoſtema calidum lacertozum ſeu panniculozum ſeu velaminum coſtarum. Et pleureſis a pleura coſta dicitur: ⁊ inde tunc ſiunt punctiones laterū. Cura: contra laterum punctiones excoquatur mel cum lacte capꝛino ⁊ madefac illo ꝑaniculū: ⁊ hoc ſuperpone lateri languenti ⁊ ceſſabunt punctiones. ¶ Ptifis eſt humiditatis conſumptio quādo conſumitur corpus ⁊ exiccatur: ⁊ ita quilibet exiccatus ꝑoteſt dici ꝑiſcus: ⁊ febꝛis ethica idem eſt. Cura: recipe roſam ⁊ polipodium ⁊ coque cum vino bene: ⁊ bibe ſero ⁊ mane. ¶ Profluuium ē immoderata menſtruozum emiſſio. Cura: ſtercus gati cum reſina ⁊ roſa ſuppoſitum ꝑrofluuium mulieris repꝛimit ⁊ ceſſare facit. ¶ Polipus eſt ſuper ſua in naribus caro ex groſſis ⁊ viſcoſis humoribus facta. ¶ Bolifmus eſt infirmitas ꝑ quam homo ſemper continue comedere appetit ⁊ tamē ſaturari aliquo cibo non ꝑoteſt. Si vero ſaturatur ſtatim euomit moꝛe canino: ⁊ poſt hoc ſtatim eſurit vt ꝑꝛius ⁊ talis infirmitas interdum ꝑrouenit ex frigore magno: ⁊ tunc parum ſiuit. Si vero ꝑrouenit ex frigore nimio tūc ſemper lingua ſiccatur: ⁊ multum bibere ꝑoteſt. ¶ Podagra ē paſſio ꝑe dum cum dolore calcanei ⁊ pollicis. Cura: fricetur dolor ſepe cum teſticularum vulpinis: ⁊ adeꝑs vulpis idem facit ⁊ cum pelle eius inuoluatur.

Ruma eſt fluxus humoris a capite ad partes ſubiectas. Cura: ꝑſopꝫ toꝛrefactus ⁊ calue capiti appoſitus multum valet. Ad idem due vene ſub lingua aperiantur.


Stothomia ⁊ vertigo ſunt viſiones ventofitates ⁊ ſunt ꝑꝑꝛie paſſiones ſenſus coꝛis. Cura ſume radicem ebuli: ⁊ ꝑꝛius deſicca: ⁊ inde fac lixiuū ⁊ frequenter caput laua. ¶ Stupor eſt diminutio ſenſus ⁊ mentis. Cura: vena in occipite tangat. ¶ Sternutatio ē motus naturalis cerebꝛi fortis ⁊ validus ꝑꝑꝛe expulſionem nociuozum. ¶ Spasmi eſt egritu-

do neruozꝫ contrahens neruū contra ſuam originem. ¶ Squinantia eſt apoſtema gutturis viam anhelitus impediēs ⁊ cibi. Cura: due vene ſub lingua minuantur. ¶ Sincopis eſt defectus caloris naturalis vel eſt ablatio ſenſus in toto corpore ꝑꝫ maiorem partem: ꝑꝑꝛe debilitatē coꝛdis. ¶ Singultus eſt quaſi ſpasmus ſtomachi repleti aut inani ab humore aliquo victati ꝑꝑꝛe expulſionem nociuozꝫ. Cura aliquid inopinofum ⁊ anxium inopinatē ⁊ ſubito ꝑatienti nūciandum eſt ⁊ ceſſabit.

¶ Stranguria interpretatur guttatiz vꝛine emiſſio. Cura: thus cuꝫ ꝑulegio coquatur in vino ⁊ bibat in balneo. ¶ Satiriasis eſt continua erectio virge cum appetitu ad coitum. Cura: ſuper renes ventoſas ꝑone ⁊ extrahes ſanguinem. ¶ Suffocatio matricis eſt aſcenſus matricis ad ſuperiora ꝑꝑꝛe humores corruptos. Cura: teſticularum vulpis in oleo veteri cocti ⁊ ꝑoſſarium mulieribus impoſitum curat matricē ſuffocatā. ¶ Sciatica ē paſſio ſcie. i. anche vnde homines cogūtur claudicare. ¶ Serpigo eſt quedam ſpecies ſcabiei. ¶ Scurria ē quādo vꝛina ex ſe inſenſibiliter emittitur.

Tanus eſt maior contractio neruozꝫ a ceruice uſqꝫ ad doꝛſus. ¶ Thenasmo eſt appetitus ⁊ voluntas nimia egerendi cū modico aut nullo effectu. ¶ Tuſis eſt violenta cōmotio ſpiritualis virtutis ad expellendum ſuperfluitatem in ſpiritualibus. ¶ Tumor teſticularum eſt quando teſticularum tumefcunt. ¶ Tortioēs ventris cauſantur ex ventofitate.

Venum eſt materia ſubtilis aquoſa horribiliſſime qualitatis a tota ſubſtantia ꝑꝛemens corpus humanum. ¶ Viſcerana eſt infirmitas ꝑ quam homo cruozem emittit ꝑꝫ poſteriora. ¶ Ulceratio lingue ſit quando vlcera ſeu ꝑuſtule in lingua generantur. ¶ Vertigo eſt infirmitas capitis. Cura: omni hora dum vadis doꝛmitū recipe tres guttas vꝛine ⁊ ꝑone ad nares ꝑꝑꝛatū eſt: qꝫ multū valet. ¶ Fetoꝝ ozis ſit multipliciter aliquādo euenit ex putrefactione dentium. Aliquando ex putrefactione inteſtinoꝝ: ⁊ alio modo ſendus anhelitus appellatur. Cura: ſi ſit ex putrefactione dentiuꝫ vel ozis: tunc debes lauare os quanto melius ꝑotes ⁊ ceſſabit fetoz ozis. Poſt hoc recipe hanc medicinā videlicet duos lothones vitrioli albi: ⁊ melis quatuor lothones ꝑꝛimitus contunde vitriolū bene: poſt hoc cōmiſce cum melle ⁊ unge cum eodē gingiuas bene vna cum dentibus. Si autem fuerit fetoz ex ſtomacho: recipe ꝑꝛillulas aureas vnus quent: ⁊ da ꝑatienti: ſimiliter detur ei eſula cuꝫ vino calido: ⁊ poſt hoc dentur ei iſti pulueres: cinaꝫ momū: garioſilus: ꝑiper: ciminum: agreſte: ⁊ crocum: cuiuslibet vnum loth. hec omnia ſimul contunde: ⁊ da ei manducare ⁊ ſanabitur a fetore.



Consilium clarissimi doctoris domini Petri de
tausignano pro peste euitanda.

In nomine Jesu Christi mundi creatoris Amen.
Incipit tractatus de obseruanda vita p̄ preferua-
tione sanitatis tempore pestilentie.



Um omne animal per instinctum natu-
re conetur defende-
re corpus suū: et p̄-
longare vitā. Ho-
mo maxime q̄ pre-
ualet oib⁹ alijs aīa-
libus p̄ rōnem et in-
tellectū q̄bus do-
tatus est: oī se fati-
gare ad plōngatio-
nē et p̄seruationem
suūipsi⁹. Ad hoc vt
ipse possit operari aliquē fructum virtutis. Qui sit
nutrimētus sibi et illis qui sequunt̄ pollice. Et ideo
clementissime domie q̄ digne appellaris pijsim⁹:
sum dispositus reducere hunc tractatū in tali for-
ma. Quem ego Petrus de tausignano phisic⁹ mā-
dante serenissimo principe Saleazo comite virtu-
tus ad hec vt fiat p̄seruatio tue vite que non soluz
est vtilis tibi: sed etiam illis qui viuunt sub tua sa-
luberrima fronde compilauit. **C**prim⁹ capl⁹.

Alien⁹ in libro de ingenio sanitatis
primo circa finem dicit: q̄ nos decet
nō habere negligentia in cōplemento
ipsius sanitatis: ideo est magne p̄fectio-
nis in isto tēpore habere aliquod consiliū p̄tra vi-
res pestilenciales demonstrādo ingentū maxime il-
lorū q̄bus dependet salus et vtilitas multarū gen-
tū: que virtuosē recte ab illis sunt.

De rebus demonstrandis in hoc opere.

Quattuor sunt entis res principaliter de-
monstrande: et prima ē quot sunt cause
pestilenciales: et que res sit pestilentia: et
que sunt infirmitates pestilēciales. Se-
cunda est regimen puidendo p̄seruatione q̄ scz re-
gimen repitur circa sex res nō naturales: et circa ali-
quas medicinas. Tertia ē in remouendo aliquas
q̄dōnes que cōiter fiunt. Quarta est ad manifestan-
dum regimē curationis illoz q̄ sunt ifirmi morbo
pestilentiali. Ad declarationē prime ptis ē sciendū
q̄ ad pestilentia concurrūt quattuor res. Prima
ē dispositio infirmi. Secunda ē fortitudo rei indu-
centis infirmitatez. Tertia ē contactus. Quarta ē
moza q̄ ē inductiua magni nocumēti tpe pestifero

De dispositione infirmi.

Quāto ad primā cām dispositionis
infirmi: dico q̄ ipsa est p̄cipalissima
causa corruptiōis et infirmitatis: q̄ opa-
tiones rez actiuarū nō possunt genera-
re se nisi in rebus aptis et dispositis ad recipiēduz
ipsarū actionē: vt dicit Aristot. ii. de aīa. et Gal. i. li. de
differentijs febriz: caplo de febre pestilentiali: q̄
nullus agens inducit effectū aliquē nisi ex dispo-
sitione passi. et Auicenna. iij. can. fen. primo cap.
quarti tractat⁹: dicit q̄ corpa disposita ad recipiē-
duz tales actionē sunt vtētes nimio coitu et nimis
comedētes: et habentes poros latos: et similit̄ cor-
pora que sunt p̄similis qualitatis qualitati aeris

corrupti vt sunt corpa repleta supfluitatib⁹. Et
ideo Gal. li. j. cap. v. de differentijs febriz dicit: q̄ ē
necesse tpe pestis desiccare corpa humida: et ea
desiccata p̄seruare: et illos qui supfluitatibus sūt re-
pleti euacuare: et oppilationes apire: et parū inferi⁹
dicit: q̄ ille qui tēperate exercet corpus suū et ci-
bis tempatis vtit: oīno nō ē passibilis: q̄ i eo nō
ē dispositio infirmitat⁹. **D**e fortitudine agēt⁹.

Secunda causa est fortitudo agentis: q̄
aer in ista actione dicit opans: et dupli-
ci de cā pōt dici operans. Prima q̄ cor-
pora passibilia debite applicant ipsi: et
indebite tangit nos intus: et extra per in-
troitum pororum. **D**e contactu.

Tertia ē contactus: q̄ in isto tempore ē
mala aeris p̄prietas nō solum p̄ qua
litatem: sed p̄ opationē modi suppositi-
ti: et ista causa est fortior prima. Quia
vbi materia reperitur disposita inducitur effectus.
vbi autem nō ē dispositum ad talem effectū in-
troducendum non: vt habetur. viii. phi. et a Galieno
no primo de interioribus.

De loco pestifero.

Quarta ē morari in loco pestilētiōso q̄
aer cōtinuo dimittit de sua mala p̄prie-
tate: et sic disposit corpa ad corruptiōez.

De causis p̄prietatis pestilentie.

Quia aer nos cōseruat est videndū de
causis p̄prietatis pestilentie. Et dico q̄
cause sunt duplices. p̄ma ē vniuersalis
et remota: que ē dispositio adueniens a

formis et imaginibus celi. Quo habent necessario
illud cuius aduentus a medico ignoratur. Que dis-
positiones faciunt corrumpere aquam: et adhuc
producent corruptiones putrefacientes in visce-
ribus terre: et istud maxime aduenit per eclipsiz so-
lis et lune: et cōiunctione planetarum. p̄senti⁹ de
saturno et marte cum stellis fixis: vel per coaduna-
tionez illarū stellarū in signo humano: et p̄prie quā-
do habuit in domo: vel p̄ reuolutionez anni in vna
danit⁹ fm q̄ dicit Petrus de Albano in cōsilio
suo differentia nonagesimatertia. Alie sunt cause p-
ticulares que sunt vapores corrupti p̄mixti cum
aere vsqz ad minimas ptes: leuant a terra putrida:
vt est quādo aperiunt cauerne vel clausure aeris:
vel quando alique res sunt posite in aqua: vt linū
canepa: et similes res: vel vt sunt corpa mortua
non sepulta: vel arbor male p̄prietatis: vt nux: fic⁹
et similes res. Possent assignari alie cause quas ob-
mitto breuitatis causa. **Q**ue res sit pestilētia.

De deo dico q̄ pestilētia est vna mutatio
facta in aere: et talis mutatio potest esse
duplex. Primo in qualitate. Secūdo
in substantia. De primo quando aere
ficitur rabidus sine aliqua primarū qualitatz fir-
miter cāndaz. Que hnt in tantū exiccare mentes
hominū q̄ et generationes et vita corrumpunt: vt
accidit illis athenarū. Sicut a Galieno habet p̄rio
de differentijs febriz: de hoc tamen hic fmo nō
est. Secūda est mutatio in substantia ppter cōmixtio-
nē vaporū corruptorū ad minimas ptes ipsius ae-
ris: vñ totū aggregatū dicit corruptū ex mala p-
prietate respectu generatiōis humane. Et ista mu-
tatio dicitur esse in substantia: nō q̄ solū sit in sub-

stantia: s; in qualitate: stat q; aliquādo aliqua mutatio fit in qualitate: s; sit parua: tamē ē est in substantia: q; ista mala pprietates sequit odio substantia: accidētis illius aeris: s; ista ē de qua loquit. Et vt pōt cōprehendi p supradictas auctoritates: et mō isto pōt diffiniri.

P Diffinitio pprie pestilētie. Estilentia est putrefactio que aduenit aeri similis putredini aque que balneat putridū. Certe aer sic ingrossatur: et corūpit ex puluere istoz vaporz malo ruz pmixto: sicut corūpit aqua p ap-
positionem lini vel eius simile.

Que sint infirmitates pestilētiales.

Dico ergo q; infirmitates pestilētiales sunt duplices. s. pticulares: et cōmunes. Particulares sunt que non vnomet tēpore adueniūt multis. Et tales adueniunt p administrationē sex rez nō naturaliz in qbus homies indifferenter peccāt: vel adueniunt plus q; alteri. Et istud est quādo aduenit carbūculus vel quādo affligunt vnū: et nō multos stantes in bona dispositione. Cōis est duplex. Et ideo vnus est vsus: vel cognoscit in vna regiōe vel ciuitate: v; appellat Endymiacus quasi veniēs ex latere dextro: est maxime ppter aquā illius loci vel ventuz vt apparet in aliquibus ciuitatibus v; locis in quibus generant Bona sub mēto et alijs locis timefunt crura. Quā ponit Salienus i. viij. de interioribus q; nunq; vidit talem infirmitatez si cut ptinet in libro de aere et aqua. S; de predictis hic non loquit. Alia ē infirmitas pestilēnalis cōis: et pprie dicit epidimialis ab epi qd est supra: et alia quod ē supra alias. Que sic diffinit infirmitas epidimialis est facta subito et i vno mōto tēporis. Cōis multitudine hominū: q; nitali epidimia egritudines apparent diuerse. Naz aliquibus insunt carbūculi cū febre: aliquibus disinterie: aliquibus glāz dule: vel apostomata: aliquando variole: aliquādo morbili: et appellatur subita ad differentia: v; dimial q; venit paulatī. Ois alie sunt posite pprie ad differentia febris pestilēnalis: et illud sufficiat p primo capitulo presentis tractatus.

Secundū capl; in quo ptinet regimē curatiū.

Dico de primo restat dicere de secundo v; de regimine. Et istud debet fieri circa sex res non naturales: et aliquas medicinales. Regulariter operando p iquisitione istaz rez est sciendū q; meo visu homies deficiunt tribus modis. Primo modo p viam olfactionis venenose que aggredit mēbra pūcipalia. s. cor: cerebrum: et epar. Et isti moriunt cū signo pestilēnali. v; p inflationē: glandulam in emunctorijs illoz mēbroz principalium. Et tamen quādo cor offendit signū apparet sub assellis. Et quando cerebrū post aures. Et quādo epar in inguibus. s. dextro. Et quādo in splene in i guie sinistro. Et adhuc adueniūt carbūculi in alijs ptibus corporis. Et istud puenit quādo est maior putrefactio et adustio humorz ad itra corpus quos natura in quātum pōt conat expellere. Ideo quando apparent carbūculi iuxta membra principalia: vt est in pectore indicat peius: q; est signū q; tales humores sunt adusti et putrefaci circa regiones cordis. Secundario est p viam suffocationis na-

turalis caloris facte a causa humida et aquosa putrefactibili. Et certe nos videmus et vidimus humilitates coadunari in nostris corporibus pretertim in capite p quas fiunt apostemata in gula: que appellantur squinantie: et ex illis moriunt. Aliquādo descendunt multi catarrhi qui subito suffocant hoies. Aliquando generant multe surditates: et grauedines capitis. Et colligatiōes oculor: generant etiam multe pigritie. Multas paleres: et apostemes: et epilese: que in pēnti Florentie regnat. Tertia q; vermes generati ex malis humoribus p putredinē illoz veniunt ad partes supiores corporis: et ibi faciunt lesionē mordendo intantū q; corpora sincopizant: nihilominus recuperat: s; si nō subito auxiliant moriunt: ita p dolorem sicut p fumos venenosos eleuatos ab illis q; corūpūt et resoluūt spūs: istis talib; modis et alijs q; reducunt ad istos ē tra operandū p actus pūsuos: q; continent in sex rebus nō naturalibus. que sunt aer: cibus: potus: somnus: et vigilia: motus: et qes: inanitio et repletio. Et accidentia anime de qbus particulatim est videndum: et primo de aere.

De signis quando aer est pestilētiatus.

Tunc aer efficit pestilēnalis qñ vermes et reptilia apparēt vel variole q; res cōter pcedūt sine morbo pestilēnali. Tūc quibet d; rectificare aerē vel ire in loco in quo nō apparent signa ista. Et secus riuus est ire vbi nō sint: nec in pterito fuerint. Cā est q; reliquie q; remanserūt post epidimā habēt corumpere illos q; se transferunt ad illū locū: sicut fermentū qd circūdat a farina: b; disponere farinam ad fermentationē: ita et aer iam pestilētiatus habet disponere corpora: ideo nō ē reuertendū ad loca in qbus fuerūt epidimia. vel pestilētie. imo ē insistentū in omnibus locis circa rectificationem aeris.

De rectificatione aeris.

Circa rectificationem aeris. Primo in quātū possumus ē exiccādu ipse aer in domib; q; inhabitant: s; cū igne facto ex lignis quercus: vel fermentoz bñ siccoz laurt: myrtilli: iunipis: et aliorū odoriferz lignoz. Suffumiget camera mane et sero cū mastice: ture: et myrra: terbēina: sandaraca: d; pso: squinato: lauina: acoro: et similib;. Aspergatur dom; et maxime camera cū aceto vini odoriferi: et aqua rosata. Et cū multis citris suspēsis p camera: et ferre in manu: et olfacere pomū laudani: cuius hec permixtio. recipe laudani. 3. i. been albi et rubei. ro. ru. ana. 3. ii. storacis liquide. 3. iii. mire folioz mente. Bariofolorum: ana. 3. i. camphore. 3. i. misceantur et incorporentur cum aqua rosata: et succo buglosse et mellisse et fiat pomum.

De regimine cibi et potus.

Cibus d; esse talis substantie. Panis recens vnus vel duoz dierum et bene fermentatus: vel d; spelta munda a cortice. Confectus cum puluere anisorum et sale bene coctus. Potus vinum album clarum: et polituz ex medio sapore: nec rubrū: nec fumosum: vt spūs et humores nō calefiant: nec nimis parū. S; si possibile est vinū vetus: q; magis depuratū ē: magis desiccatur et minus recedit ab aquositate. Et d; vinum inaquare cum aqua cocta

z plus in estate q̄ in hyeme ē bibendū. Et nota q̄
porare aliquantulum vini maluatici ante q̄ homo
domuz exeat: vel alterius vini potētis est vtile: q̄
multifumu exiccantur: z spūs p̄fortant z corrobora-
ratur. Et aqua que decoquit̄ debet esse cursua: ex
loco petroso: vel bene arenoso: vel ex fonte claro.
Et sapor de bet intendere ad dulcedinez.

De regimine saporum.

Est sciendum q̄ oēs sapes debēt esse
ex limonib⁹ vel ex arancijs vel grana-
tis acetosis p̄mixti cū istis aromatib⁹:
quarum hec est descriptio. Recipe cina-
momi boni z electi: simziberis gariofiloz ana. 3. s.
Been albi z rubei. 3. s. corralloz alboz z rubeoz
ana. 3. s. car damomi. 3. s. croci. 3. s. zuchari albi ad
pondus oīum. Et fiat puluis subtilissimus cribe-
latus p̄ siricuz. Et minor q̄titas sumatur in hyeme
q̄ in estate. Si non est aliq̄d impediens: vt est fri-
giditas stomachi. Cōter est vti arancys: granatis
z citris. Et de semie illoz qui hñt singularē pprie-
tatem in isto oīmode recipiant: vel in forma trazez
vel in decoctione carniū: vel aliquo alio modo: ni-
si pateretur lesionem calculi. Ubi cōtinue est neces-
sitas q̄ vie sint late z aperte.

De aceto.



Semp̄ est bonū vti aceto nisi sit ipe-
diens: z p̄ficere cū eo sapes. Pre-
ter q̄ in strictura pectoris: alias fri-
giditate stomachi. Sed acetuz de-
bet eē boni vini albi: vt esset malua-
tici vel rubole zc.

De quo debet esse ferculum.



Ferculū dz esse ex spelta: mileo: rīso lenti-
bus remota prima aqua: panicu panis
elixatus: brodiuz ciceris rubei cum cor-
tice. Radices feniculi: apy: ferculuz cō-
fectū ex ouo est bonū. Paste maluz est. Et omnia
alia fercula cōla: exceptis istis. Ferculum spinacio-
ruz petrosilloz boraginis scolopēdrie: z habēda
singularē virtutez. s. ruta: marubiū: psopus: z scabi-
osa zc.



De capparibus z fructibus vtriusque.
Apparis conditi cum aceto maxime in
principio cene. Supponendo aliquid
ex aromatibus predictis maxie in hye-
me. Sepe comedendo cū aceto i mo-
dica q̄titate est vtile. Nam generat hu-
morem corrodentē venenum: s̄z Auicennā. q. cañ.
oia alia agrumina sunt euitanda. Qua cocta i pru-
nis: vel in aqua remoto albumie sunt valde vtilia
p̄scēs omnes sunt euitandi ppter humiditatem
suam: z p̄ferit illoz qui hñt squamas magnas.
Et ita anguille pōt vti aliquibus vicibus: paruis
p̄ cibis fluminis vel lacualis vel maris. Sed est
bene squamandus: z eiiciēdo interiora: postea ab-
luere z fricare cū anis: z aceto: z assari: z nō frica-
ri cū oleo: z comedant cū aromatibus supradictis.
Et in hyeme in maiori quantitate q̄ in alijs tēpō-
ribus. Post comestione piscium vinum potē po-
tens. Et simul cum comestione comedere aliquas
nuces auelanas: vel amigdalas. Lac euitare opz
ppter suam citā corruptionē. S̄z post assumptioez
omniū ciboz z potuū pōt sumi aliquantulus casei
q̄ p̄fortat virtutem digestiua. fructus oēs sunt ma-
li: q̄zuis loco fructuū est bonū sumere post cibum
corziandros confectos: z est multū vtile vt cōtineat

y. cañ. Nota q̄ in principio prandij ē bonū come-
dere tria folia rute: duos siccus siccos: z vna nūcē
insimul: z est medicina specialis cōtra pestilentia:
z contra quolibet venenum. Intantū q̄ illi qui ti-
ment toricari deberent valde vti.

De repletioe z ibanditionum diuersitatibus.



Ico. n. q̄ glibet caueat sibi a nimia co-
mestione z potu. Sed dz vti pauco ci-
bo respectu soliti: z sic ē potu: q̄ sup-
fluitates multiplicant p̄ nimia come-
stionez z potū. Diuersitates ibanditio-
num sunt male: ideo glibet h̄z cōtentari de vna im-
banditione. Et si plures p̄parant comedat de illa
sufficienter que melius potest digeri. Euacuatio
p̄uocāda: z beneficiū vētris: si natura p̄ se nō opat̄
vz cū supposito: cristerijs: vel pillulis: cuius de-
scriptionē inferius dicā vie vinales teneant apte cū
diureticis: z pozi cū fricatiōibus factis stomacho
ieiuno: purgatiōes cerebri debent pcurari per na-
res: vel per palatum: z est euacuanduz corpus ab
omni superfluitate quantum possibile est.

De fleubotomia.



I sanguis in corpore fuerit vincēs erit
flebotomandus vt declinet ab oīmo-
da cōplexione. Et vniuersaliter vsus di-
minuēdi istis tēporibus est vtilis: si se-
mel in mense z par in vice. Et vbi autē
alij humores sint vicētes: s̄z melācolia p̄ viaz adu-
stiones: vel colera admixta sanguini est intēdendū
circa ipsoz exicationem. i. circa euacuationē: z si
esset corpus nō sanū non esset intēdendū cū euas-
cuationib⁹. Sed abstineat se a rebus supradictis.

De somno z vigilia.



Euendum est a nimia dormitione ma-
xime de die: nec etiam post cibum ime-
diatē: si non est completa vel mediata
prima digestio: nec est bonū dormire su-
pinus. Sed in p̄mo somno supra latus
dextrum: per duas horas: deinde supra sinistrum:
postea reuertere supra dextrum. Ultimo sōnus sit
cū capite bene eleuato: z sit bene cooprus: bonum
est vigilare p̄ duas aut tres horas post cibum.

De motu z quiete.



Euendum est qñ actualis est epidimia
a forti exercitio z maxime in aere dete-
cto. Sed si fiat aliquod exercitiū fiat in
aere non apto stomacho ieiuno. Et an-
teq̄ veniat actualis epidimia: fatiget
corp⁹ suū: q̄ tūc magis laudat exercitiū q̄ quies.

De accidenibus anime.



Bira: tristitia: z timore: sollicitudie co-
gitatione cauēdū est: sed cōgaudēdum
est: z delectandū: cum somno: cantu:
historijs: z his similibus.

De coitu carnali.



Abstinenendum est ab actu coitus: z si nō
in totuz pro maiori parte. Et ideo tūc
non est bonum vxorem ducere: nec no-
uum matrimonium procurare. Simili-
ter z politice conuersationes: z maxi-
me illi qui sunt corrupti: vel magis apti corru-
ptioni.

De medicinis istis temporibus p̄parandis.

Ex sunt medicine preparande. Prima est administratio pillularum positarum ab Auicenna. iij. can. capitulo de preseruatione a pestilentia cuius descriptio hec est. Recipe aloes epatici. 3. ij. myrre croci ana. 3. i. conficiantur cum succo mente et fiant in forma ciceris. Et assumatur omni die una in mane ante cibum: et habent resolvere et desiccare prohibendo putredinem. Ea si ille qui assumit esset apertus inflammationi tempore estiuo addatur. 3. i. terre sigillate et reformentur cum aqua rosata: sed in alijs temporibus fiat ut dictum est.

De tyriaca.

Secunda est assumptio tyriace bene fermentate ex decem annis in hac regione de qua habet sumi in omni ebdomada. 3. i. in estate cum aqua rosacea. In hyeme cum bono vino odorifero: vel sumatur cum succo ro. vel aqua citri: et ante cibum per sex horas stomacho ieiuno: et ab omni repletionem remoto.

De metridato.

Tertia medicina est metridatu: et in quolibet casu plus quam tyriaca et in qualibet septimana sumatur. 3. i. et quinqz hore ieiunare. Et debet sumi stomacho ieiuno: et ab omni repletionem remoto: et sit fermentatus ad minus per unum annum.

De coriandris.

Quarta medicina est assumptio coriandrorum confectorum de mane. Ex quibus sumatur coclear unum. Deinde sumatur tertia pars unius citri vini odoriferi. Similiter assumptio zuchari rosati tempore et hora magni usus.

Contra vermes.

Quinta medicina est contra vermes: et dico quod illi qui sunt dispositi ad generationem vermium: sumant omni mane unum citium vini in quo bulium sit ab finitum usque ad consummationem tertie partis decoctionis.

Sexta medicina preparatoria videlicet syrupus auctorum.

Sexta medicina et vltima est syrupus hic descriptus ab auctoribus vicibus sum expertus eo: quia reddit corpus mundum a superfluitatibus: et per consequens desiccatur: confortando cor: cerebrum: et epas: et omnia alia membra. Et quantitas que habet sumi in vice est. 3. i. 5. Cuius descriptio. Recipe coriandrum citri: radices capparis: berberis: sandalorum: triusque spodyana. 3. ij. gariofilate: buglose: mellis: se: boragini: cicoree: ana. 3. i. acetose epatice: marubij. ana. 3. 5. lactuce silvestris. 3. ij. seminum cōium: violarum ana. 3. i. cinij: epitunij: senepolipodij: añ. 3. i. suci absinthij: suci fumi terre: suci chebulorum: ana. 3. i. diagredij. 3. ij. zuchari albi libras duas. et fiat syrupus et acetosetur: cum aceto suci ciconiorum quod sufficit et vtere eo etc.

De modo sumendi has sex medicinas.

Modus administrationis harum sex medicinarum est talis. In prima die sumatur syrupus in pulsu aue marie. i. in aurore et su-

pra dormiat per unam vel duas horas. Secundo die capiat. 3. i. tyriace. tertia die capiat coclear unum coriandrorum. Quarta die decoctionem contra vermes. Quinta die. 3. i. pillularum supradictarum. Sexta die quiescat. Septima die capiat aliquod predictorum. Et non est malum si omni ebdomada capiatur. 3. i. illarum pillularum. Et illa die quo capiuntur pillule non capiatur aliquod predictorum.

Capitulum tertium in quo mouentur quedam dubia.

Primum dubium est. Cum omnia inferiora regantur et gubernentur per superiora maxime per solē et lunam: ut patet primo metheororum. Et cum necessario iste mundus inferior sit continue subiectus impressionibus superioris mundi: ut ois virtus inferioris gubernetur per superiorē. Qualiter hec cause superiores possunt esse cause inferiorum causarum. Ad quod respondetur. Nam res superiores semper intendunt conseruationem inferiorum: ut habetur a philosopho primo metheororum. Sed per accidens aliquando sunt cause corruptionis et mortis: quia mouentur in suis circuitibus per varios et diuersos motus et propter hoc habent diuersas coniunctiones et aspectus. Quia de causa ipsarum influentiarum super causas inferiores faciunt simul alterationem: et hoc contingit quia illud quod debet conseruari ab influentis non conseruatur. Sed disponitur ad corruptionem per tales influentias alteratas ut patet.

Qualiter epidimia potest prouenire a putrefactione aeris.

Secundum dubium est. Cum aer sit simplex et putredo sit quoddam mixtum: nec aliud quam indebita mixtio humidum cum sicco. Qualiter epidimia potest prouenire a putrefactione aeris est: quia aer est plenus ignis ut Aristoteles. quinta particula problematum: problemate. xlvij. Cui respondetur quod aer simplex non corrumpitur in se. Sed per admixtionem vaporum terreorum vel aquosorum corrumpitur. Et quia ignis non habet commixtionem alterius elementi non corrumpitur. Sed omnia alia sic ut per quarto metheororum. Omne elementum corrumpitur preter ignis. Ergo cum aer qui nos circumdat non sit purus neque simplex ut ait Auicenna primo can. fen. ij. capitulo de aere. Nos videmus quod aer est quasi una aqua maris vel lacune quous non sit purus neque simplex tamen potest corrumpi. Et de isto non loquitur philosophus in preallegato problemate sed de puro aere in loco proprio.

Quare magis vno tempore causatur pestis quam alio.

Tertium dubium est propter quid est quod epidimia plus aduenit tempore estiuo et autumnali quam alijs temporibus. Cum aer tunc sit calidus et siccus: et per consequens remotus a putrefactione. Ad quod sic respondetur: quod quinqz sunt cause propter quas citius accedit in estate et in autumno. Prima est quia aere existente subtiliato a caliditate precedenti magis aptus recipere omnem impressionem vaporum et fumorum mixtorum et congregacionem ipsorum. Quare sequitur quod citius et leuius

causatur putredo. Secunda causa est quia caliditas precedens que propter suam siccitatem prohibebit putredinem est nimis eleuata et adducta usque ad finem. Tercia causa est quod cum venti multiplicentur asportant secum malos vapores eleuatos ex multis locis remanendo in aere causa corruptionis per silentie. Quarta causa est quod corpora pluribus superfluitatibus multiplicentur: et virtutes naturales sunt debilitate propter diuersitatem temporis resolutionum calorem naturalem per motum intrinsecum et extrinsecum. ut apparet in commento primo tertij pronosticorum. Quinta causa est: quod tunc multi fructus sunt qui habent disponere corpora ad putrefactionem propter nimium usum eorum.

De aliquibus auibus que tempore pestis non habitant in aere epidimato.



Quartum dubium est propter quid est quod tempore epidimie alique aues consueve habitare montes et volare in altis: habitant planicie: et volant iuxta terram: et sic e converso. De habitantibus planicie: tunc temporis. Similiter alique serpentes: murres et similia. Respondetur quod quoniam aer prius corrumpit quam aqua propter formam celorum vel imaginum que habent de hoc facere necessario. Aduentus quare ignorat a medico in quantum medicus: aues que volendo aufugire corruptionem habitant montes et volant in altis et veniunt ad planicie et volant prope terram. Sed quoniam in terra generatur corruptio: et putredo prius quam in aere: tunc aues et serpentes assueti habitare illas planicies fugiunt putrefactionem et corruptionem terre: et vadunt ad montes et ibi habitant: et volant in altis quantum possunt. Et aliquando apparent aues que recedunt a montibus et veniunt ad planiciem. Et post aliquot tempus reuertuntur ad montes et dimittunt planicie. Cuius est quod primo corruptio aduenit montibus. Deinde per tractum temporis accidit in visceribus terre: quod aer est subtilioris substantie et leuioris alterationis quam terra. Deinde per continuationem corruptionis et alterationis: etiam fit in terra. Ideo epidimia incipit primo in aere subtiliori et fortiori et citius agreditur quam in grossiori et debiliori.

Que corpora citius offendunt tempore epidimie.



Quintum dubium est. Que corpora citius offenduntur tempore epidimie. An corpora que habent poros latos. An que habent strictos vel frigida: seu calida: siccata: vel humida. Ad evidentiam quatuor: sexti octauum. Est sciendum quod aliqua sunt corpora que habent poros latos naturaliter: ut sunt calida et humida. Et alique habent poros strictos: ut sunt frigida et siccata. Adhuc aliqua sunt que habent repletionem: et oppilationem que reddunt poros strictos. Et aliqua non habent oppilationem aliquam. Et circa hec dico quod quattuor sunt notanda. Primum est quod corpora que habent poros strictos naturaliter que non sunt oppilata ut sunt melancolici: ut alique venule minus ledunt tunc temporis alijs corporibus. Quia remissa caliditas cordis et paucus aer per poros attrahitur: quod porus sunt stricti et est quod ille paucus aer paucum tempore retinetur: quod non sunt oppilati nec repleti. Etiam illi que habent qualitates conditionales prohibentes corruptionem: ac putredinem: ut est frigiditas et siccitas. Secundo


dico quod corpora que habent naturaliter poros latos et efficiuntur stricti per oppilationes: ut sunt corpora repleta quibus sunt robusta: nihilominus plus offenduntur in aere pestilentiali alijs corporibus. Ratio est quod multum aer est attractus ad intra sic propter inspirationem et expirationem: et sic quod oppilata sunt longo tempore retinentur: et non fit depressio illorum ab aere. Et adhuc sumi capinosi non purgantur. Et quod habent qualitates conditionales conformes huic corruptioni: videlicet caliditatem et humiditatem: et prohibetur debita transpiratio que est causa corruptionis. Tertio dico quod illi que habent poros naturaliter strictos et oppilatos minus offenduntur quam corpora prius dicta et omnibus alijs ab his magis leduntur. Prima pars est manifesta per rationem primi dicti: et per rationes que dicuntur in quarto dicto. Quarto dico quod corpora que habent poros latos naturaliter et sunt oppilata magis offenduntur quam corpora dicta in primo dicto. Sed minus quam corpora dicta in secundo. et tertio dicto. Ideo prime partes sunt manifeste per rationes primi dicti et est manifesta ratio secundi dicti: sed tertia pars sic probatur quod corpora tertij dicti habent oppilationes per quas prohibetur transpiratio: ergo fit corruptio per prius calidi: et interceptio caliditatis medie est epidimialis: et ideo leuiter intrarent epidimias. Quinta ratio est in corpore tertij dicti. Aer est attractus et retentus longo tempore et spatio et virtus que habet contra operari est debilis: ergo generatur putrefactio in talibus corporibus: sufficiat ergo iste rationes contra aliquos. Quibus de causis est manifestum quod corpora calida et humida que habent poros naturaliter latos et oppilatos magis offenduntur. Postea ista que habent naturaliter strictos: et adhuc oppilatos sunt magis offensi. Ultimo illa que habent strictos et non oppilatos sunt offensi.

Qualiter aliqua corpora in epidimia moriuntur: et aliqua non.



Sextum dubium est propter quid est quod aliqua corpora in epidimia moriuntur et aliqua non. Cum cause sint vniuersales. Et quare vnum moritur in vna familia: alij vero non. Et aliqui moriuntur in vna domo: et vicini non. Aliqui in vna contrata: et in alia non. Respondetur quod propter diuersitatem infirmorum complexionum et compositionum naturalium et actualium repletarum in illis. et est propter diuersitatem causarum agentium que adueniunt per diuersitates et aspectus. Residuum inuenies in rationibus none questionis.

Quare in presenti homines et non boues moriuntur.



Septimum dubium est: quare in presenti homines et non boues moriuntur: et in anno preterito moriebantur boues et non homines. Respondetur quod istud accidit per rationes proprietatis singularis que tunc adheret aeri propter quam proprietatem generatur putredo in corporibus hominum: et non bouum. Et ita anno preterito poterat esse vna proprietatis singularis in aere que habebat respectum supra boues et non homines.

Quare iuvenes robusti et fortes moriuntur antiquo non.



Octauum dubium est propter quid robusti ac fortes moriuntur. Antiquo vero non. Est dicendum quod antiqui sunt sine oppilationem siue possunt esse cum suis poros strictis naturaliter et non oppilatis. Iuvenes.

fortes et robusti habebunt poros naturaliter latos et oppilatos. Ideo citius corrumpuntur et moriuntur ex ista pestilentia: quia in iuueniculis plus de humiditatibus et supfluitatibus abundat que diminutio caloris naturali habent causare oppilationes. Et in pueris abundat humiditas: et regimen inordinatum que res faciunt oppilationes.

Quare moniales et incarcerati non moriuntur.

Non dubium est propter quod moniales et incarcerati non moriuntur. Et aliquando omnes moriuntur: aliquando non. Rursus sic quod illi qui habitant aerem cooptum: et non fatigant se in aere detecto: nec habitant cum aliquo qui habeat ipsum corrumpere magis conseruantur. Sed aliqui vel aliqua ipsarum corrumpuntur: ceteri omnes se corrumpunt quia omnes insimul cohabitantes: et viuunt et anhelant et vniuersum regimen et aere particulariter per rationem participationis aspectus vnius loci: quia monasterium potest esse edificatum sub tali ascendente quod in vno tempore aer illius loci est magis corruptus quam aer alterius loci. Ideo quando vnus moritur in vna habitatione: alij debent recedere tanto citius quanto sunt generati ex vno patre. Quia sepe filij sapiant naturam patris. Ideo si vnus infirmatur alij sunt dispositi ad infirmitatem. Nihilominus aliquando contingit quod vnus moritur in vna familia: et non omnes propter dispositiones participationum repertas in illo: et non in alijs: istud sepe aduenit in vna contrata: non in alijs: ista dico de ciuitatibus.

Quare patientes podagras non moriuntur.

Ecce non dubium est: propter quod est quod patientes podagras non moriuntur istis temporibus. Cui respondetur quod in podagris sunt pauci humores ac oppilationes: ob quam causam humores prauis descendunt ad extrema: et extrinseca et ibi generat podagras. ideo non sunt dispositi ad se infirmandum.

Quare epidimia venit ut plurimum post guerras.

Non dubium est propter quod venit epidimia ut plurimum post guerras: et post famem etc. Responde quod tempore guerrarum regimen est inordinatum. Ob quam causam generantur prauis humores in corporibus dispositis ad corruptionem. Accedunt etiam propter superiora que disponunt, sepe guerras et sepe disponunt ad pestilentiam: nec non post caritatem veniunt pestilentie: quia tempore fertilitatis corpora nimis replentur ob quam causam generantur oppilationes. Deinde corruptiones: hoc sufficiat de tertio capitulo etc.

Capitulum quartum de modo curatio.

Nunc sequitur quartum capitulum. In quo tractatur de acturatio. Cuius intentio est triplex. Prima est circa virtutem. Secunda circa febrem. Tercia circa apostema. Primo circa primam intentionem est sciendum quod in febricitantibus apparet virtus multum debilitata: et istud accidit quia spiritus maxime resoluuntur: ac etiam complexionem membrorum principalium sunt alterate: et maxime complexio cordis ab humoribus venenosis: qui querunt cor a forma specifica: et alia membra principalia. Ideo insistentium est in dando cibos copiose: boni et magni

nutrimenti qui leuiter digerantur: qui leuiter possint digerere: spiritus multiplicari: ut sunt fastiani: pulli: et pueri: et similia. Condiuntur quoque tales cibi cum aceto: agrestia: succo malorum ranciorum: limonum: vino mali granati: et similibus que habent prohibere corruptionem infirmi. Capiant etiam tales cibi: ultra appetitum: quia ut plurimum in talibus deficit appetitus. Et minus quam tempore sanitatis. Est etiam vitendum confectioibus: electuariis: aquis: et pulueribus: ac etiam alijs cordialibus que ceteri ponuntur ab auctoribus. Ab extra sunt membra confortanda principalia non dimittendo. scilicet cor: cerebrum: et epa. Et alia membra ut stomachus: renes: et maxime confortetur membrum in quo est talis humor venenosus: et istud fiat cum medicinis appropriatis membris confortandis. Mer camere sic rectificetur pro illis qui stant in camera: sicut pro egro aspergendo cum ramis et frondulis: et rosis madefactis in aceto cum sandalis cum presumigis ex myrra: thure siloaloe: storacem: et similibus. Ponendo lintheamina madefacta in aceto cum cortinis: et sepe renouando: et muri camere aspergantur sepe aqua et aceto: et sint super lecto et banchis multi citri etc.

De corporis euacuatione et de clisteri faciendo.

Secunda intentio est maxime in desiccando: et euacuando corpus: cum flebotomia: vel solutione ventris. Quia si materia vincens fuerit sanguinea incontinenti est incipiendum a flebotomia. In quo est apostema. Ad hoc ut humor venenosus non spargatur per diuersas partes corporis: etiam cōfentiēte virtute copiosa fiat flebotomia: et si materia vincens sit alia a sanguine: puta colerica vel melancolica est euacuanda cum solutione appropriato illi. Et si illa materia fuerit sanguinea etiam alijs humoribus superabundantibus. In primis fiat flebotomia. Consequenter desiccantur humores eradican- do si fieri potest. Et si aliquę reliquię remanent sunt digerende cum syrupis appropriatis. Et primo eradicetur: et ipso intermedio fiat clistere comuni: et aliquantulum acutum: et multum est utile vti continuo. scilicet bis in die. Similiter syrupus describitur ante. Et posset in isto casu dare vna vice. in maiori quantitate alijs casibus.

De cura apostematis.

Tercia intentio est circa apostemata et ad chirurgicos spectat. Et est sciendum quod apostemata que apparent tempore pestilentie: que sunt perniciose et mortalia sunt ista. scilicet antrax carbunculus glangula: vel patriarcha: ignis pſicus: et pruna de quibus dicitur per ordinem. Et primo de antraxe que dicitur ab antro quia nascitur in locis absconsis cordis: vel quia pantrum vadit ad cor quod est in medio: et sic diffinitur. Antra est apostema paruum ad modum pustule in principio fraudulentum et venenosum: quod corrumpit particulam a qua eleuatur adulterando illam et partes que propinquuntur tumescunt ad formam sanguinis combusti: qui acquirit eam malitiam in prima aduſtione: et ex mortali rubedine: et cum vltterius accenditur: et ardet augmentatur venenus et malitia. Et acquiritur vnus color citrinus: etiam si vltterius accenditur quod locus efficiatur siccus: tunc augmentatur gradus malicie: et tantum quod corru-

pit subito partes ad quas pertingit. Et facit pun-
cturam vt ignis: et efficitur nigrum ac obscurum.
Et si cum eo exierit liquor et erit in superficie mem-
brum similis illi q fuit in corpore combusto vt caute-
rizato ab igne: ob qua causam sequitur q antrax e-
x tribus maneribus: vt pz cum isto apostemate.
Adiunguntur seu accidentia: vt est tremor cordis:
syncopis: debilitas pulsus. Et iste accidit quia va-
pores mali leuati veniunt ad cor. Inde parum dif-
fert a carbunculo: qz est de materia sanguinea non
adusta vel denigrata. Primo in illa est aliquis li-
quor: q per adustionem exacuitur adhuc non est ta-
te venenositatis vt est Antrax. Et appellat carbun-
culus quasi carbone lucente et non mortuo. Circa
ipm sunt notande tres res. Prima est color: locus
et dispositio partis: vnde color niger est peior em-
nibus alijs. Deinde viridis. Deinde cistrinus. Dein-
de rubens. Vnde locus est peior iuxta aliquod me-
brum pncipale: qz extremalibus partibus: vnde
dispositio partis est peior illa que est desiccata qz
humectata.

De cura antracis.

In cura antracis est euacuandum vt di-
ctum fuit in interioribus sm consensu
virtutis: ac etatis. Secundario est eua-
cuanda materia defluxa ad illius par-
tem cum appositione ventose: simul cu
scalpellatione: et cum sanguisugis et fiat cauteriu
cum ferro ignito. Et euitetur cauterium cum cera
ardenti: qz congelatio cere phibet euaporatione
malorum vaporu: imo sparguntur per mebra. Ad
huc potest fieri cauterium potentiale ex medicinis
cauterizantibus: vt est vitriolum: viride es. Arseni-
cum. Calx viua: et capitellum factum de calce et sa-
ponis: vel de aqua fortis: ex similibus rebus. Etia
bonum est emplastrum factum de scabiosa: cuz ipa
in paucis temporibus mortificat. Similiter istud em-
plastrum est bonu. Recipe vitellum vnius oui: et
cum illo permisce de sale quantum potes: et debes
innouari de vna hora in aliam. Nihilominus ego
laudo plus cauterium acutale: et debent admini-
strari res que operentur contra venenum. Simili-
ter detur hec medicina omni die. Recipe succi sca-
biose. 3. li. terre sigillate: boli armeni loti an. 3. s. mi-
sceantur et potentur in mane. Similiter coagulum
bibitum expellit venenum a corpore: maxime coa-
gulum legosis. In vice. 3. i. cum vino odorifero.
Similiter succus citri. 3. ij. cuz vino bono. Similiter
terra sigillata: ambra: corallia: metridatū: et tiriaca.

Cura circa accidentia que veniunt a
prauitate materie.

Tertio est notandum circa accidentia q
veniunt a prauitate materie et a calidi-
tate ipsius. Et etiam a caliditate medi-
cinarum qua facit cauteriu: vel a cau-
terio actuali in parte infirma circun-
stantis vt mortua cum aliquo ferro: vel vt qz cau-
satur dolor et est causa inflammationis: et apostema-
tionis. Ideo d expectari quousqz naturaliter euellat-
ur: et incidatur circa partes suas non dimittendo
aliquid carnis infirme: et corruptio no vadat ad p-
tes sanas. Et est bona scarificatio vt mali humo-
res possint exire. etia ventosa euellit de profundo
sanguinem corruptum et venenosum vt non reuer-

tatur a circūferentia ad centrum. Fracta cute et ex-
tracta materia venenosa in eius euacuatione. Ca-
ueat sibi medicus a malis fumis: et non tangat cu
manu: qz vna materia distillati subtilis est conta-
giosa intatu q medici postea infirmantur. Immo
apponatur medicame qd abstergat et mundificet.
Sicut medicamen factum ex farina ordei et melle
cum paucis salis apponendo soliu. Ad idem re-
cipe sarcole mellis. an. partes equales misceantur
et mirabiliter operatur facta mundificatione ad-
ministratur generatuum carnis. Et si est concaui-
tas capiatur basilicu et teratur et impleatur conca-
uitas et fiet generatio carnis. Ad idem recipe
aristologie rotunde: centauree minozis: pentasilis
consolide maioris. ana partes equales: et distillet
aqua ad lambicum et reseruetur tempore: et e mi-
rabilis in reseruacione carnis. Ad idem empla-
strum ex coriandris recensibus et vuis passis recē-
tibus cum melle est bonum. Ad idem radix an-
fodilli cum fece vini. Similiter bertonica cum pin-
guedine emplastrata. Et ista sufficiant in cura car-
bunculi et antracis.

Quare dicitur patrachia glandula siue
bustio et similia.

Secundario est notandus de patrachia
siue glandula vel bustione. Et dicit pa-
trachia: a patrachio homine qui pmo
inter xpianos inuenit. Et dicitur bustio
siue bubo ad similitudinem illius ani-
malis. quod hic vocatur qz tale apostema accidit
in locis emunctorijs absconditis: vt illud animal
continuo stat. Sed differunt qz patrachia fit de ma-
teria venenosa. Bubo autem non. ideo sic diffini-
tur. Patrachia est apostema venenosum perdens
quod operatur circa pulsus cordis cum sincopi et
tremore: multiplicatur tempore pestis in locis p-
dictis: vt in collo. Causa istius est causa diffinitionis
que etiam est dicta supra. Et differt a carbunculo:
qz materia sua quis sit ex sanguine non est tantus
adusta: vt in carbunculo: et est signus alterius ma-
lie: quia occidit in tribus vel quatuor diebus: et ali-
quando in paucioribus: et aliquando in quinqz:
si peruenit vsqz ad septimu potest sperari. Aliqua-
do generatur ex materia flegmatica: et aliquando
humida cum sanguine permixta. Similiter est dif-
ferentia qz carbunculus nascitur in extremitatib:
et in alijs partibus corporis exceptis emunctorijs.
Et etiam in principio non causatur eschera vt a
carbunculo.

Modus curationis istorum.

In cura istius apostematis. Scien-
dum est q duplex est intentio: scz vni-
uersalis et particularis. Vniuersalis fit
sm intentionem. scda ita q si tale apo-
stema est sub asellis dextre fiat fleubot-
omia ex alia parte in brachio: et ex vena comuni.
Si post aure fiat fleubotomia ex vena capitis illius
lateris in manu. Si in inguibus ex saphena illius
lateris. Cura particularis est duplex ad hoc vt ma-
teria extrahatur sensibiliter cum rebus que habet
extrahere et resoluerre vapores illius: et hoc fit cuz
appositione ventosar et scalpellatione: et sanguisugis:
vel cum cauterio actuali vel potenciali: vel cuz
omni alia re cum qua melius fieri potest. Primo

si apponitur ventosa cum igne: deinde fiat scarifi-
catio: et de nouo reponatur ventosa vel sanguis
ge bone vel habeat gallus et depiletur circa puc-
bunda apponatur loco per horam: et in alia hora ap-
ponatur alter: et sic fiat per totam diem et venenum ita
attrahitur a corde galli. Ideo gallus subito mori-
tur. Secunda est quod fiant emplastra que habeant attra-
here et resolueret sensibilibiter. Quorum hec sunt descri-
ptiones. Recipe medulle fermenti. 3. iij. sinapis:
semis vitice: an. 3. s. vitrioli. 3. ij. Catarridarum nu-
mero. x. misceantur et componantur cum melle dispu-
mato. Ad idem recipe capitellum factum ex calce vi-
na: saponem: et cum salina est bonum. Ad idem recipe ras-
di. nasturtij: agrimonie: ana. 3. l. hec bulliant cum
oleo de liliorum: melle: ana. 3. iij. Ad idem recipe ca-
taridarum numero. x. puluerizent: et bulliant cum oleo
veteri usque ad spissitudinem et apponatur loco. Aliud
recipe cartomi: nucis: rancide: seminis caulis: cepe
stercoris columbini: ana. 3. l. misceantur et pulueri-
zantur: et fiat emplastrum: similiter appositio istius ca-
pitelli est multum utilis.


Ad frangendum et euacuandum apostema.

Singulares medicine que frangunt apo-
stema: et euacuant materiam sensibilibiter
sunt iste. v3. Species gumme: ut est galba-
na: euforbiu: arsenicum: nasturtium: vitice:
ca: semine sinapis: nuces rancide. tanta-
relle: cordumen: salis gume. baurach: piradon: ster-
cus anium calidorum: ut est columboz: accipitrum: et
falconu. Componantur omnes iste res cum gum-
mis et succis vel melle: vel stercore auium: vel capitel-
lo: vel lixiuio fortis: quo vitetur tinctores: vel alibi
misce. **C**alia circa hoc specialis in materia insen-
sibilibiter resoluatur. Recipe baurach: salis armonia-
ci: allei: piperis nigri: ana partes equales pistentur
et misceantur cum succo scabiose: et fiat emplastrum.
Aliud bonum Linoglossa viridis et siccata trita
inter duos lapides similiter consolidata maior: mirabi-
liter operatur. Et hoc vidi per experientiam quod resoluunt
venenum. Similiter operatur vincetoxicum siue antifo-
rata: quod habet proprietatem singularem.

De pruna et igne persico.

Modo restat istud capitulum videre et e-
notandum quod dicitur carbo vel pruna:
quod in principio sue apparitionis facit
vnam adustionem et escharam: quod cor-
rumpit partes quibus superuenit cum
sorditie de ambulando et facit membrum nigrum: et
est de genere carbunculi et nihilominus differt ab

illo: quod pruna generatur ex sanguine subtili: ut sepe
apparet tempore pestilentie. Materia autem car-
bunculi fit ex sanguine grosso adusto: ut dictum est:
adhuc differunt quod puritius precedit carbunculum.
non autem in pruna. Adhuc differunt quod in adu-
tu carbunculi color semper est niger: et in adu-
tu alio-
rum. Aliquando rubeus. Aliquando citrinus. Ali-
quando viridis. Adhuc est differentia inter carbo-
nem: et ignem persicum: quod ignis persicus est quan-
do colera predominatur melancolie in tali adustio-
ne: et tunc est nigredo circumstans quantitatem et cum
tali colore: vel infans laudat tempus capiendi ti-
riacam: sanis et egris cum stomachus vacuus fue-
rit et tu bene digesseris: et aliquando ad fabam egypti-
ace magnitudinem: aliquando ad modum aue-
lane. Et ad pondus. 3. s. vel. 3. i. ad plus. finem quod plus
ad digestionem stomachi tempus habes: et modo
cum aqua: modo cum vino: modo cum succo gra-
nati: modo cum urina: modo cum succis: ut dictum est
superius: appropriatis quod tibi ex te scire relinquit.
hoc modo medico logico et sapienti. Ita adhuc
circa exhibitionem ipsius tiriace. Quam ego pes-
trus voco dominam medicinarum. Considerare
etiam oportet anni tempus: regionem: et etatem:
ut puta si estas est maxime cum calidior facta fue-
rit. Nam leditur inde corpus ut circa hoc. Sa. Ipo-
cratem allegat cum dicit. Eas ante canem mole-
stas esse farmacias. Et quia ut plurimum febres in-
fert hoc tempus partius utendum est isto calidissi-
mo tempore tiriaca: similiter ab hominibus ma-
gne caliditatis partius est utenda nisi forsam co-
gat necessitas. **E**t eadem ratione quia fortior est
virtus tiriace roboris infantium propterea ipsam
Salienus infantibus prohibet exhiberi: nisi causa
predicta: cum ipse asserat se vidisse mirabiliter mor-
tuum fuisse infantem unum ex immoderato usu ti-
riace: dissoluit enim in totum ambitum eius et ven-
trem fluere fecit: sic propter irrationabilem assump-
ptionem tiriace perit infans. Salienus finaliter co-
cludit qui in terra calida conuersabitur: ut puta ni-
grorum vel similium: caue uti farmacia. videlicet ti-
riaca nisi ut dictum est in necessariis causis et suffi-
ciat tibi ea que inibi est caliditas. **Q**uocirca a p-
mo ortu Julij: et in quantum durant dies canicu-
lares: scilicet per totum vigesimum secundum diem
Augusti: et hominibus calidissimis per totum Au-
gustum exhiberi inibet tiriacam: nisi ut dictum est
si esset necessitas maxima: ut puta pestis: mortuus ve-
nenosus ferarum: et his similia vel maiora instaret.





Uia dixit Sal. septi-
mo terrapentice.
Methodi. auctori-
tate Platonis op⁹
i aliqua scientia v⁹
arte traditur trib⁹
decausis. C^o primo
vt quis satisfaciatur
amicis. C^o Secun-
do vt exercitet q⁹
exercitio vtilissimo
quod est per intelle-
ctum. C^o Tertio vt
remediatur obliuio

ni: que est ex senectute. Vnc est q⁹ his trib⁹ de cau-
sis p^o motus p^oposui meis scholaribus in medicina
quoddam opus componere. Et q⁹ cognitio par-
tium subiecti in medicina: quod est corpus huma-
num: que loca dispositionum appellatur: est vna par-
tium scientie medicine: vt dicit Auerroys primo sui
Colliget. capitulo de diffinitione medicine. Vnc e-
q⁹ inter cetera nobis cognita cognitionem cor-
poris humani et partium eius que ex anothomia in-
surgit p^oposui tradere: non hic obseruans stilum
altum sed s^om manulem operationem vobis ma-
gis tradam noticiam.



Situato itaq⁹ corpore vel homine mor-
tuo per decollationem vel suspensionem
supino. Primo noticiam totius debemus
habere. Secundo partium: nam cum
omnis nostra noticia incipiat a notio-
ribus nobis. et que sunt confusa sunt notioz: et totum
confusius sit partibus a cognitione totum debemus
incipere. Circa totum autem quod debemus cogno-
scere est in quo homo differentiam habet ab alijs
animalibus. Habet autem differentiam in tribus. s.
in figura vel situ partium: et in moribus siue arti-
bus: et in partibus quibusdam. In figura namq⁹ ho-
mo est stature recte: et hanc habuit ppter quatuor
causas. nam corpus humanum habet inter cetera
animalia materiam leuissimam spumofam et aeream.
Et ideo ad superiora eleuabilem. Secundo inter
cetera eiusdem quantitate calorem habet amplio-
rem cuius est semper ad superiora eleuare. Tertio
formam habet perfectissimam que cum angelis et intelli-
gentijs que totum vniuersum regunt coicatur: ideo
sursum eius sensus vniuersi esse debet. Quarto ra-
tione finis sui fuit eiusdem stature et figure recte: q⁹
ipse finaliter ordinatur ad intelligere ad q⁹ deser-
uiunt sensus et maxime sensus visus: vt apparet in
p^oemio methaphisice et ideo in ipso debuit visus si-
tuari: et cerebrum: et p^o consequens caput situ tali vt
possit omnia diuersa sensibilia apprehendere. Et
q⁹ ad plura visibilia se extendit quando situatur in
alto: q⁹ apparet q⁹ custodientes ciuitates vt pos-
sent a longe bene videre statuunt sua spectacula in
loco alto: vt in turribus et huiusmodi: vt dicit Sal.
nono de iuuamētis mēbror⁹. Et p^o hoc ipse ibi di-
cit: et Aui. ii. ca. in principio q⁹ necessitas in situ
do caput superius in homine non fuit ppter cerebrum: nec ppter
aures: nec ppter os: nec ppter nares: sed ppter oculos
ppter eam dictam. Et sic ex parte apparet omnis

quatuor causar⁹ q⁹ homo fuit stature recte: ppter q⁹
vocatur antropos vel platenus. i. plāta reuerfa: et
microcosmus. i. minor mundus: q⁹ sursum et deorsum
h⁹ sicut mundus et vniuersum. Et est hec p^oma o^oia.
Secunda est ex moribus vel ex arte. Moyses. n. inter ce-
tera animalia magis h⁹ mansuetes: nam est animal poli-
ticum et civile. Arte o^oia natura caret. non enim h⁹ arte
insit a natura: vt aranea: apes: et huiusmodi: ad hoc vt
precipiat omnem artem. si enim haberet aliquam insitam a
natura: o^oia alia careret arte: vt dicit Sal. iij. de iuu-
amētis. Differt et ab alijs in partibus: nam non h⁹
partes multas: quas habent alia animalia intrinsecas: nam
non h⁹ partes que sunt a natura date vt arma ad defen-
dendum sicut sunt: cornua: rostra: ungues longi: et istis
caret: q⁹ h⁹ organum organorum quod est manus: que sibi
potest parare omne genus armorum ad defendendum: vt
et dicit Sal. j. de iuuamētis: et ideo caruit a natura il-
lis: vt o^oia possit habere. Caruit et partibus que pilose:
p^oenose: et squamose sunt ppter eandem causam: et q⁹ non
h⁹ materiam multam superflua terrestrem: que materia est illa-
rum partium. Caruit et cauda ppter eandem causam et q⁹ cum sit
stature erecte gete opas sedendo: cauda. n. sessionem
prohibet. hec sufficiant de anothomia totius.



De partibus namque licet sint duplices. s.
simplices et composite: de simplicibus
non ponam distinctam anothomiam: quia eorum anothomia non apparet
in corpore deciso: sed magis in liquefa-
cto in gurgitibus aquarum. Sed ponendo anotho-
miam membrorum organicorum de consimilibus
loquar s^om q⁹ simile aliquod in aliquo membro or-
ganico dicitur: vt de carne in anothomia cor: et de
ossibus in anothomia dorso et pedum et de nervis in
anothomia cerebri et nuche. De membris autem
officialibus sciendum q⁹ in pluribus ipsorum
quodammodo ad anothomiam factam in mortuis sex sunt
videnda: vt dicit commentator Alexandrinus com-
mento libri sectarum. s. que ipsorum sit positio: que sit
eorum substantia: et p^o consequens conclusio que sit eo-
rum quantitas: numerus: figura: et continuitas eorum.
Sed quantum ad anothomiam ipsorum factam in viuis
sunt consideranda duo que etiam in mortuis: vel mor-
tuorum anothomia possunt quodammodo apparere.
primum e que sunt iuuamēta ipsius et opationes. scilicet
est que sunt egrotudines que in ipso possunt contingere: si-
curam aliquam appropriatam habeant que sit illa ostē-
datur. Diuisio autem et numerus partium corporis e:
q⁹ partes quedam sunt que extrema vel extremitates
dicuntur. Quedam vero intrinsece et p^ofunde: et illarum
quedam sunt que ordinantur immediate ad conseruationem
speciei: quedam immediate ad conseruationem individui.
Prima sunt membra genitalia. Secunda sunt que in v^o-
tribus continentur. Tres autem sunt veteres in corpore no-
stro. s. superior que continet membra animalia vt caput. In-
ferior que continet membra naturalia. Medius que conti-
net membra spiritualia. Primo incipiam ab anothomia
ventris inferioris: q⁹ illa membra fetida sunt. Et ideo
vt ista primitus abiciatur ab eis incipiendum e. Se-
cundario q⁹ o^ois nostra cognitio et speculatio que ex
manuali consistit operatione a notioribus nobis in-
cipit: talia autem cum sint posteriora sunt nobis notio-
ra. C^o primum autem quod e videre ex veteris e substantia
et complexio eius: q⁹ positio eius e satis nota: q⁹ fuit
positus infra alios veteres ppter inspectionem eorum me-

broz: q̄ cōtinent: q̄ mēbrū quāto min⁹ p̄cipat
de nobilitate ⁊ p̄fectione: tanto magis locū ifimūz
obtinēt in genere membroz: sicut ē in mundo in
genere entiu. Item q̄ p̄tinet mēbra deputata ad
expurgandū ⁊ ad p̄tinendum feces ⁊ sup̄fluitates
graves que. s. p̄tendunt deorsum: ⁊ sp̄aliter q̄ sunt
accepte p̄ sursum. Est itaq̄ substātia eius carnosā: vt
ītestina ⁊ pelliculosa: ⁊ carnosā tñ magis: ⁊ ex hoc
apparet q̄ ē cōplexionis calide ⁊ humide. Et cā q̄
re fult huiusmodi venter carnosus ⁊ pelliculosus:
⁊ nō ossuosus ē: q̄ huiusmodi venter h̄z p̄tinere mē
bra que p̄pter assumptionē cibi vt stomachus: ⁊ p̄
pter repletionē ⁊ retentionē fecū: vel ex fecib⁹ i cō
cauiz: vel ex aquositate vel ex v̄tositate: vt ydro
pisis: vel p̄pter ip̄regnationē vt matrix d̄z aliquā
do tumescere. Si aut̄ venter esset ossuosus nō pos
set intumescere. ¶ Scd̄z q̄ op̄z videre ē numerus
p̄tūz q̄stas ⁊ figura. p̄tes. n. sunt duplices. s. intri
sece ⁊ extrinsece. Quedā sunt directa: quedā colla
terales extrinsece: directe sunt q̄ dñr cōrespondere
ori stomachi ⁊ ē ps in qua sentit os siue cartilago
epiglotalis: que alio noie noiatur pomū granatuz
de qua suo loco apparebit: postea ē ps stomacha
lis que ē sup̄ armbilicū vel distans ab vmbilico p̄
quattuor digitos. ¶ Tercio ē ps vmbilicalis: ⁊ est
vbi ē vmbilicus: cū quo ē alligatio fetus in matri
ce cū venis matricis. Et p̄pterea intrinsecis appa
ret vena q̄daz que p̄tinuat cū ipso ⁊ p̄transit p̄ zir
bum epatis in chiliz. s. venā. ista tamē priuata est
sanguine: q̄ frustra ē post partuz app̄ia operatio
ne: ⁊ p̄pterea p̄tinue euanescit: ⁊ iō minor apparet i
senibus q̄ in iuuenibus: sicut ē euanescit artaria
que cū dicta vena descendit ad vmbilicū fetus. Et
qñ est in vmbilico descendit inferius: ⁊ peruenit ad
artariuz adoz iuxta spondiles renū ⁊ ylio: vt in
fra dicet: qñ ex carnis mirach p̄pe vmbilicū hāc
cōsidera artariā que est ad modū nerui v̄l chorde.
¶ Quarto est ps que vocat sumē infra vmbilicū
per quattuor digitos ⁊ est ps in qua quedaz vene
termināt ad cutiz per quas pueri existentes in ma
trice emittunt aquositates. Et ideo vt dicit Auicē.
tales vene ⁊ talis pars notior ē in nō natis q̄ in p̄
fectis: p̄z quarta tertij caplo d̄ causis. Ego hoc mo
do multotiens monstraui: q̄ in p̄fectis frustra ē ab
operatione. ¶ Quinto est ps que vocat pecten in
quas existunt mēbra genitalia. ¶ Partes vero la
terales sunt duo: ypocūdria ⁊ ylia. Et est ypocū
driū dextruz ⁊ sinistrū: dextruz vbi locatū ē epar:
⁊ ypocūdriuz sinistruz vbi locatū est splen ⁊ ylium
dextrum ⁊ sinistrum similiter.



Is v̄s partes magis intrinsecas vi
scernas a p̄saz. n. quedaz sunt p̄tinentes
quedaz vero p̄tente. Continētes cōi no
mie vocant mirach. Mirach aut̄ cōpo
nit ex quinq̄ partibus. s. cuti: piguedine: pannicu
lo carnosio: musculis ⁊ chordeis eo p̄z siphac. Luz
razorio igitur incide p̄trahēdo a scuto oris stoma
chi directe vsq̄ ad ossa pectinis leuiter incidendo
cuti: postea iuxta vmbilicū fm latitudinēz incidas
p̄trahendo a dextris ad sinistras vsq̄ ad dozum.
Postea excoria ⁊ habebis p̄mo cutim: post autē
apparebit statim pinguedo maior: tamē in porco
q̄ in homine. postea locatus est panniculus car
nosus qui nō est neruosus vt alij: neq̄ ē carnosus:

vt musculus: s̄ est p̄mixtus ex carne ⁊ p̄niculo p̄
eum sunt chorde ⁊ musculi. ¶ Musculi sunt octo
vt dicit Salie. sexto de iuuamentis mēbroz: capi
tulo penultimo: naz duo sunt lōgitudinales: quo
ruz fila p̄tendunt fm longum a clipeo oris sto
machi vsq̄ ad ossa pectinis. ideo vocati sunt lon
gitudinales: ⁊ isti non h̄nt magnas chordas nisi
ligamentales: post istos sunt duo trāsuerfales su
periores: vnus a dextris alter a sinistris: ⁊ ambo
oriunt̄ a sup̄iorib⁹ iuxta costas: ⁊ desinunt in chor
das circa ossa pectinis: sic q̄ dextera chorde tēdit
inferius ad sinistrū: sinistrā ad dextrum: ⁊ p̄ op̄
posituz sunt p̄cedentes inferiores ad sup̄iora: quo
rū ortus est ab ossibus pectinis: ⁊ anche ⁊ desinūt
in chordas: cū ad locuz vbi finiunt̄ coste dirigunt̄
ita q̄ chorde eoꝝ cruciant̄ adinuicem ad modum
istius figure. ¶ Ultimo post istos sunt latitudi
nales: quoꝝ fila p̄tendunt fm latuz vnus dexter:
⁊ alter sinister: ⁊ ortus ⁊ apparentia eoꝝ est magis
iuxta dozum versus sursum: ⁊ isti cū longitudinali
bus veniunt interfecantes se ad inuicēz ad angu
los rectos. ⁊ hic est numerus: quantitas: positio:
substātia: figura: colligantia: ⁊ p̄tinuitas. ¶ Iuua
mentuz eoꝝ est duplex. s. cōe ⁊ p̄p̄iuz. Cōe est du
plex. s. principale ⁊ secundarium. Principale est:
vt cōstituentes substātiāz ipsius mirach mēbra in
trinseca tueant̄ a no cumentis extrinsecis: ⁊ calitas
eoꝝ reuerberet̄ ad intra. Secūdarū iuuamentū ē: vt
adiuuet̄ ad expulsionē eoꝝ que a pectore expellū
tur: ⁊ vt ad expulsionē fetus: ⁊ fecū cum mirach ē
adiuuet̄: vt dicit Sal. i eo dē sexto. Iuuamentū spe
ciale est: q̄ musculi longitudinales sunt facti ad at
trahendū p̄ncipalr. Scd̄o ad expellendū. Et quia
hec opatio in ītestinis maxime regritur. iō isti mu
sculi fuerūt magni. expulsionē aut̄ operant̄ p̄ con
tractionē villoꝝ suoz: q̄bus cōtractis exprimunt
membra que continent ⁊ p̄ cōsequēs expellunt q̄ i
eis continēt. Itē hoc faciūt gr̄a dyasfragmatis cuꝝ
quo cōtinuantur q̄ descēdēs a p̄te posteriori de
orsum cā sit: quare ītestina ⁊ mēbra que continen
tur sunt quasi iter duas manus. ⁊ iō qñ isti muscu
li p̄trahūt̄ cōp̄rinē dyasfragma: sic q̄ illa mēbra
exprimunt quod in eis est. sicut aliqua res contē
ta inter duas manus expellitur per compressionē
manū adinuicem. quod latius infra declarabit̄ i
anothomia dyasfragmatis. Musculi h̄o latitudi
nales sunt facti ad expellendum ⁊ p̄pter hoc ma
xime īmediatius approximat̄ ītestinis: ⁊ expul
sionem faciūt p̄ compressionem partis a qua d̄z fie
ri expulsio. Et expulsio d̄z fieri a sup̄ioribus ad īfe
riora. ¶ Hinc est q̄ isti musculi magis fuerunt po
siti superius q̄ inferius. Transuerfales vero facti
sunt ad retinendum. Retentio aut̄ fit p̄ villos trās
uerfales: vt apparet tertio de v̄tutibus naturalib⁹
qua retentione oportebat facere ne sup̄fluitates
reascenderent superius ad locum superiorem: vn
de venit. ⁊ ne cito descenderent. sed continerentur
vt totum iuuamentum exurgeretur. ideo non fue
runt tñ duo transuerfales superiores sed ⁊ īfe
riores. Sed q̄ magis regritur retentio ne regrediā
tur superius q̄ q̄ descendat inferius. ⁊ ideo maio
res fuerunt transuerfales superiores q̄ inferiores.
Et etiam ad hoc facit dyasfragma: vt postea
dicetur. ¶ Elevatis autem ⁊ abicisis musculis

istis apparet siphac melius est: tamen vt in vna pte referuentur isti musculi propter illud quod postea oportet videre. ¶ Istud siphac est panniculus subtilissimus: et valde durus: et iste fuit factus vt phibereur ne musculi cōprimerent membra naturalia cum ea ptererent: et ppter hoc fuit nervosus et durus: vt possit dilatari et pstrigi quādo illa dilatantur et fuit subtilis ne ea aggrauaret et fuit durus ne facile rumpere: nam ex eius fractura accidit passio que dicitur ruptura seu crepata. Intumescit. n. hoc mirach cum rumpit hoc siphac. Sunt et eius alia duo iuuamenta que Aulcen. ponit libro de animalibus capitulo de anothomia stomachi. s. vt p contractionē eius verus dorsus cum quo alligat expellat illud quod in stomacho et intestinis et in matrice pteret: et hoc facit simul cum dyaphragmate cum quo continuatur: vt postea patebit. Aliud iuuamentum ē vt alligetur intestina dorso: et vt ab ipso vniuersaliē oriuntur panniculi oīum membrorum aliorum in eo contentorum. Alia vtilitas s. Salie. quinto de iuuamentis membrorum est qd phibet intestina a ruptura quādo inflantur a ventositate. Et ex his apparz que sit substantia ipsius mirach et complexio eius: apparet qd sit eius positio quantitas partium: et numerus apparet que sint iuuamenta ipsius. Restat autē videre de passionibus eius: pōt autem venter pati omne genus egritudinis. s. malam complexionē malam compositionē et solutionē pteruitatis. De cura male complexionis nihil dicam: quia non habet proprium in sua curatiōe quod ex anothomia dependeat. mala autē compositio que ē tumor pter naturam in ipso ē duplex: quedam ē apostema: et quedam non. Prima non habet aliquod proprium nisi qd in eruptione eius si rumpat ad itra et extra hec est peior qd si rumpat ad vnum latus tantum: et causa patet: quia natura non habet supra quod se fundet in consiliando vulnus. Mala autem complexio que non ē apostema ē inflatio ipsius ventris: que accidit in ydropisi asclite vel timpanite. Nam in asclite aquositas continetur in concavitate ventris inter intestina et siphac: sicut in timpanite ventositas continetur: et facit intumescere mirach. ¶ In curatione eius debes sic pcedere cum his que ponunt auctores. Modus autē qui maxie depēdet ex anothomia ē extractio aquositatis per incisionē. Modus autem est vt partem siphac quā modo incidisti reducas sup intestina: ita qd stet sicut in viuo: et postea ydropico situato supino debes cutem trahere superius: et postea rasoium habere et perforare vsqz ad siphac: ita qd incidatur etiā siphac: et tūc statim debes habere canulam et ponere in foramine et extrahere de aquositate quātum sustinet patiens semper tamē sis memor qd melius ē infra sustinere qd exquisitissime euacuare: et specialiter in ydropisi ppter debilitatem virtutis: postea dimitte cutem qd redibit ad locum suū et recooperiet vulnus et ex aqua amplius nō exibit. Ipsam vero quādo vis extrahere plus retrahere cutem sicut primo. Istud tamen volumus non facies nisi a lateribus: non in medio: qd vulnus factum in medio non ita cito cōsolidatur ppter siphac esse grossius et solidius ibi qd in lateribus. Secūdo ppter chorodas vulnus ē paratius ducere spasmū. Tercio qd aqua melius egreditur qd grauis ē tendere deorsus. Si vero vter pa-

stas solutionē pteruitatis: tūc illa solutio est pene trans in pfundū: aut non. Si autē nō tūc ē cura difficilis: si sic tūc p vulnū aut egredietur aliquid de contentis aut nō. Si sic: aut illud quod egredietur ē zirbus aut aliqd interioz. Si zirbus tūc dicitur sui cum syrigo vel ligare iuxta cutem quātum possibile ē: et postea abscindere: qd totū de ipso quātum ptingit aer corripitur: si intromittatur corripit et putrefacit alias partes: et idē dicitur abscindere: post illud dicitur intromitti: et si lūm dimitti extra: et dimittere labiū aptum: qd natura cōsolidabit zirbum et expellet illud quod ē cum filo alligatū: et hoc facto debes cōsolidare vulnus. Si vero illud quod egressus ē: est intestinū tūc aut intestinū est vulneratū: aut nō. si nō est vulneratū et neqz substantia alia ē ei inuoluta qd citius pōt dicitur intromitti. Si vero aliqua substantia vt puluis ē annexa vel ē sanguis dicitur lauare cum aqua calida et intromitti. Si vero ppter morā ventositas sit inclasa in eo: et ex hoc intumescat et non possit intromitti: tūc cataplasma resolutiuū vel spongia madefacta in decoctione resolutiua desup poni dicitur: et detumescet: et sic intromittatur. Si autē nō possit detumescere neqz intromitti: tūc dilate vulnus mirach donec intestinū intromittatur. Cum autē intestinū fuerit incisus: tūc si ipse fuerit ex grossis intestinis debet labia eius sui cum syrigo sicut labia aliorum membrorum. Si vero sit ex intestinis gracilibus: tūc non sustinet suturaz nisi sit pfunda valde: et talis impedit operationem eius. Et ppter hoc melius ē vt dimittat et teneant p iuncta labia vulneris cum capitibus formicarum magnarum: debent. n. labia intestini cōiungi: et debes habere formicas magnas et facere qd mordeant labia p iuncta vulneris et abscindere caput statim: sic facere donec labia sunt iuncta: et tūc intromitte intestinum vt prius: hoc facto ad curandū ventris solutionē redi. Et istud vulnus curari dicitur cum reditiōe labiorum in vnum: et reducta pterent in vnum futura facta cum syrigo hoc modo. Nam in prima futura recipit totum mirach ex vna parte: ex opposita vero parte dicitur dimitti siphac: et reliqua de mirach in parte in qua dimissus fuit siphac dicitur assui: et ex alia parte siphac dicitur dimitti: et sic pñr ad hoc vt labiū siphac iungatur et reducta labio membrū carniformis: vt fiat certior et firmior cōsolidatio vulneris: et eodē modo vulnus hoc si per seipm nil sit egressus: et hoc de anothomia mirach quod ē membrū pterens sufficiat et c.



Estat videre de anothomia contento-
rum: hec membra sunt numero. x. Primum quod occurrit est zirbus. Secundum intestina. Tertium stomachus. Quartum splen. Quintum epar. Sextum mifenterium. Septimum renes. Octauum vesica. Nonum testiculi: et vasa spermatica et matrix in muliere. Decimum est virga cum collo vesice. De zirbo autē primo quod oportet videre ē locus eius: locus. n. eius in hōie ē qd cooperit stomachū ab anteriori parte: et oīa intestina: et in alijs non coopiat oīa intestina: hoc fuit qd hō iter cetera a alia eiusdem quantitatis ē debiliore digestiue virtutis: et ē qd intestina nociuis exterioribus sunt magis disposita pp cutē eius subtiliore ē et minus pilosaz. Ex hoc et pōt patere s. qd sit eius iuuamentū. Iuuamentū. n. eius est picipaliter confortare virtutem digestiuam stomachi: et interiorum reuerberando calorem naturalem ad

stomachum. Et propterea dixit Gal. qnto de inge-
 nto sanitatis qd gdam miles in bello fuit vulnera-
 tus cui epiplex. i. zirus fuit abscissus tñ ex vulne-
 re sanatus ē: ex quo tamē postea non potuit dige-
 rere. Et ex his consequenter p̄tertium inquirendū
 de ipso. s. de substantia eius. substantia eius nō fuit
 simplex sed composita et fabricata ex substantijs
 que habent calefacere: et p̄pterea fuit compositus
 ex triplici substantia sicut dicit Gal. x. de iuuamen-
 tis membrorū. s. ex p̄nīculis subtilibus duobus: ex
 adipē seposā. Et arterijs et venis. Et ex panniculis.
 Primo vt ibi p̄nīculi continerent alia: et etiā quia
 iste zirus debebat esse extensibilis leuis et dēsus
 vt caliditatem reuerberat: et ad hoc aut magis pōt
 substantia pannicularis et aliqua alia. Scđo in ipso
 fuit adēps qz calefacit cum sit valde p̄pinqua ca-
 liditati vel in potentia ad calidum. Tercio arterie
 et vene quemultum calefaciunt. Et hoc patent reli-
 qua duo. s. quis sit numerus partiu eius: et que sit
 colligantia eius: nam hz colligantia ad mēbra ad
 que terminatur vt ad stomachū vel ad splenē: et ad
 intestina: et spāliter colon p̄pter cām que dicitur:
 hz etiam colligantia ad membra a q̄b⁹ oritur. Ori-
 tur nāqz a p̄nīculo carnosō inter op̄afragma: et cā
 quare inde oritur ē: qz ad p̄nīculum illum termi-
 nantur due extremitates panniculi siphac: que de-
 bent inuēssire zirbū: et sic qz ibi ē vena magna et ē
 arteria a qbus iuxta stomachum oriunt venepa-
 ue: et arterie contextentes zirbus. Tercio ibi ē misin-
 terium seposum: a quo oritur adēps seposā replēs
 vacuitates illius contexture. que autē ipsius egri-
 tudo ē declaranda per anothomiam patet ex his
 que dicta sunt supra.



Leuato autē zirbo quātum ad partem:
 que cooperit intestina et nō plus: ne mo-
 ueas alia mēbra a suo loco statim tibi
 apparent intestina. Circa que primo
 notabis positionē et numerū ferunt. n.
 plura inuoluta et reuoluta: et non fuerunt vnum in-
 testinum rectū propter duo. Primo qd dato in
 quibusdam brutis tantum sit vnum intestinum
 rectum vel recte procedens. In homine autem et
 in alijs aialibus perfectis fuerunt reuoluta: vt diu-
 cibz cōtineretur in stomacho et in intestinis: qz si
 nō cōtineretur oporteret qd animal esset in conti-
 nua assumptione cibi et in cōtinua assellatione. Et
 cōtinuatio illa impediret occupationem in alijs p-
 fectionibus op̄atiōibus. Scđa causa fuit qz si in-
 testinum fuisset totum vnum rectum nō quelibet
 pars cibi fuisset contacta a superficie intestini: et iō
 non exiccasset totū intestinum totam humiditatez
 contentam in cibo. vt igitur nihil remaneat de ci-
 bo intactuz ab intestinis: et vt tota humiditas exic-
 caretur ordinauit natura ipsa esse inuoluta. ex hoc
 statim apparet qd sunt plura numero. quia sex tria
 subtilia: et tria grossa. Incipiamus ergo ab vltimo
 qd vocat rectum vel longum: cuius extremitas ē
 orificium quod vocatur anus. Sed vt anothomia
 alioz nō destruat ligare opz intestinum istud cir-
 ca mediū eius in duabus partib⁹ et in medio liga-
 ture incidere: et inferiorem ptem dimittere et cuz su-
 piori ascendere scarnādo. Et nota circa istud inte-
 stinū multitudinē venaz miserā capz qz veniunt ad
 sugēdum si aliquid ē de humiditate in cibo vel de

supfluitate remansit. et istud intestinū iuxta ylia sint
 vbi incipit intestinū colon. Et dī colon: qz plura co-
 la hz vel cauernositates vel cellulas vel cameras
 in quibus sterus figuram accipit: et in ipso retinet
 p̄p has cellulas. Circa qd intestinū debes confide-
 rare locū: qz multū circa sinistrum renē inuoluitur
 hec ē cā quare eius dolor ex pte loci nō distinguit
 a dolore renali. Postea vero ascendens et coope-
 riens splenē incipit circa exteriora declinare et sus-
 ptem dextrā et cooperit stomachū: et p̄p coopturam
 quā facit supra stomachū accidit: qd qñ supfluita-
 tes descendūt ex hoc intestino qd stomachus ei cō-
 patitur et dolor et rugitus tunc ipis apparet circa
 stomachū: et tūc statim hō appetit assellare: et assel-
 lat. Qd nō cōtingeret si in stomacho essent hūidita-
 tes qz facerēt hūc rugitū et dolorē et ex hoc p̄p ac-
 cidit his qz purgantur qd sincopis eis accidit qñ
 appetunt assellare. Vel humores in intestino hoc
 continentur qd debēt euacuari: qz tūc illi humores
 in intestino illo existentes alterāt stomachū: et os
 ei⁹: et ex alteratiōe ozis stomachi sequitur sincopis.
 Sed dubitat aliqz rōnabiliter de loco hui⁹ inte-
 stini cum sit de grossis deberet esse inferi⁹: et non su-
 pra alia cuius oppositū apparet. Dicendū qd istud
 intestinū fuit locatū supius iuxta stomachū p̄p tria.
 Primo qd istud ignobilius ē cibis gracilib⁹. et iō
 sub mirachiter oia gracilia debuit esse positi⁹ exte-
 rius. Scđm qd istud intestinum cōtines feces: et ali-
 quādo induratur: et de se priuata sunt oia humidi-
 tate et caliditate nālī: vt a mēbris vicinis adiuuare-
 tur: ordinauit nā vt imēdiate locaret supra stoma-
 chū: vt coopieret a girbora quo et stomachus coo-
 perit: qz et zirus ipm humectat et calefacit: et pro-
 p̄pterea apparet qd nō ē aliud intentū cū quo alliga-
 tus sit zirus sicut cū colon. Tercia cā hui⁹ locatio-
 nis ē: qd istud intestinū p̄prie ē factū ad cōtinēdū
 et expellēdū feces: sed magis ad expellēdū. et ideo
 inter alia intestina ad ipm p̄prie debuit puenire co-
 lera qz hz expulsiva stimulare modo p hoc qd sic lo-
 catum ē colera ad ipsius substantiaz puenit p̄pter illā
 qd ad cōcauitatē intestinoz puenit. Nā supra ipsum
 in parte dextra existit pēnula epatis in qz existit chi-
 stis fellis cū quo alligat: et hoc apparet ad sensuz.
 Et p̄pterea tale intestinū in tali loco apparet citri-
 num: et amax in gustu et nigrū. Et nota circa hoc
 mirabilem op̄ationem nature. Ad illud qd obijci-
 tur soluitur qd intestina nō iudicāt supiora rōne lo-
 ci: sed rōne colligantie quā hz cuz stomacho vel fun-
 do stomachi: modo intestina gracilia rōne colligā-
 tie ad funduz stomachi sunt supiora alijs: et ex loco
 istius supioris intestini apparet cā quare in dolore
 colico augez dolor tēpore assumptionis cibi: qz tūc
 istud intestinū cōprimi⁹ a cibo: s̄z tpe famis nō. S̄z
 intenditur dolor renalis et hoc est vnum ex signis
 distinctiuis inter vnum dolorem et alium: et ex loco
 et colligantia dicti intestini apparent nobis duo.
 vnum vtile in cognitione: aliud in operatione et co-
 gnitiōe: qz quādo sit colica passio incipit in pte sinis-
 tra: et in illa magis molestat: tūc qz intestinū illud
 frigidius est illic cū nō tāgit a chisti fellis. Secūdo
 qz in maiori q̄titate est locatū circa renē sinistrū: et
 est strictius: tamen illa colica que sit in pte sinistra
 non tam diu molestat: tum quia sit a causis facili-
 ozibus: tum quia est causa eius in loco viciniori

ad expulsionem. Et nota hoc qz per experientiam vidi multotiens. Quantum ad opus vero cōfert. Primo quia in colica ea que administrantur ad extra debent magis applicari et approximari circa hypocondrium dextrum qz sinistrū licet vtrobiqz conferat. Secundo quia quando fit clistere melius est vt corpus declinet versus dextrum: vt intestinum colon non comprimatur ab alijs: postea iniecto clisteri quando voluntas est vt egrediatur clisteri vertat se statim super latus sinistrū: postea paulatim super dextrum sicut in expulsionem que debet fieri per positionem administratam per superiorē partem: contra quando incipit mouere hoc est de loco et colligantia eius. Substantia vero eius consideres grossam et solidam propter ventositatem generatam in eo: multo tempore continet que in eo fortissimum interdum generat dolorem que cum fiat in substantia grossa et solida appareat ac si intestinum terebello perforetur. Et etiam in hoc similatur dolor huius dolori renali. Quarto considerare debes figuram eius et formam que apparet ex dictis. Cellulosum enim est intestinum et in cellulis istis quia via et transitus multis obliquatur superfluitatibus: et sit causa moris superfluitatum que in eo figuram recipiunt ad modum illarū cellularum: et ideo sterco figuram habet quā scis figura maxime apparet in stercore defecato: et resento. et in febribus et in alijs egritudinibus in quibus eiiciuntur squibales: et humiores flegmatici retinentur: et sunt materia concurbitini. nam in concauitate cellularum: et humor flegmaticus melancolicus: qui est sufficiens materia generationis verminum si inter vnam cellulam et aliam continetur paucus humor qui non sit sufficiens ad generationes panniculum continuantem vnum vermē generat in vna cellula cum alio in alia cellula generato. Operatio iuuamentum et egritudo ipsius ex predictis p3. Hoc autem intestinum est continuatum parte superioris cum monoculo siue ceco quod dicitur monoculus non qz nisi vnum habeat orificiū: p quod attrahitur ad ipsum et per ipsum expellit: qz hoc est impossibile: sed habet duo orificia: vnu p quod attrahitur: alter p quod expellit. Istud autem p quod expellit nō est sicut in alijs opposite locatur contra primum: sed ambo locata sunt iuxta se inuicē et infra hec orificia pendet lacuna huius intestini ad modum sacci: et id alio nomine vocatur saccus: et sic apparet eius figura: et colligantia: et locus etiam qz locatus ē in latere dextro supra et iuxta terminū anche siue scie: et infra renem dextrum. Substantia eius est eadē cū substantia colon: egritudine ē patifilis. Iuuamentū ē vt psucci que venit ad ipm in eo retineatur: et reuoluatur et vt reuerberet vel descensum prohibeat suū ipsius succi ab intestinis superius: et ista intestina superiora sunt gracilia et sunt tria. Nam huic intestino continuatur intestinum yleon quod circa ylia locationē h3 et situm et reuolutionem: et in isto fit ylica passio in qua est dolor vehemens circa ylia: et sic apparet locus colligantia: passio: et dolor. Substantia ei⁹ ē subtilior: et id gracile vocatur sicut pp primam cām vocatur yleon. Eius iuuamentū ē: qz factū est vt contineat succū. vt quod vtile ē possit exurgari multum inuolutū est: et ad ip3 pueniūt plures vene miserales qz ad aliqd aliud intestinum: ab eis et a misente

rio debes ipm excarnare. et qñ ad ptem eius superiorē iuxta stomachū puenisti: tunc inuenies qz circa ptem sinistrā ad spondiles declinet et valde est icarnatum cū misenterio: et id cū cautela incide ne frangas aliqd: et post incisionē inueniens ieiunū intestinum quod taliter vocatur: qz vt plurimū inuenitur vacuū in bene dispositis. Et cā sue vacuitatis ē duplex. scilicet rectitudo eius. nā est rectū sicut intestinum vltimū. Scda cā ē multitudo colere pure q peruenit ad intestinum hic: vt chisti fellis p canalem qui continuatur cū intestino duodeno cum quo istud immediate cōtinuatur. Et dī istud primum intestinum et vocatur duodenū: qz eius lōgitudo vt in pluribus est duodecim digitos ad quod intestinum canalē quod ē a chisti fellis puenit: et ideo caue qñ excarnas ne istud canale incidas: sed incide intestinum duodenū beniferius et liga: et tunc incipiēdo sicut incipiunt auctores hēs sex intestina. Primum ē duodenum. Scdo ieiunū. Tertius yleon: et ista sunt gracilia: et superiora. Quartū monoculū seu cecum. Quintū colon. Sextum rectū. Dec. n. oia intestina videbis esse inuoluta continuata alligata dorso sicut alligata sunt oia viscera p quoddā mēbrū quod vocatur eucharus vel misenterius a miseraicis que i ipso sunt disperse. Et vulgares, Bononienses vocāt ip3 interiglio. i. interiora tenens.

De misenterio vel alio noīe eucharō.



Stud mēbrum fm auctores substantia h3 compositam ex venis cordis panniculis ligamentis: vt predicta membra possit ligare ex substantia seposa et pingui: vt dura mēbra quales sunt spondiles cum mollibus: qualia sunt intestina et alia viscera sine medio nō cōiungantur: vt molle a duro nō patiatur: reliquas autē vacuitates q sunt i hoc replent substantie glandose: q multe sunt in hoc mēbro: et hoc est vnu iuuamentū carniū glādosarū: q in b. Aliud iuuamentū ē vt sustentat venas miseraicas q in hoc sunt disperse sicut nō est lōgiquū q iste carnes sint facte ad generādū humiditatē qua intestina et sex interdū humecterēt: vt lubricet cito ab intestinis: et id videmus q sterco liquidū emittit dato q cibaria sumantur dura. maxima tñ ps glandose carnis ē in pte superiori grossa in qua frequēter congregat pp ppinquitatem ad splenē melacolia ex q catur melacolia mirachia. Hoc facto eleua misenterius vel dimitte donec feceris anothomia venarū que pueniūt ad stomachū et ad splenē: ad quā vidēdam et aliorū mēbroz infla stomachū cū canula p portanarium et liga fortiter: et absinde intestina. Et fac ante incisionē infra locum ad quem puenit canalē a chisti fellis ad intestina.

De stomacho.



Iso de intestinis pcedas et videas tertium mēbrū: puta stomachū: de quo debes videre illa sex: que de alijs. Primo locus pnotabis eius: et circa locū nota primo vbi eius. Secundo situm vbi eius est: qz cum sit cella cibi stomachus: vt dicit Gal. qnto de iuuamenti stomachi: et capto scdo. et ibi habet totum quod dicit de stomacho. Et dictū ē de intestinis: et hī ab Aliebate tertio sue theoricę dispositionis regalis. capto. xx. Est q locus ei⁹ i medio superioris et inferioris: dextri et sinistri: anterioris et posterioris. sed

tu hic dubitabis quare stomachus non fuit positus iuxta os. Dico q̄ causa fuit duplex. Una est q̄ iuxta os deberet eē mēbra anhelitus pp̄ attractiōē aeris. Secūda q̄ mēbra fecū receptia debent eē p̄tinuata cū stomacho: talia autē ifra dyafragmate debēt esse p̄tenta: et iō vides q̄ stomachus superius h̄z cor mediāte dyafragmate: inferius miscetur iū intestina a dextris h̄z epar quo app̄rehēditur quinq̄ suis pennulis: sicut manus que app̄rehendit et caput quinq̄ digitis: et a sinistris h̄z splene: quo calefit: rōne arteriarū eius: a pte anteriori h̄t zirbuz: a posteriori musculos dorsū: et venā magnā: et arterias que trāsīt sup̄a dorsū: vt postea videbis: et ideo locus eius ē in medio: q̄ est sicut cella cibi cōis oibus. Situs autē eius ē: q̄ l̄z sit iū catū sup̄a dorsū: ps tū eius sup̄ior declinat versus sinistru inferior vero ad dextru. Et cā istius si tuationis fuit, pp̄ter cās que dicent: nam epar debuit esse in latere dextro eleuātū: et cū sit magnum totā p̄cauitate dextre p̄is sup̄iorē occupauit: splē autē non: et iō in dextro non potuit pars sup̄ior collocari: s̄z in sinistro. Pars ergo inferior debuit ad partes dextrā declinare: q̄ in parte sinistra inferiori iuxta renes est iūtestinū colon grossū multū in uolūtū iūstis inuolutionibus: et sibi occupat magnū locū. Sed in parte inferiori dextra sunt intestina gracilia et subtilia que paruū et modicū occupāt locū: et iō stomachus q̄stuz ad partes inferiorē d̄z declinare ad partes dextrā: vt repleat cōcauitatem ibi exēuntes: et cedat locū colon: et ex hoc apparet primū: q̄s. s. locus sit eius. s. stomachi. S̄z tu dices quare stomachus nō fuit locat⁹ directe sup̄a sp̄o diles dorsū. Dico q̄ cā huius pōt esse triplex. Una que dicta ē: vt cederet epati in pte dextra: et repleret vacuitatem in parte sinistra. Alia cā fuit: q̄ si stomachus esset directe locat⁹ sup̄a dorsū tūc orificia duo. s. inferius et superius essent directa. Et ideo i homine cū sit stature recte stomachus nō bene cōtineret cibū: s̄z descēderet ab eo statim: vt ergo hoc nō p̄tingat sic fuit situatus. Tertia cā huius fuit q̄ quātuz ad os eius superius et partes superiores d̄z recipere melancolias a splene que est in pte sinistra: et quātuz ad partes inferiorē d̄z recipere coleras ab epate quod ē in parte dextra. Et ex hoc apparet. s. quis sit locus ei⁹. s. stomachi fm colligantiā: colligantiā p̄sequenter apparebit meli⁹: q̄ colligantiā h̄z cū splene: cū epate et cū corde: et cū cerebro: et illud p̄sequenter declarabit: q̄ apparebit q̄ cū splene h̄z colligantiā pp̄ter venas que apporant melancoliā ad os stomachi: et pp̄ter venas q̄ veniunt ad latus sinistru stomachi ad nutriendū sicut cū epate h̄z colligantiā rōne venarū reliquarū cū cerebro pp̄ter neruū qui venit ad os stomachi et expandit maxime circa partes superiores stomachi. Cū corde vero h̄z colligantiā rōne arterie magne que sub ipso est. Ex his pōt apparere tertium. s. cuius figure sit: q̄ est figure rotūde: q̄ talis figura magis est a nocuentis remota. Item q̄ oīum aliarū ē capacissima: stomachus autē multa d̄z continet: s̄z non ē perfecte figure rotūde: s̄z arcualis magis: pp̄ter cām dictā: q̄ pars superior eius ē declinans ad sinistru: inferior vero ad dextrum ad modū cucurbitę retortę: vel saracenice: verum omnia que dicent de stomacho melius apparebūt

per anothomiā mēbroꝝ sequentiū. Patet etiam quartū. s. que sit quātitas stomachi: q̄ magn⁹ valde est cū interdū ipm oportet recipere et cōtinere magnā quātitatez cibi: verū quod non ē semper in magnitudine sua vltima: s̄z equatur magnitudi ni p̄tenti: q̄ extēibilis et corugabilis. Quinto autē videas partes et numez partiū eius: partes autē eius sunt duplices. s. vniuersales et integrales. Que daz vero q̄statiue et determinate: prime sunt due tunice eius. Prima intrinseca ē neruosa. Secunda et extrinseca est carnosa: verū est q̄ prima ē sp̄is sior secunda: q̄ illa primo d̄z p̄tangere cibū: et ideo vt nō ledetur ab eo debuit esse spissa. Item pp̄ aliū q̄ stomachus pp̄ter illam tunicā est extēibilis: q̄ requiritur interdū pp̄ter multam quantitatem cibi. sed exterior: licet requiratur pp̄ter digestionē fuit subtilior: q̄ digestio stomachi iuuatur a membris vicinis circūstantibus: sed extensio et continētia cibi non. Et iste tunice non solum diuersificatur in substantia: quantitate: et loco. sed situatione villorum: q̄ in prima cū in ipsa sit appetitus: et appetitus imēdiate ordinetur ad attrahendum villi fuerunt situati ad attrahendum: tales autem sunt longitudinales. et ideo in ea sunt villi longitudinales: et quia attraxioni statim coniungitur retentio: q̄ omne quod attrahitur: attrahit vt retineatur: q̄ attrahit vt i ea membrū voluptuetur. Hinc ē q̄ in hac etiam tunica fuerūt positi villi transversales qui deseruiūt retentioni: vey est q̄ illi sunt locati in pte non interiori illius tunice sed exteriori. In secūda vero cū ipsa ordinetur ad digestionē et digestionem seruat: q̄ ei consequit: et ex consequēti expulsiōi substantie fuerunt positi villi latitudinales. et ex hoc apparet q̄re intrinseca tunica fuit neruosa et carnosa: non fuit intrinseca pp̄ter villos longitudinales q̄ debent esse in tunica intrinseca q̄ est: vel d̄zesse principiū appetitus. Item alia causa ē q̄ intrinseca ordinata ē ad sentiendū: extrinseca ad digerendū et ad alterandū. Nūc autem sensatio melior sit quādo sensibilibus imēdiate occurrat sensus vel membrū sentiens: alteratio vero pōt fieri p̄ medium et digestionē: hoc ē quod exp̄sse ponit Auicē. caplo de mēbris. p̄mo cañ. fen. prima. Et natura q̄dem intrinsecam tunicā. s. stomachi fecit neruosa. extrinsecā vero carnosa: potest nāq̄ digerentis opatio ad id quod digestū est in potētia sine occurſu puenire: sentiens vero id q̄ sentitur nō pōt sentire nisi obuiando ei sensus. s. tact⁹. Alie vero sunt partes eius q̄statiue et determinate: vt pars sup̄ior et orificiū eius inferius q̄ dicit portanariū. ps eius superior fm naturam angustior: parte inferiori: q̄ in inferiori debet fieri digestio et cibus d̄z cōtineri. in superiori non. Orificia tamē harū partiū conueniūt et differunt. Conueniunt q̄ ambo posita sunt a laterib⁹: et non sunt posita vel facta in vltima eminētia partis inferioris et superioris: sed ps inferior descendit magis q̄ portanariū vel pillereon: vt cibus nō descēdat: sed cōtineat in ea vt in bursa quadā sicut sup̄ior sup̄emiet ori stomachi: vt qñ stomacho repleto homo inclinaret: nō reascēdat cibus ad meri et os: et sp̄aliter qñ multum replet stomachus. Ex hoc pōt videre: quare ex sup̄flua quantitate cibi dyafragma cōprimi et cib⁹ non egredi. Itē conueniūt q̄ ambo orificia

sunt in stomacho in loco in quo continuatur vel alligatur dorso. nam os stomachi est recte in principio sue alligationis dorso alligatum: et propterea alligatum est os stomachi ad spodium: ubi finit et terminatur dyasfragma: et ista e tertiadecima eo quod in duodecima e costa ultima medosa ad quam determinatur dyasfragma. Et ex hoc apparet tibi: quod quoniam vis exterius alterare confortare vel aliter operari circa os stomachi quod optimum est in dorso circa. xij. et. xliij. spodium hoc facere: et spualiter quoniam predicta impugnetur ab epate: et splene. dummodo arteria adorti non impediatur que in dorso e. Sequentibus autem spodiilibus quod vocant spodiles renu alligat stomachum versus ad portanarium: tunc vero alia pars inferior a spodiilibus obliquatur versus sinistram: et ideo conueniunt illa duo orificia. Differunt etiam quod superius orificium quod vocatur os stomachi est magis latum quam inferius portanarium. Et hoc fuit: quia per os stomachi aliquod cibum grosse substantie et dure deorsum descendere et indigestus. Et ideo os stomachi debuit esse latum. Sed per orificium inferius tamen res subtiliata et digesta deorsum egredi: et ideo non fuit ita latum et hoc de partibus eius. ¶ Ex quibus apparet sextum: quod de ingri de stomacho. scilicet quod sit eius substantia: quod apparet quod cum nervosa tunica sit maior in eo quam substantie nervose sit a dorso. Ex hoc apparet quod sit complexio eius: quod frigida et sicca. Apparet quod operatio vel iuuamentum: quod duplex: unum ad appetendum cibum pro toto per tunicam intrinsecam: alterum ad preparandum cibum ad nutrimentum totius et hoc per tunicam extrinsecam carnosam et membra coadiuvantia. Et ex his potes videre quod potest pati egritudines omnium generum quibus possunt copari alia membra omnia principalia: ut epas. cor. cerebrum: et ex preloquenti totum corpus: Luratio tamen eorum propriis ex anothomia non dependet multum quam aliorum. Et hec de stomacho. ¶ De splene.

Splenis anothomia perfecte videre non potest nisi abscindas costas aliquas mendas ex latere sinistro: quas si perfecte eleues: sed ut sufficit operi tuo quibus abscessus locus splenis tibi apparet: quod pariet sinistro stomachi adheret quantum ad concavitatem eius. quantum vero ad conexum alligatur dorso et siphac paniculis subtilissimis ortis a siphac. Apparet secundum quod locus eius non est ita in alto sicut locus epatis: figura eius est quadrangularis: quod in homine est quasi ad modum quadranguli per figuram stomachi: cuius concavitatem circumstantem in parte sinistra habet splenem replere. Tertio vide quantitatem eius: quod in homine satis proportionalibus est in quantitate respectu aliorum membrorum. Colligantia vero eius est: quod colligantia habet ad cor epas miscenterium: sicut et stomachum. Colligantia vero habet ad omnia ista membra propter cor: per venam que venit a porta epatis ad splenem que colligantia apparet. nam si excarnando procedas videbis quod a vena concaua epatis puenit vena magna ad splenem a qua descendit unus ramus in medio transitus eius inferius ad miscenterium: ad ipsum nutrimentum: et portat sanguinem aquosorem et humidorem: postea quando ista vena appropinquat splenem: unus ramus ramificatur ab ea: quod vadit ad nutrimentum partem sinistram inferioris stomachi. postea vero puenit ad splenem et concavitatem eius. Et ramificatur in concavitatem ipsius in duos ramos. scilicet inferiorum et superiorum: descendit inferius inferius ad nutrimentum

sicut: quantum ad partem sinistram: sed superior transiens per concavitatem splenis ramificatur in duos: quorum unus puenit ad partem superiorem sinistram stomachi ad nutrimentum superiorum. alter vero circa orificium puenit stomachi: ad portandum melancoliam: que mulgendo perficitur ad os stomachi: ut sciter appetitum. Quod vero remanet magis in splene ipsum nutrit. Et ex hoc apparet tibi cum quibus membris alligantiam habet splenem mediante vena. colligantia autem habet cum corde per arterias que ad ipsum veniunt ab arteria adorti que in dorso est infra dyasfragma: a quibus arteriis stomachus multum calefit in latere sinistro: vel a splene ratione istarum arteriarum: et hec fuit una causa quare arterie multe: et magne veniunt ad splenem sicut alia causa fuit. ut calore arteriarum sanguis grossus qui est nutriturus splenem subleuet et digeratur: quod splenem habet substantiam raram in quam deorsum recipere humorem grossum melancolicum. Et ex his apparet tibi quintum quod debes videre de splene. scilicet que sit eius substantia: que est rara et spongiosa propter quod apparet sextum scilicet cuius complexionis sit: quod in preparatione ad cutem calide et humide: et essentialiter sit frigide et sicce: propter nutrimentum. iuuamentum per. Et ex his tibi apparet quod cum recipiat humorem melancolicum et continet at grossum et ineptum euacuandi quod frequenter repletur oppillatur et apostemat: et resolutio fortissima multum resoluunt substantiam eius si sint fortiora danto quod ratione humorum competat. Et hec de splene.

¶ De epate.



¶ Par manifeste vides esse locatum in dextro latere amplectens stomachum superius eleuatum valde: et non decipiat te quod aiali mortuo multum locat sub costis: quod non est sic: cum sit sub dyasfragmate et dyasfragma extremis costarum coniungitur: sed hoc evenit quod membra spualia multum evanuerunt: et ideo vacuitate eorum replet epas: comprimendo dyasfragma et ideo debes trahere inferius et aiali sue corpus eleuare. Et considera secundo quantitatem eius maximam in homine: cum sit aial calidum et humidum. Tertio respicias partes eius quarum quedam sunt intrinsece integrales: quedam vero extrinsece magis: intrinsece integrales sunt quoniam penule eius in homine non semper sunt abnuice separe: et quilibet illarum penularum est composita ex renis diuisis et dispersis per eas in modum retis cuius retis vacuitates replete sunt carne: que est propria substantia epatis: que est sanguis coagulatus: et in his venis continetur chylus: qui diuisus est ad minimam secundum minimam alteratur et contangit ab epate: et ideo fit ut quasi totum epas contangat totum chylum: et hoc ordinavit natura ut melior fieret et perfectior conversio chyli in sanguinem: quod alteratio que fit secundum minimam melior siue perfectior est. Sed tu dices quare nam non sic ordinavit in stomacho: sed in stomacho posuit concavitatem unam. Dico quod hoc fecit quod in stomacho non deorsum fieret perfecta digestio: sicut in epate. Item quod in stomacho assumuntur cibaria grosse substantie que non possent per strictissimas vias penetrare: sed ad epas substantia tamen ligida deorsum puenire et penetrare. Et ista decoctio: et si fiat in toto epate magis tamen fit in parte superiori. Et propterea pars illa solidior est et magis compacta. ¶ Partes eius extrinsece sunt partes quibus quibus mediantibus habet cum alijs colligantia: nam cum corde habet colligantiam per venam chylis que

oritur a gibbosa parte epatis: et per artarias: ut videbis in anothomia cordis et vene chilidis: hanc colligatiam ad dyafragma cui suspenditur: et ad spondiles siue dorsum cui alligatur per pāniculum eius. Pāniculus autem eius est duplex. scilicet cooperiens circūuoluens. et suspendens. Primus est substantiam suā velans. Secundus est suspendens ipsam ad dyafragma superius. Ex primo patitur dolorem extensiuū. Ex quo patitur quicquid doloris extensiuū: per secundum patitur dolorem aggrauatiuū a materia aggrauante. Quedā vero sunt partes que sunt orite ab eo: et iste sunt duplices. Vene et canalis chistis fellis: de canali hoc postea videbitur. Vene autem sunt duplices. scilicet chilidis que oritur a gibbositate epatis: et cōcaua siue porta que oritur a cōcano epatis. De anothomia chilidis postea videbitur. Porte autem sunt quicquid rami intrantes epar sicut sunt quicquid penule iam dicte epatis. Egredientes vero extra epar sunt octo: due parue in quibus nō labores ad discernendum: quia sufficit tibi si sequētes discernes. Sex autem aliarum. Prima vadit ad dextrum stomachi ad intendendum tunicā exteriorum eius: et spāliter partē inferiorē. Secūda vero vadit ad splenē cuius anothomia tam vidisti in anothomia splenis: et illa est satis magna et bene discernibilis. Tercia tendit ad latus sinistrum et vadit ad intestinum rectum ad exsugandum humiditatem a cibo si quid remansit inuatiua. Quarta vadit ad superiorem partem dextram stomachi ad nutriendum ipsam in opposito eius: que veniebat a splene ad latus sinistrum. Quinta per diuiditur: quia una vadit ad dextram partē iurbi ad nutriendum iurbum in opposito illius que veniebat a splene: que veniebat ad nutriendum sinistrum iurbi. Alia vero pars vadit ad colon ad suggendum quicquid est in ipso. et ad nutriendum ipsam: propterea in parte dextra maxime continuatur iurbus cum colon. Sexta vero pars vadit ad intestinum: reliquū eius vadit per intestina gracilia. scilicet pylion usque ad cecum: et in isto sunt plures vene miserrime que in aliquo alio: et propterea iste ramus erit tibi manifestus valde: et hoc de tercio videndo circa epar. Quartum quod debes videre est forma eius et figura: nam figura est lunaris: quia cōcauitatem habet et gibbositatem: propter quod apostema factum in gibbo eius dicitur esse figure lunaris. Quinto apparet substantia eius: quia additio in eo est caro prope quā est sicut sanguis coagulatus: et ideo est eius complexio calida et humida.

Unuamentum et opatio eius per quod eius opatio est chilium sanguificare. Et quia ydrops est propriū nocumentū sanguificationis manifestū est: quia ydrops est propria passio epatis. Quō autem aquositas vel ventositas huius pueniat ad totum: ut in yposarcha satis per quod per venas. Quō autem pueniat ad concavitatem ventris ut in asclite et timpanite declaratum est supra in anothomia ventris et mirach.

De chistis fellis.

Chistis fellis locus est quia in cōcauo epatis in pennicula media eius: et cā huius fuit: quia colerā quā continet dicitur transmittere ad intestina propter causam dictam superius: nunc autem agilius colerā hanc transmittit ad intestina: quia si esset locata in gibbo epatis. Item nisi sic esset tunc nō cōtangeret intestinum colon propter inuamentum dictum. Sed tu dices quō verificat dictum Galeni quō de inuamentis membrorum capitulo. iij. quod purga-

tiuum colore est in loco medio venarum que portant sanguinem ab epate et venarum inferiorum que attrahunt et educunt chilium ad epar. Dicitur quod illud habet veritatem in loco colli chistis fellis: quia initium colli est in medio epatis: ut per ad sensum: et debuit ibi esse initium sui ortus cum in medio epatis cōpleat digestio humorum. ergo tibi dicitur sanguis depurari a superfluitatibus omnibus: et in collum chistis fellis ibi debuit esse vel habere ortum: hanc bursa siue vesica chistis sit locata: ut dictum est. Scis quod debes videre est colligatiam eius: Colligatiam autem eius apparet ex partibus suis quas discernes eleuando chistim fellis a parte inferiori: tunc manifeste vides quod habet duplicem partem. scilicet vesicā continentem et collum suū deferens et deportans: et istud collum usque ad distantiam quādam est vniuū: et postea bifurcatur: vniuū ramus eius penetrat in epar in medium sui vel melius oritur a medio loco epatis: ad attrahendum colerā ab epate. alter ramus magnus descendit ad intestinum duodenū: ut vidisti superius: et iste bifurcatur: quia ab ipso ramus puus ramificatur: quod vadit ad fundum stomachi ad cōfortandum digestiuam: et iste fuit puus ut expulsiua superflue nō irritaret vel stimulare: et istud est verum: ut in pluribus. Aliquis vero iste ramus est maior eo quod vadit ad intestina predicta. Et ex his ad sensum poteris videre solutionem cuiusdam quod dicitur quod puenit fieri tertio de virtutibus naturalibus quod Galenus dicit quod per idem collum chistis fellis attrahit colerā et expellit: quia videtur quod tunc expellat ad locum: et ad membrum a quo attrahit. Dicitur quod istud est idem collum usque ad quādam distantiam: postea vero bifurcat. Et ex hoc apparet tibi que sit colligatiam chistis fellis: quia colligatiam habet cum epate: intestinis: et stomacho. Item habet colligatiam ratione nervorum venarum et artiarum cum alijs eo quia ad ipsam propter predictum canale pueniunt vene et arterie: quas potes videre ad sensum ad ipsam nutriendum: quia ex eo nō nutrit quod puenit ad concavitatem eius secundum Galenum. eodem tertio sicut ad ipsum perveniunt nervi: quibus mediātibz habet sensum. Ex his apparet tertium. scilicet quod sit numerus partium eius: et quartum. scilicet que sit eius quantitas: et quintum. scilicet que sit figura eius: quia figure oblonge cum rotunditate: substantia eius est pellicularis. Iuamentum eius patet ex dictis: quia factus est ad attrahendum colerā rubrā: et superfluum ab epate ad expellendum eā ab intestina: ut dictum est. Et ex his potes videre que sint infirmitates que ab ipso possunt contingere: et sunt valde nocentes: quia oppilationes. Illa autem oppillatio potest esse duplex. scilicet quod vel est oppillatio facta in collo eius cōmuni: vel in aliquo ramorum eius: si sit facta oppillatio in collo eius cōmuni: tunc cum colera non expurgetur ab epate permiscetur cum sanguine per totum corpus: et si ipsa sit colera subtilis et corpus sit aptum ad febrem ipsa est causa febris putride colericæ. si vero sit grossa: tunc est causa yctericiæ: et tunc egestionem poterunt esse colorate: tunc magis vel minus secundum quod plus attrahitur de colera ad intestina. Interdum tamen est quod oppillatio illa sit tamen in canali: quod pervenit ad intestina: et tunc colera attrahitur ad chistim fellis: et non potest expelli ad intestina: quia clausus est canalis: et tunc putrefiet et causabit febrem tertianā vel continuam: et egestionem nō erunt tincte sed virina sic. Quādoque vero erit oppillatio in canali quod puenit ad epar: et tunc egestio nō erit tincta: nec ad chistim attrahetur colera. Et ideo in eo nō continebitur

tur: per consequens non putrefiet in loco proprio
 et ideo colera generatur: ictericia: vel febrem conti-
 nuam. Et nota bene has oppilationes: quia multum
 valet ad curam: et multones contingunt. Et ex his
 habes perfecte anothomia epatis. Et his expedi-
 tis potes eleuare splenem et abscindere epas. sed non
 in totum. Sed circa girobum eius ubi est origo vene chi-
 lis dimitte partem quandam: ut altam videas que refer-
 uauimus ad posteriora ob epate et vena illa. Stoma-
 chus autem dimitte: sed eleua miscenterium: quia eius ano-
 thomia videtur in anothomia intestinum.

De vena chilis de renibus.



Uibus omnibus eleuatis tibi apparet
 bit vena magna: que est ramus chilis de-
 scendens. et arteria magna que est ramus
 adorti descendens: et quoniam illa vena chilis
 est indirectio renum ab ipsa ramificatur

due vene: que vocatur emulgentes: quarum una vadit
 ad renem dextrum: altera ad sinistrum. Quisicia in illas
 non sunt indirectio: sed vnus est altius et superius alio: et
 hoc ne vnus ren impediret alium in attrahendo. Su-
 perius autem ut in pluribus est origo vene quod venit
 ad renem dextrum. Inferius vero eius que venit ad re-
 nem sinistrum. Iam sit aliqui e contrario: et causa illius fuit: quia
 ut in pluribus ren dexterius esse magis ad superiora
 eleuatus sinistro. et hoc quia calidius est eleuare: ipse autem
 calidior est sinistro. Item quia monoculum intestinum
 est locatum in dextra parte sub rene. Item epas erat
 eleuatum superius. Splen vero in latere sinistro ma-
 gis descendebat. Sed si alicui esset magnum epas:
 monoculum esset paruum. colon vero in parte sinistra
 esset eleuatum: et pars siue ren sinister esset calidior
 dextro: et esset contrarius modo: hoc tamen raro est:
 quolibet harum emulgentium vadit ad renis con-
 cauitatem: et ideo debes vnam earum excarnare: et
 melius est ut excarnes leuiter illam: que venit ad
 renem dextrum: propter causam que dicitur: et in ea po-
 nas tentam: et videbis quod ad concauitatem et cauer-
 nositatem renis venit cuius iam apparet tibi locus
 quia locus eius est quasi iuxta epas. Sed tu dices que
 re non fuit inferius iuxta vesicam: dico quod causa fuit ut
 bene attraheret aquositatem ab epate: quoniam enim mem-
 bra attrahens est prope illud a quo debet attrahere
 attractio est melior. Colligantia etiam eius cum epate
 apparet: quia magnam venam recipit ab epate me-
 diante vena chilis: ut per venam illam aquositatem vir-
 nale que amodo est superflua corpori postquam san-
 guis egressus est epas attrahit et expellat: sed cum
 hac aquositate et attrahitur sanguis: quia secundum Galenum. ob
 iuuamentis caplo. id est de virtutibus naturalibus ad
 membra ad que attrahit superfluitas aliqua per canale
 latum attrahit simul cum superfluitate iuuatiua. scilicet san-
 guis: et hec est causa quare ad splenem et ad renem simul
 cum superfluo proprio vnicuique attrahit sanguis. scilicet ad
 vtrumque vesicam. scilicet sellis et vine pure superfluitas at-
 trahitur sine sanguine. Et ex hoc apparet tibi quod si
 vena ad renes puenit cum sanguine mixta et ve-
 nit ad vesicam depurata et separata a sanguine: oportet
 ergo quod in renibus depuratur et coletur. Colatur autem:
 quia ad concauitatem peruenit renem quam videre debes
 sciendo renem in parte gibbosa eius non concaua
 et per longum pertrahere versus quo concauitatem vide-
 as: statim tunc apparet quidam paniculus: siue pan-
 nuus ramus: et ista est vena emulgens rarefacta ad

modum collatorum: et per has porositates potest vi-
 na transire: sanguis autem non. Et ideo colatur vena
 et distillat inferius in rene ad officium cui continua-
 tur porus virtutis: quod descendit inferius versus ad
 vesicam et vena descendit propriam ad vesicam. Et ex
 hoc apparet tibi quod hanc colligantiam cum vesica: fuit
 hanc colligantiam propter arteriam que venit ad ipsum
 puenit cum corde et cerebro ratione nervorum: quod pue-
 niunt a nucha ad texendum paniculum eius quo media-
 te sentit: et sanguis remanet in rene: et attrahit in sub-
 stantia eius: et nutrit renem. Et ex hoc apparet tertium
 scilicet quod sit numerus eius partium. Quia primo nume-
 rus discretus est sub duobus: dextro et sinistro. Et
 causa quidem fuit quod si nocumentum accideret vni ope-
 ratio perficeretur per alterum. Secunda causa fuit ut totam super-
 fluitatem aquosam: que multa est plus quam aliquid
 alia scilicet digestionis bene et complete possent attra-
 here. Et ex hoc apparet quod non fuit tamen vnus ren: si-
 cut vnus splen: et vna chistis sellis. Sed tu dices que
 re non fuit vnus et magnus potens attrahere to-
 tam aquositatem: ad hoc respondet. Secundo caplo pallega-
 to: quia si esset tamen vnus magnus: tunc corpus huma-
 num rectum non esset equum in lateribus. sed inequalis
 quod est verendum et enorme. numerus autem partium tres:
 quia hanc substantiam propriam concauitatem paniculum
 et collatorum. Quarto notes quantitatem et figuram. nam
 figure est oblonga: ut in ipso distincta essent duo offi-
 cia predicta. Apparet etiam quanto que sit substantia eius
 quia carnosa et solita multum: ut ab aquositate morbi-
 cativa non lederetur vel dissoluatur apparent iuu-
 menta renum. Et ex his notes hic quod in renibus ex quo-
 libet genere egritudinis accidit difficilis egritudo.
 Primo ex morbo complexionali ut ex superflua cali-
 ditate dyaboles que secundum Galenum. sexto de interioribus
 assimilatur lienterie stomachi: quia tota aquositas subi-
 to attrahitur et expellitur sine digestionem a renibus.
 Patitur etiam morbum compositionalem proprium
 et spiritualiter in numero ut lapidem arenam et pillos.
 Lapis vero arena et pili ut plurimum generantur ex
 eadem materia: et in eodem loco. nam materia horum
 sunt humores grossi: quod densantur et inspissan-
 tur a caliditate renum. Et interdum est quod parum in-
 spissantur: et tunc fiunt pili quod generantur subtiles et
 longi: quia materia illa per poros aliquem strictum repellit
 paulatim: et continuata a poris cutis expellit paula-
 tim: et continue materia pili et capilli: quoniam illa mate-
 ria plus adurit generatur arena que congrega-
 ta generat lapidem. Et ille lapis est rubeus: quia ren
 est rubens. Et iste lapis si sit ita magnus: quod non pos-
 sit egredi per viridem: vel non frangitur difficili-
 me et quasi est impossibilis cura: quia non nisi per incisio-
 nem a qua penitus caueas. Si vero sit parvus et irra-
 gibilis difficulter curatur: et expellet cum fortissimis
 doloribus cum transeat per membra valde sensi-
 bilia: et ingrediatur per caernositates vesice: que sunt
 ita stricte. Sed fortitudine virtutis aperiantur et di-
 latantur: et non est longinquum quod aliqui sciuntantur.
 Patiantur etiam renes solui: neminem continuitatis
 quantum ad venam eorum ex qua accidit fluxus san-
 guinis cum vena. Et nota quod hec solutio huius ve-
 ne que est causa huius fluxus sanguinis proprie debet
 intelligi quod sit facta et fiat in parte illa in qua vena
 sit subtilior: et rarior: et hec pars est pars panniculi
 collatorum: ut apparuit tibi ad sensum: et ideo quando

illa soluitur cum deberet phibere sanguinem de-
scendere: non phibet. Et ideo sanguis egreditur cū
vina. Et sic mictus sanguinis verū est q̄ dicunt ali-
qui alij q̄ istud accidit ex vena soluta supra renes,
et dicunt q̄ cā est: q̄ vena debilitatur in cōtinēdo.
Sed tene primū dictū: q̄ rōnabilius magis est et
sensui magis p̄ et concordat. Patitur etiam quar-
to egritudinem compositū vt apostema: et tūc est
dolor infixus ppter substantiam suam solidam ag-
grauatius. Ac si lapis esset infixus in loco: et in do-
lore hoc multum cōcat cum colica. Sed dīta disti-
cta ipsoꝝ dicta est supra. C̄ his cōpletis non ele-
ues renes: sed qū veneris ad vasa sp̄matica vt vi-
deas ortum eorum: et ideo dato q̄ vesica sit octa-
uum mēbrum continuatiōe. tamē p̄termittas ano-
thomia vasoz sp̄maticoz et testiculorum.

C De vasis spermatis et eorum differentia et
conuenientia etc.




Debes ergo scire q̄ membra generatio-
nis in viris et in mulierib⁹ in aliquo dif-
ferunt: et in aliquo conueniūt. Conueni-
unt primo in vasis spermaticis quāru-
ad ortum eoz: q̄ vt dicit Auiac. secūdo
cā. sen. xx. et xxj. de anothomia matricis: vasa sp̄-
matica in viris et in mulierib⁹ oriuntur iuxta renes
ita. s. q̄ vasa que sunt in pte sinistra ortū habent a
vena emulgente sinistra et dextra ortum habent su-
pra renes scz rene a vena chili: et arterie ab arteria
adorti. Et q̄ hec vene ortum hñt a corde et ab epa-
te vt infra videbis potest cognoscere quomodo va-
sa sp̄matica sunt decisa a corde: q̄ non immediate s̄
mediate. Et hoc in viris et in mulieribus potes vi-
dere: l3 autem conueniant magis in loco originis.
In locis tñ ad que terminantur in viris et in mulierib⁹
multum differunt: q̄ in mulieribus terminan-
tur ad matricē in loco exteriori vbi sunt testiculi: et
imo proprie loquendo extra matricē reuoluūt
et contextunt. Et concavitates cōtexture carnibus
minutis glandosis replentur: et p̄pterea non sunt ve-
re testiculi: sicut in viris: imo sunt sicut testiculi lepo-
ris: facit ppter predictam vtilitates vt generent hu-
miditatem quandā salualem que sit cā delectatio-
nis in mulierib⁹: postea vasa hec substantiam pe-
netrant matricē et ad concuitatem ipsi⁹ p̄tingūt.
Et sunt ora ipsius et vocantur conilidones: q̄ eis me-
diantibus alligatur fetus matricē que sit fluxus
menstruoz. Et quedam pueniunt ad os matricis
neruosum ad portandum humiditatem salualem
iam dictam et ab his venis ramificant et oriuntur due
vene a quolibet latere vna: que in mirach penetrāt
et ascendunt: quātō plus ascendunt minus occul-
tantur: et extra iuxta cutem magis approximāt: do-
nec pueniant ad māmillas. Et ideo in mulieribus
quādo facis anothomiam mirach vsq̄ ad has ve-
nas cōserua et cōsidera hūc locum: et hoc in mulie-
re: qū in porcha vel in alio animali habente mā-
millas in mirach iste vena oriunt in matricē: et ma-
nifestant in mirach. Et post has venas ascendit a
p̄fundo pectoris iuxta vel indirecto pomi grana-
ti vna vena que venit ad māmillas ad decoquēdū
sanguinem: q̄ d3 conuerti in lac: et non videtur nisi
vna: et in porcis pregnatib⁹ valde apparet. Et tūc
apparebit tibi colligāda matricē: et māmillas per
venas illas. Et quare appositio v̄tose in māmil-

lis restringit fluxum mēstruoz. Et vt continuetur
hic sermo si facis anothomiam in muliere post vasa
sp̄matica debes videre anothomiam matricis eius:
sicut in alijs mēbris videas. Primo locum et colligā-
tiam. Secūdo figurā. Tercio quātitatem. Quar-
to substantiam. Quinto numerū partium eius. Sex-
to iuuamēta et nocumēta eius. Locum eius vide-
bis: q̄ est situata in concuitate alba: et est cir-
cundata concuitas illa sp̄dilibus allanis: et cau-
da a parte posteriori: et a parte anteriori: p̄ que dī-
pecten siue femur: q̄ ipsa immediate est locata inter
intestinum rectū quod est sicut calcitra eius a pre-
posteriori: et vesicam ex pte anteriori: et sp̄aliter quā-
tum ad collū eius: q̄ eius collo supueniet collum
vesicē: l3 concuitas eius altior sit concuitate ve-
sicē. inter dextrum aut et sinistrū est in medio posi-
ta directe. C̄ Secūdo videas colligātiā eius: q̄ ma-
gna est: q̄ colligātiā h3 quasi cum omnibus mē-
bris superiorib⁹: q̄ cum corde et epate mediantibus
venis et arterijs: cū cerebro rōne neruoz multozū:
et per consequēs cum stomacho rōne vtrozūq̄: cū
mēbris que in medio sunt vt cum diaphragmate re-
nibus et mirach: q̄ mediantibus his cū p̄dictis al-
ligat: et sp̄aliter cū māmillis: vt dixi. l3 et cum eis sit
colligātia mediantibus alijs venis: que oriuntur a
vena chili ascendēte que oriuntur sub furcula. vt in-
fra dicitur. Est etiam colligātia eius cū membris
inferioribus vt vesica per collū ei⁹ et intestino colō.
Colligata aut est anchis et iūcturis ambabus scie
que sunt ligamenta grossa: et fortia alligātia matri-
cem ad anchas: que iuxta matricē sunt lata: et gros-
sa et iuxta anchas subtilia p̄cedentia sicut cornua a
capite aialis. Et iō vocata sunt cornua matricis.
Figura eius est quadrangularis cum quadā rotun-
ditate hñs collū longum inferius: et cā butus figure
fuit exigentia loci: et vilitas siue necessitas propter
quā fuit creata: q̄ postea dicent: q̄ p̄ talem figurā
h3 distinctionem cellulaz. vñ. que dicentur inferius.
Tercio videas de quātitate ei⁹: quātitas ei⁹ p̄prie
mediocris est s̄m quātitatem vesicē: variat tñ rōne
aliarū: q̄ maiora et minora rōne coitus: et impre-
gnationis: q̄ mulier que fecūdauit h3 matricē ma-
iores q̄ sterilis. Secūdo rōne coitus q̄ mulier v̄tō
coitu: maiorem h3 matricē virgine: vel continētis
vt accidit in viris membro pudēdo: eo q̄ opatio
magnificat mēbrum: s̄m Sal. sexto de iterioribus.
Tercio rōne etatis: q̄ iuuenis maiore h3 matricē
q̄ habeat puella et senilis. Quarto rōne comple-
xionis et humiditatis totius ista potes colligere ex
sen. scōl. c. p̄allegato. Et ppter istas quattuor: cās
mulier quā anothomizauit āno p̄terito. s. āno xp̄i
M.ccc. xv. de mēse Ianuarij maiores in duplo ha-
buit matricem q̄ illa quā anothomizauit āno eodē
de mēse Martij. Potuit ēt esse vna causa quam
ponit Auiac. s. q̄ prima erat tunc menstruata et in
partem menstruationis ēt impinguat et ingrossatur
matrix. diuersificat ēt matrix rōne generationis: q̄
matrix aialium plurimum generatiui maior est q̄
matrix vnius generatiui. Et p̄pterea centies erat
maior matrix porche quā anothomizauit anno dñi
M.ccc. vj. q̄ vñq̄ videri in femina humana: potuit
tñ esse alia cā: q̄ erat pregnans et habebat in vtero.
xij. porcellos: et in ea monstrauit anothomiam fetus
siue pregnantis quam tibi narrabo. Quarto videas

eius substantiam. Substantia eius est nervosa et pelliculosa: ut possit dilatari ad fetum continendum: et ideo est frigida et sicca complexionis: et etiam substantia eius spissa multumque subtiliatur in dilatatione necessaria. Quinto videre debes numerum partium eius: ipsa enim habet partes exteriores et interiores. Exteriores sunt latera eius in quibus sunt alligati testiculi: et vasa seminaria iam dicta. et cornua eius: et collum cuius extremitas est vulva: et circa collum nota quod ipsum est longum in quantitate palmi: ut virga: latum et dilatabile: et ideo pelliculosum et rugosum rugas habens ad modum sanguisugae: ut utilitatio ei ex virga in coitu contingat: et in extremitate vulvae sunt due pellicule se elevantes et deprimentes orificium dictum: ut prohibeant ingressum aeris et reus extrisecatur in collum matricis vel vesices: sicut pellicula spucij tuus veretrum et ideo vocat eam Aliabas loco pallegato spucia matricis. Partes intrisecas videre potes eas scidendo per medium: et tunc videbis os eius: et concavitatem eius. Et os est nervosum multumque factum ad modum oris catuli nup nati: vel ut propius loquar ad modum oris tince antique: et in superficie eius est velatum velamine subtili in virginibus: et in violatis rumpitur et ideo sanguinatur. Concauitas vero eius habet septem cellulas: tres in parte dextra: et tres in parte sinistra et vnam in summitate siue in medio eius: et iste cellule non sunt nisi quedam concavitates in matrice existentes in quibus potest sperma coagulari cum menstruo: et contineri et alligari orificijs venarum. Ex his omnibus apparent iuamenta matricis: quod principaliter est facta propter conceptionem et ex consequenti ut totum corpus in proprio sanguine indigesto mundificetur: vel purgetur. Et hoc in homine: quod alia animalia fluxum menstruum non patiuntur: quod tales superfluitates consumuntur in eis: in pellis: pillis: ungues: rostra et penas: et huiusmodi: homo autem caruit his. Et ex his patet quod multis passionibus est submissa: et multa membra per commotionem ei compatiuntur: que sunt passiones et proprie accidentia et causas et curas longinquum esset narrare: et extra propriam intentionem: sed quere in locis pallegatis appropriatis: ut in tertio canon. xxj. fen. a Serapione: Rasi. et Joanne nostro passiones que eidem compactiones existunt sunt tot quot sunt membra: quibus est colligata: siue localiter alligata: que sunt illa iam dictum est et vidisti. Unum tamen ex anothomia potes perpendere quod ponit Gal. sexto de interioribus. scilicet quod suffocatio matricis non fit quod matrix corporaliter moveatur usque ad collum gulam et pulmonem: quod hoc est impossibile: sed hoc contingit siue accidit quod ipsa non potens expellere vapores per partem inferiorem: propter aliquam causam mouetur et constringitur in parte inferiori ut expellat ad superiora. Et si isti vapores per colligantiam iam dictam perveniant ad stomachum per compactionem et arteriam adorti faciunt singultum et eruptionem frequenter: et tunc mulieres dicunt quod habent matricem in stomacho. Si vero hi vapores perveniunt ad pulmonem et impediunt operationem eius dyasfragmatis scilicet anhelitum dicunt mulieres quod habent matricem in gula: quia gula sine trachea arteria est ordinata ad anhelitum immediate. Si vero illi vapores perveniant ad cor quod raro contingit suffocationem patiuntur cum sincopi: et tunc dicunt mulieres quod matrix earum per-

venit ad cor. Verum est quod hec suffocatio fit per commotionem ad dyasfragma: propter alligantiam quam habet ipsa matrix cum dyasfragmate: et cum lumbis. Non enim ipsa pervenit ad ipsa membra sed vapor: quomodo autem possit et per quas vias pervenire potuisti videre: que sit cura et cum quibus querat ab auctoribus: quod anothomia in his principaliter dat noticiam locorum. Etiam narraui anothomiam vasorum spermaticorum mulieris: et visa est continentia ipsorum in viris et mulieribus quantum ad originem. Sed differentia est quia cum viris testiculi sint ad extra sicut sunt in quolibet animali: quod debet esse morosum in coitu: sicut sunt omnia quadrupedia preter eridum vasa spermatica intra mirach non terminantur: sed egrediuntur mirach et testiculis copulantur ut duobus suspensorijs: quia membra nobilia ut sunt tuta a nocumētis extrinsecis debent esse velata panniculis. Ista vasa non contenta in siphac contenta et velata sunt panniculis vel panniculo orto a siphac qui nominatur vindimius: cuius orificium est in fine illoz clausum secundum naturam existens. In processu eius secundum quantitatem vasorum dilatatum existit: in fine eius dilatatur ad quantitatem testiculorum. Et in parte illa vocatur bursa testiculorum siue oreum: sic apparet culus figure sit iste vindimius et cuius quantitatis sit. Et quantitas numerus partium eius: substantia: positio: siue colligantia: apparet etiam iuamentum eius: quod factum est ad continendum et custodiendum testiculos: vasa spermatica pervenientia ad eos. Egritudo igitur spalis eius cuius cognitio et cura declaratur ex anothomia est dilatatio orificij eius preter naturam que causa est ut illa que continent intra siphac descendant in oreum: et talis descensus dicitur hernia: et quod illud quod descendere potest est ventositas: vel aquositas: vel intestinum: hernia triplex est: ventosa et aquosa: et intestinalis. Carnosa autem non causatur ex descensu alicuius. Curantur autem he passiones per emplastra constrictiva et ligationes secundum quod ponunt auctores. Sed illa que est intestinalis quando precessit cyrugia proprie curatur: et modum videas: quod suppinatur homo et intestina reintro mittuntur: siue ad proprium locum reducatur. Postea testiculus ducitur superius donec sit in altiori loco in quo possit esse: et illum locum signa: quod tunc directe est supra osse femoris: quod in loco illo debet fieri incisio vel perforatio et non supra locum illum. Quia tunc perforaretur mirach. et aliquod intestinum. Non etiam debet fieri infra locum illum: quia remaneret post consolidationem illa eminentia magna preter naturam. In signato loco debet fieri perforatio: et ista fit a quibusdam cum rasorio et citius expeditur et vadunt circū circa excarnando vindimium et etiam testiculum ab oreo. Postea ligant in parte superiori et abscindunt vindimium et vasa spermatica cum testiculo: et consolidant postea. Et ista cura cito fit. Et quidam sunt qui solum excarnant vindimium et non testiculum: et sunt et ligant in parte superiori: et ponunt medicamina fortiter constrictiva et sic dimittunt. Et fit ista perforatio cum caustico rumpente: et adurente cum tim in loco illo: postea ponunt arsenicum quod corrodit et causticat et constringit: adurendo et continue partes vindimi corruptas extrahunt: postea vero consolidant.

De diuersis vasis spermatis rē.



Expedito vīdēdo debes videre q̄ po-
nunt auctores scilicet q̄ vasa spermati-
ca sunt duplicia scilicet preparantia ⁊
deferentia: preparantia sunt que de-
scendunt a locis predictis scilicet testi-
culis. ⁊ circa partem superiorem testiculorū inuol-
uuntur ⁊ saccum quasi ibi faciunt. Nō enim substā-
tiam testiculorum ingrediuntur. ⁊ ista vasa sunt ve-
nosa ⁊ nervosa. alia vero sunt que istis continuan-
tur nervosa magis: ⁊ quanto plus ascendunt a tes-
ticularis magis sunt nervosa ⁊ ascendunt vsq; ad
locum ossis femoris: vbi incipit vīdēdo egredi.
Et tunc profundantur interius iuxta loca vesice vsq;
colli eius: ⁊ tandem pcedunt ad virgam ⁊ ad mea-
tum virge perueniunt in loco qui est in foramine
ossis femoris: ⁊ tūc per meatus q̄ sunt ibi duo sicut
vasa spermatica sunt duo emittunt sperma quod
apportatur a testicularis: quod ab eis generatū fuit
in alijs vasis: ⁊ illud sperma emittunt in canale vir-
ge: ⁊ postea virga extra emittit. Verū est q̄ illa fo-
ramina non poteris videre nisi quando anotho-
mias virgam. Et ex his tibi de testicularis hominis
⁊ vasis spermaticis apparet figura ⁊ substantia: q̄
testiculi sunt glandosi: ⁊ apparet numerus: quanti-
tas: positio: colligantia: ⁊ iuuamentum eorum. Et
ex his apparet egritudo: quia quando inciduntur
vel apostemantur vel oppilantur vasa: vel alia de
causa materia spermatis non peruenit: quod ces-
sat coitus: sicut interdum propter oppositas cau-
sas fit emissio spermatis in voluntaria: ⁊ maxime
contingit propter spasmus vel propter mollifica-
tionem predictorum vasorum.

De vesica ⁊ que circa eam dicuntur.



Is completis eleua renes: ⁊ vade excar-
nando vnum porum vritidem vel am-
bos: ⁊ videbis q̄ terminantur ad vesi-
cam iuxta medium eius: ⁊ non est perio-
rans vesicam directe vno foramine ma-
gnos: sed foraminibus magis paruis ⁊ obliquis: a
lateribus procedentibus inter tunicam ⁊ tunicas
vel inter tunicam ⁊ coopertorium. Et hoc fuit fa-
ctum vt quando vesica repleteretur vrina non rede-
at vrina ad renes: imo quanto plus impletur tanto
plus foramina illa clauduntur: q̄ paries vnus tu-
nice ad parietē alterius siue coopertorii applicat.
Scide ergo vesicam ⁊ videbis magnā eius conca-
uitatem q̄ nervosa est: ⁊ videbis eius collum carno-
sum ⁊ musculosum: vt tēporib; determinatis quā-
do o3: ⁊ homo vult expellat vrinā: q̄ est necessa-
rium retinere: retineat eam. Et q̄ musculosum est
eius collum si incidat vesica in collo eius consoli-
dari pōt: si vō in fundo nō. Collū eius aut foratus
est foramine paruo p qd̄ emittit vrinā ad canalē vir-
ge: ⁊ extra egredit. Nam illud collū statim cōtinua-
tum est cū pputio virge vt potes videre: ⁊ sic ipsi
vesice apparet locus: quantitas siue colligantia: nu-
merus: substantia ⁊ iuuamentū. Egritudines potest
pati oium generū vel modorū: vnam tñ patitur que
dicitur litafis: nam ī concauitate eius potest gene-
rari lapis ex humoribus mucilaginosus congrega-

tis in ea ⁊ condensatis a caliditate supflua. Et hic
lapis curatur cū dissoluentibus ipm vel p incisio-
nem. Nam hic lapis si tuato homine debite ne pos-
sit se mouere sedendo: o3 cum digito posito manū
⁊ cum manu alia posita sup femur cōduci ad collū
vesice ⁊ conductus ibi retineri: ⁊ postea o3 fieri inci-
sio in collo: ⁊ cum trahectorio violenter extrahi:
⁊ hec si lapis est magnus. si vero paruus q̄ possit
p canalē virge extrahi o3 p compressionem factam
cum digitis ex collo vesice conduci vsq; ad vir-
gam: si non egreditur cum trahectorio paruobē
bet educi.

De virge continuatione: ⁊ que circa eam narrantur.




Ultimo vero est virga continuata cū col-
lo vesice carnosio continuato multis li-
gamentis ⁊ choridis: que oriuntur ab
osse pectinis: cuius neruis ortis a nucha
⁊ ideo valde sensibilis ⁊ extēibilis est:
cōtinuata est et cum maximis venis ⁊ arterijs or-
tis a vena descēdente: ⁊ arteriā in loco vbi bifur-
catur ad duas anchas: q̄ ad linguam ⁊ etiam vir-
gam veniunt maiores vene ⁊ arterie q̄ ad aliud
membrum eiusdem quantitas. Et ideo in locis pe-
riton inuolute sunt iste vene ⁊ arterie: ⁊ sunt magne
⁊ ibi est locus siue principium virge: ⁊ propter hoc
he vene sunt sicut radices virge: ⁊ propter istas vir-
ga est tota cauernosa: siue cauernositates replen-
tur ventositate generata in predictis arterijs: ⁊ q̄
ventositate replentur erigitur virga. Et vt melius
anothomiam eius videas: debes separare ossa fe-
moris: ⁊ eleuare virgam cum vesica: ⁊ in intestino
recto vel sine illis: ⁊ diuidere virgam per longitu-
dinem: vsq; ad eius canalē: ⁊ tunc in principio ei⁹
apparebunt duo foramina predicta: apparebunt
etiam cauernositates eius. Et ex his vides quanti-
tatem eius: quia quantitas siue longitudo eius est
vnus palmi: sicut longitudo colli matricis appa-
ret etiam substantia eius: q̄ nervosa est: preter ex-
tremitatem eius que vocatur prepucium. Apparet
etiam numerus partium eius: apparet positio ⁊ col-
ligantia: figura vero oblonga: quia virga est in ho-
mine absoluta: ⁊ non applicata ventri: sicut ī qua-
drupedibus: ⁊ causa fuit: q̄ homines in coeundo:
non coniunguntur fm dorsales: sed amplexando:
⁊ si cum virga eleuasti intestinum vel extremitates
intestini recti: cuius anothomiam diximus supra:
tunc cognosce in illo intestino siue extremitate ei⁹:
que dī anus musculos mouentes siue aperientes
⁊ constringentes. Et considera quinq; venas emo-
roydales que in extremitate eius sunt magis pro-
funde: sicut in quibusdam periodis determinantur
aperiuntur: ⁊ sunt fluxus emoroydarum. Et in his
completa est anothomia membrorum naturalium
que in primo ventre continentur.

De excoziatione mediij ventris: ⁊ que cir- ca hunc dicuntur hic.

eius substantiam. Substantia eius est nervosa et pelliculosa: ut possit dilatare ad fetum continendum: et ideo est frigida et sicca complexionis: et etiam substantia eius spissa multumque subtiliatur in dilatatione necessaria. Quinto videre debes numerum partium eius: ipsa enim habet partes exteriores et interiores. Exteriores sunt latera eius in quibus sunt alligati testiculi: et vasa feminaria iam dicta. et cornua eius: et collum cuius extremitas est vulva: et circa collum nota quod ipsum est lorum in quantitate palmi: ut virga: latum et dilatabile: et ideo pelliculosum et rugosum rugas habens ad modum sanguisugae: ut utilitatio ei ex virga in coitu contingat: et in extremitate vulvae sunt due pellicule se elevantes et depumantes orificium dictum: ut phibent ingressum aeris et reprobent extrisecum in collum matricis vel vesice: sicut pellicula propter tuiet veretrum et ideo vocat eam Aliabas loco pallegato propter matricis. Partes intrinsecas videre potes eas scilicet duo pro medio: et tunc videbis os eius: et concavitatez eius. Et os est nervosum multum factum ad modum oris catuli nup nati: vel ut propter loquar ad modum oris tince antique: et in superficie eius est velatum velamine subtili in virginibus: et in violatis rumpitur et ideo sanguinatur. Concavitas vero eius habet septem cellulas: tres in parte dextra: et tres in parte sinistra et vnam in summitate siue in medio eius: et iste cellule non sunt nisi quedam concavitates in matrice existentes in quibus possunt sperma coagulari cum menstruo: et contineri et alligari orificiis venarum. Ex his omnibus apparent iuvamenta matricis: quia principaliter est facta propter conceptionem et ex consequenti ut totum corpus superfluo sanguine indigesto mundificet: vel purget. Et hoc in homine: quia alia aialia fluxum menstruum non patiuntur: quia tales superfluitates consumuntur in eis: in pellis: pillis: ungues: rostra et penas: et huiusmodi: homo autem caruit his. Et ex his patet quod multis passionibus est submissa: et multa membra per commotionem ei compatiuntur: que sunt passionem ei proprie accidentia et causas et curas longinquum esset narrare: et extra propriam intentionem: sed quere in locis pallegatis appropriatis: ut in tertio can. xxj. fen. a Serapione. Rasi. et Joanne nostro passionem que eidem compassionem existunt sunt tot quot sunt membra: quibus est colligata: siue localiter alligata: que sunt illa iam dictum est et vidisti. Unum tamen ex anothomia potes propendere quod ponit Gal. sexto de interioribus. scilicet quod suffocatio matricis non fit quia matrix corporaliter moveatur versus ad collum gulam et pulmonem: quia hoc est impossibile: sed hoc contingit siue accidit quia ipsa non potens expellere vapores per partem inferiorem: propter aliquam causam movetur et constringitur in parte inferiori ut expellat ad superiora. Et si isti vapores per colligantiam iam dictam perveniant ad stomachum per compassionem et arteriam adorti faciunt singultum et eruptionem frequenter: et tunc mulieres dicunt quod habent matricem in stomacho. Si vero hi vapores perveniunt ad pulmonem et impediunt operationem eius dyasfragmatis scilicet anhelitum dicunt mulieres quod habent matricem in gula: quia gula sine trachea arteria est ordinata ad anhelitum immediate. Si vero illi vapores perveniunt ad cor quod raro contingit suffocationem patiuntur cum sincopi: et tunc dicunt mulieres quod matrix earum pervenit ad cor.

Uerum est quod hec suffocatio fit propter passionem ad dyasfragma: propter alligantiam quam habet ipsa matrix cum dyasfragmate: et cum lumbis. Non enim ipsa pervenit ad ipsa membra sed vapor: quomodo autem possit et per quas vias pervenire potuisti videre: que sit cura et cum quibus querat ab auctoribus: quia anothomia in his principaliter dat noticiam locorum. Etiam narraui anothomiam vasorum spermaticorum mulieris: et visa est continentia ipsorum in viris et mulieribus quantum ad originem. Sed differentia est quia cum viris testiculi sunt ad extra sicut sunt in quolibet animali: quod debet esse morosum in coitu: sicut sunt omnia quadrupedia preter eritum vasa spermatica intra mirach non terminantur: sed egrediuntur mirach et testiculis copulantur ut duobus suspensorijs: quia membra nobilia ut sunt tuta a nocumetis extrinsecis debent esse velata panniculis. Ista vasa non contenta in siphac contenta et velata sunt panniculis vel panniculo orto a siphac qui nominatur dindimus: cuius orificium est in fine illorum clausum secundum naturam existens. In processu eius secundum quantitatem vasorum dilatatum existit: in fine eius dilatatur ad quantitatem testiculorum. Et in parte illa vocatur bursa testiculorum siue oreum: et sic apparet cuius figure sit iste dindimus et cuius quantitatis sit. Et quantitas numerus partium eius: substantia: positio: siue colligantia: apparet etiam iuvamentum eius: quia factum est ad continendum et custodiendum testiculos: et vasa spermatica pervenientia ad eos. Egritudo igitur spalis eius cuius cognitio et cura declaratur ex anothomia est dilatatio orificij eius preter naturam que causa est ut illa que continentur intra siphac descendant in oreum: et talis descensus dicitur hernia: et quia illud quod descendere potest est ventositas: vel aquositas: vel intestinum: hernia triplex est: ventosa et aquosa: et intestinalis. Carnosa autem non causatur ex descensu alicuius. Curantur autem he passionem per emplastra constrictiva et ligationes secundum quod ponunt auctores. Sed illa que est intestinalis quando processit cyrugia proprie curatur: et modum videas: quia suppinatur homo et intestina retrahuntur: siue ad proprium locum reducatur. Postea testiculus ducitur superius donec sit in altiori loco in quo possit esse: et illum locum signa: quia tunc videtur recte est supra osse femoris: quia in loco illo debet fieri incisio vel perforatio et non supra locum illum. Quia tunc perforaretur mirach. et aliquod intestinum. Non etiam debet fieri infra locum illum: quia remaneret post consolidationem illa eminentia magna preter naturam. In signato loco debet fieri perforatio: et ista fit a quibusdam cum rasorio et citius expediunt et vadunt circudire exarnando dindimum et etiam testiculum ab oreo. Postea ligant in parte superiori et abscindunt dindimum et vasa spermatica cum testiculo: et consolidant postea. Et ista cura cito fit. Et quidam sunt qui solum exarnant dindimum et non testiculum: et sunt et ligant in parte superiori: et ponunt medicamina fortiter constrictiva et sic dimittunt. Et fit ista perforatio cum caustico rumpente: et adurente cum tim in loco illo: postea ponunt arsenicum quod corrodit et causticat et constringit: adurendo et continue partes dindimi corruptas extrahunt: postea vero consolidant.

De diuersis vasis spermatis rē.



Exposito vndimo debes videre q̄ po-
nunt auctores scilicet q̄ vasa spermati-
ca sunt duplicia scilicet preparantia ⁊
deferentia: preparantia sunt que de-
scendunt a locis predictis scilicet testi-
culis. ⁊ circa partem superiorem testiculorū inuol-
uuntur ⁊ saccum quasi ibi faciunt. Nō enim substā-
tiam testiculorum ingrediuntur. ⁊ ista vasa sunt ve-
nosa ⁊ nervosa. alia vero sunt que istis continuā-
tur nervosa magis: ⁊ quanto plus ascendunt a tes-
ticularis magis sunt nervosa ⁊ ascendunt vsq; ad
locum ossis femoris: vbi incipit vndimus egredi.
Et tunc profundantur interius iuxta loca vesice vsq;
colli eius: ⁊ tandem pcedunt ad virgam ⁊ ad me-
tum virge perveniunt in loco qui est in foramine
ossis femoris: ⁊ tūc per meatus q̄ sunt ibi duo sicut
vasa spermatica sunt duo emittunt sperma quod
apporatur a testicularis: quod ab eis generatū fuit
in alijs vasis: ⁊ illud sperma emittunt in canale vir-
ge: ⁊ postea virga extra emittit. Verum est q̄ illa so-
ramina non poteris videre nisi quando anotho-
mias virgam. Et ex his tibi de testicularis hominis
⁊ vasis spermaticis apparet figura ⁊ substantia: q̄
testiculi sunt glandosi: ⁊ apparet numerus: quanti-
tas: positiō: colligantia: ⁊ iuuamentum eorum. Et
ex his apparet egritudo: quia quando inciduntur
vel apostemantur vel oppilantur vasa: vel alia de
causa materia spermatis non pervenit: quod ces-
sat coitus: sicut interdum propter oppositas cau-
sas fit emissio spermatis in voluntaria: ⁊ maxime
contingit propter spasmum vel propter mollifica-
tionem predictorum vasorum.

De vesica ⁊ que circa eam dicuntur.



Is completis eleua renes: ⁊ vade excar-
nando vnum eorum vtridē vel am-
bos: ⁊ videbis q̄ terminantur ad vesi-
cam iuxta medium eius: ⁊ non est perio-
rans vesicam directe vno foramine ma-
gnos sed foraminibus magis parvis ⁊ obliquis: a
lateribus procedentibus inter tunicam ⁊ tunicas
vel inter tunicam ⁊ coopertorium. Et hoc fuit fa-
ctum vt quando vesica repleteretur vrina non rede-
at vrina ad renes: imo quanto plus impletur tanto
plus foramina illa clauduntur: q̄ paries vnus tu-
nice ad parietē alterius siue coopertorii applicat.
Scide ergo vesicam ⁊ videbis magnā eius conca-
uitatem q̄ nervosa est: ⁊ videbis eius collum carno-
sum ⁊ musculosum: vt tēporib⁹ determinatis quā-
do oīz: homo vult expellat vrinā: q̄ est necessa-
rium retinere: retineat eam. Et q̄ musculosum est
eius collum si incidat vesica in collo eius consoli-
dari pōt: si vō in fundo nō. Collū eius autē foratus
est foramine paruo p qd̄ emittit vrinā ad canalē vir-
ge: ⁊ extra egredit. Nam illud collū statim cōtinua-
tum est cū pputio virge vt potes videre: ⁊ sic ipsi⁹
vesice apparet locus: quantitas siue colligantia: nu-
merus: substantia ⁊ iuuamentū. Egritudines potest
partium generū vel modorū: vnam tñ patitur que
dicitur litalis: nam i concauitate eius potest gene-
rari lapsus ex humoribus mucilaginosus congrega-

tis in ea ⁊ condensatio a caliditate supflua. Et hic
lapis curatur cū dissoluentibus ipm vel p incisio-
nem. Nam hic lapis si tuato homine debite ne pos-
sit se mouere sedendo: oīz cum digito posito manū
⁊ cum manu alia posita sup femur cōduci ad collū
vesice ⁊ conductus ibi retinet: ⁊ postea oīz fieri inci-
sio in collo: ⁊ cum trabectorio violenter extrahis:
⁊ hec si lapis est magnus. si vero paruus q̄ possit
p canalē virge extrahi oīz p compressionem factam
cum digitis ex collo vesice conduci vsq; ad vir-
gam: si non egreditur cum trabectorio paruobē
bet educi.

**De virge continuatione: ⁊ que circa eam
narrantur.**



Vltimo vero est virga continuata cū col-
lo vesice carnosio continuato multis li-
gamentis ⁊ choridis: que oriuntur ab
osse pectinis: cuius nervus ortis a nucha
⁊ ideo valde sensibilis ⁊ extēibilis est:
cōtinuata est et cum maximis venis ⁊ arterijs or-
tis a vena descendente: ⁊ arteriā in loco vbi bifur-
catur ad duas anchas: q̄ ad linguam ⁊ etiam vir-
gam veniunt maiores vene ⁊ arterie q̄ ad aliud
membrum eiusdem quantitatis. Et ideo in locis pe-
riton inuolute sunt iste vene ⁊ arterie: ⁊ sunt magne
⁊ ibi est locus siue principium virge: ⁊ propter hoc
he vene sunt sicut radices virge: ⁊ propter istas vir-
ga est tota cauernosa: siue cauernositates replen-
tur ventositate generata in predictis arterijs: ⁊ q̄
ventositate replentur erigitur virga. Et vt melius
anothomiam eius videas: debes separare ossa fe-
moris: ⁊ eleuare virgam cum vesica: ⁊ in intestino
recto vel sine illis: ⁊ diuidere virgam per longitu-
dinem: vsq; ad eius canalē: ⁊ tunc in principio ei⁹
apparebunt duo foramina predicta: apparebunt
etiam cauernositates eius. Et ex his vides quanti-
tatem eius: quia quantitas siue longitudo eius est
vnus palmi: sicut longitudo colli matricis appa-
ret etiam substantia eius: q̄ nervosa est: preter ex-
tremitatem eius que vocatur prepucium. Apparet
etiam numerus partium eius: apparet positiō ⁊ col-
ligantia: figura vero oblonga: quia virga est in ho-
mine absoluta: ⁊ non applicata ventri: sicut i qua-
drupedibus: ⁊ causa fuit: q̄ homines in coeundo:
non coniunguntur fm dorales: sed amplexando:
⁊ si cum virga eleuasti intestinum vel extremitates
intestini recti: cuius anothomiam diximus supra:
tunc cognosce in illo intestino siue extremitate ei⁹:
que dī anus musculos mouentes siue aperientes
⁊ constringentes. Et considera quinq; venas emo-
roidales que in extremitate eius sunt magis pro-
funde: sicut in gbusdam periodis determinantur
aperiuntur: ⁊ sunt fluxus emoroidarum. Et in his
completa est anothomia membrorum naturalium
que in primo ventre continentur.

**De excoziatione medij ventris: ⁊ que circa
eā hunc dicuntur hic.**



Is expeditio incipe excoriare ventrem
mediū: vsq; ad pncipiū colli: q; vsq; ad
principium capitis sunt membra spiri-
tualia. Et nota q; sicut prius: ita iste h3
duplices partes scilicet partes continentes 7 mē-
bra contenta: membra continentia sunt membra
pectoris: 7 membra pectoris sunt duplices par-
tes. s. intrinsece 7 extrinsece. Exteriores quedā sunt
directe: 7 quedam laterales. directe sunt siue vocā-
tur partes furcule: 7 iste sunt due furcule. s. supe-
rior 7 inferior. laterales vero partes vocantur la-
tera pectoris dextrum. s. 7 sinistrum. Intrinsece au-
tem partes sunt quinq; s. cutis: pinguedo: que no-
te sunt mamille: muscoli: ossa: 7 cartilagines.

De mammillis 7 earum figuris 7c.



Mammillarum primo videas figuram:
quia figuram habent cucurbite 7 rotū-
dam: quia debent esse capaces sangui-
nis qui debet conuerti in lac. Item q;
vt ibi ponit Galie. sunt scuta cordis: 7 ideo debuit
habere figuram tutam a nocuentis: talis autē ē
rotunda. Habuerunt autem vt papillas fetus nu-
per natus posse sugere lac. Ex his secūdo videas
substantiam: quia ipse carnes habet glādosas: q;
sanguis superfluous bene decoctus in eis deb3 cō-
uerti in lac. 7 ista conuersio est per infrigidationē
eius: 7 ideo carnem habuerunt glandosam. Ter-
tio videas quantitatem: tamen primo scias q; i mu-
liere sunt maiores q; in viro: quia in muliere sunt
facte ppter duo. vnum est vt generēt lac. in viro au-
tem non. 7 ideo in muliere fuerunt magne. Item
in muliere sunt facte magne vt caliditatem quam
recipiunt a corde ad cor reducant reuerberando:
7 hoc est magis necessarium in mulieribus: q; mi-
nus habent de caliditate circa cor q; viri. Quarto
nota numerum: quia due fuerunt in homine sicut
in omni animali quod generat vnum vel duo. In
animalibus autem poligenes siue plura genera-
tibus plures sunt mamille. Quinto vide locum
7 colligantiam: primo locum: nam in homine sunt
situate in pectore: 7 in alijs animalibus non sunt
situate in pectore: 7 causa quare in alijs animalib;
non sunt situate in pectore est vna quam dat Gal.
capitulo p̄allegato: quia mamille sunt facte p-
pter generationem lactis. Lac autem generatur ex
superfluitate sanguinis bene digesti. multa tamen
quantitas talis superflui in alijs animalibus trā-
sit in cornibus seu in generationem cornuum 7 dē-
rium 7 huiusmodi. Aliam causam dat Aristotiles i
libro de partibus animalium: quia alia animalia
habent coelas. i. tibias anteriores quasi adinuices
complicatas: 7 ideo pectus habent strictum ppter
quod mamille eorum in pectore eorum non po-
tuerunt locari: 7 ideo habuerunt iuxta anchas po-
steriores. Si sint animalia generantia vnum tantus
vel dispersas per ventrem si generant plura: vt in
porcha 7 in cane. homo autem cum habeat pectus
latum habuit mamillas locatas in pectore: quia
cum hoc habuit iuuamenta. nam lac debet i eis ge-
nerari ex sanguine subtiliato: 7 bene digesto: meli-
or autē digestio fit circa pectus in mammillis ppter
calorem existentem in eis fortiorē: q; in omnib;

alijs partibus 7 ppter eandem causam natura oia
dinauit venas: que veniunt ad matricem: vt ibidez
dixit Gal. pcedere tortuose ad hoc vt sanguis con-
tinue subtilietur: 7 bene digeratur. Secundum lu-
uam entum fuit: quia sunt sicut scutum cordis 7 in
homine cor debet bene tueri: quia est sine pelle. Ter-
tium iuuamentum est: quia caliditatem siue calo-
rem recipiunt a membris spiritualibus: 7 receptū
reuerberant ad ipsum: sicut vestimentum: vt etiam
ibi ponit Gal. Et ex his apparet colligantia earū
q; ipse colligate sunt cum corde 7 epate per venam
ascendentem a qua iuxta furculam ramificantur
rami: qui descendunt supra dorsum: 7 inter costas tē-
dunt ad mamillas. Colligantur etiam cum ma-
trice medianibus venis que ascendunt a matrice
ad mamillas de quibus dictum est supra. Ex iu-
uamenti autem potes videre nocumenta.

De quadam v̄ra musculoꝝ 7 eoz meatib; 7c.



Post mammillas sunt muscoli: musculos
autem omnes pectoris in ano thomia
ista discernere non potes: 7 tamen nō
discernantur: q; sunt: tamē debes scire
q; istorum musculoꝝ quidam sunt tantum dila-
tantes: 7 quidam dilatantes 7 constringentes. Di-
latantes tantum sunt duo muscoli dyasfragmatis:
qui sunt in inferioribus pectoris: sunt et duo mus-
culi qui sunt in collo. s. dyasfragma dilatatur in par-
te inferiori: vbi ē spaciositas magna: sed illi qui sūt
in collo dilatant concavitatem superiorem que est
parua. Sunt etiam muscoli qui sunt in dorso vbi ē
origo costarum: 7 incipiunt iuxta originem prime
coste. Sūt 7 multi alij musculi parui. Musculi ve-
ro qui sunt dilatantes 7 constringentes sunt mus-
culi qui inter costas sunt locati: q; iter quaslib; du-
as costas sunt duo muscoli: quoz vnus hab3 vlti-
los longitudinales: 7 alius transuersales. Post mus-
culos sunt ossa. Ossa autem pectoris fuerunt plu-
ra 7 non vnum continuum: vt possit dilatari 7 con-
stringi: nam debet esse in continuo motu. Sed ad
motum localem 7 voluntarium requiruntur mus-
culi mouentes 7 requiruntur ossa que sunt susten-
taculum morionum. Et hec est causa quare iste v̄-
ter non fuit tantum musculosus vt primus: nec tā-
tum ossuosus vt vltimus. Ista ergo ossa fuerūt du-
plicia. s. coste 7 ossa thoracis. Coste sunt duodecim
Septem verē: 7 quinq; mendose. Vere sunt que cū
ossibus thoracis sunt continuate ad cooperiēdus
7 complendum pectus. Et causa quare vna costa
non attingit alteram in extremitatibus: 7 est illa
que dicta est: vt pectus possit melius dilatari 7 cō-
stringi: ossa tamen thoracis sunt septem continua-
ta septem costis veris. Inter tantē ista ossa 7 co-
stas sunt cartilagines continuantes vnū cum alio.
Et ex his autem cartilaginibus cum ossibus suis
componitur vnum membrum quod vocatur furcu-
la pectoris: quia ad modum furcule est bifurcata
7 figurata: 7 in extremitate eius directa est quedā
scutalis cartilago vocata pomū granatū. facta ad
custodiēdū os stomachi. a latēb; autē i costis mē-
dosis sūt cartilagines: vt mollis cū duro melior fiat
piūctio: verū ē q; oia ista meli⁹ apparebūt si cū dā
pect⁹: vbi sunt teneritates costaz: 7 a latere dextro

7 sinistro: 7 tunc apparebunt tibi oia que sunt iteri.
De panniculis pectoris.

Membra autē p̄tenta in pectore sunt p̄n-
niculi: cor 7 pulmo: 7 orta ab eis. pan-
niculi autē sunt tres. s. mediastinus qui
diuidit cōcavitatē pectoris per mediū
ab anteriori ad posterius: p̄pterea diuidit pulmo-
nes per mediū. Et iste panniculus nō est neruosus
nec p̄tinuus 7 verexynus vt alij. Et iste ē factus p̄-
pter iuuamentū cōe. s. vt si nocita fuerit p̄s dextra
vel sinistra pulmonis non cōcitet nocumētū alteri
parti: factus ē etiā vt suspendat pulmonē ad pect̄
Item ē factus vt si p̄pter cām aliquā fiat empi-
ma: hoc ē q̄ aggreget sanies in pectore: vt illa sa-
nies nō regurgitet ad aliā ptem: postea ē pleura.
Pleura autē ē panniculus substātia durus 7 neruo-
sus: in q̄titate magnus: cooperiens oēs costas i-
terius: ideo colligantiam h̄z cū oibus membris
p̄tentis in p̄cavitatē pectoris. ¶ Iuuamēta sunt co-
operire membra p̄dicta: 7 vt ab ipso panniculi
p̄dictorū membrorū ortū habeant: vt ponit Auic.
Sen. prima. p̄mi can. cap̄lo de membris. Passio-
nes oīum modorū 7 generū pōt pati: maxime tamē
pati passiones apostemosa: que vocatur pleure-
sis: verum ē q̄ pleuresis ē duplex. s. vera. 7 nō vera.
Non vera est illa que fit in musculis qui sunt intra
costas cuius acumen ē versus cutim extrinsecas.
Vera fit in hoc panniculo: 7 ex substātia eius potes
videre q̄ illud apostema: vt plurimū est colericus
p̄pter q̄d ipsum p̄sequit febris acuta: febris ratioe
loci p̄sequit: q̄ p̄pinquius 7 vicini cor di fit febris
illa acuta ratione humoris calidi. Uide etiā q̄ ad
tale apostema p̄pter sensibilitatez panniculi conse-
quit̄ dolor p̄ngitinus 7 lateris: q̄ huic pannicu-
lo attrahunt̄ magis latera q̄ pars anterior: sed p̄s
anterior magis app̄piatur panniculo mediastino
7 p̄pterea dolor p̄sequens per pleumonias est an-
terior: iste lateralis. fit etiā q̄ comprimit pulmo-
nes: 7 impedit dilationez eius malicia anhelitus:
tussis sequit̄ tunc: q̄ eminentia apostematis stimu-
lat 7 aliqua virulentia 7 erugo que emanat ab hoc
apostemate per porositates panniculi: hec est cā
quare in pleuresi fit creatus in principio rubens:
postea albus: aut faniosus s̄m q̄ materia matura-
tur. Et ideo apparēt in principio subrubens icho-
anem abbreviat: vt ponit Ipo. p̄mo amfosismo-
rum: paroxismos 7 consistentias. 7 cā est: q̄ tunc si-
gnificat q̄ materia ē subtilis: panniculus est ratus
7 q̄ virtus est fortis. quomodo autē ista materia vi-
rulenta 7 faniosa per pulmonē expellatur 7 screa-
tus in anothomia pulmonis declarabitur. Tertiū
panniculus est dyasfragma qui potest etiā dici mus-
culus: eius situs in corpore est in fine pectoris: 7 co-
staz altius existens in parte anteriori q̄ posteriori.
Nam q̄tum ad partem eius carnosam ē conti-
nuatum cum cartilaginibus costaz mendosarū.
Et in parte posteriori cum spondili duodecima ex
spondilibus renū: 7 eius vtilitas fuit ex situ eius.
p̄mo vt diuideret spūalia a naturalibus: ne a ci-
bo hora digestiōis a fece vapores eleuati perue-
nirent ad membra spūalia: q̄ impedirent mentez
7 rōnem. Et ex hoc satis apparent: q̄ q̄n egritudi-
nem pati: vt apostema leditur mens: ideo alio no-

mine vocatur ē enfrenus: q̄ frenum est mentis: si-
cut vocatum est dyazonona ab Aristotile: q̄ zona
zingens p̄ medium: nō q̄ directē latitudinaliter ci-
gat. sed oblique: vt dictū ē: 7 cā sine vtilitas huius
obliquitatis fuit illud q̄d dictū fuit cap̄lo de ano-
thomia mirach: q̄ ex hoc cū mirach cōprimuntur
hora compulsionis supfluitates in intestinis ac si
esset inter assides torcularis cuiusdam. Quantū
vero ad ptem mediā eius: que est neruosa 7 panni-
culosa colligatum est cū pulmone: vt ipm moueat
motu anhelitus medianibus neruis: q̄ ad ipm ve-
niunt a cerebro 7 mucha. Et ex hoc apparet quare
diuersificatum est dyasfragma ab alijs musculis: q̄
alij muscoli in loco vbi ossib⁹ applicant̄ sunt cho-
dosi: 7 in alijs carnosi. dyasfragma vero est econtra-
rio. cā est: q̄ dyasfragma p̄ncipaliter h̄z mouere pul-
monem 7 nō costas: nunc autē oīs musculus q̄tum
ad chordaz eius v̄z esse p̄tinuatius cum membro
quo v̄z mouere: 7 cum alio q̄tum ad ptem eius car-
nosam. Et ex his apparet q̄ sit figura eius: q̄ rotū-
da oblonga. apparet etiā que sit substātia eius: q̄
musculosa 7 chondrosa: apparet etiā q̄tita eius.
¶ Iuuamenta sunt tria que declarata patent ex di-
ctis. Primum est vt sit p̄ncipiū motus anhelit⁹.
Secundum est vt diuidat inter membra spūalia et
naturalia. Tertius est vt iuuat intestina 7 mirach ad
expellendum: que in intestinis sunt contenta. Et ex
secundo iuuamento apparet q̄ ad apostema eius
sequitur alienatio mentis: sicut ad frenesiz. Signa
distinctiua perquire a Salie. quito de interiorib⁹.
capitulo de passionibus dyasfragmatis.

De corde 7 operatione eius.

Cor in cuius medio existit cor velatum
pennulis pulmonis: vt ab ipso aere at-
tracto tefrigeretur calor 7 spiritus q̄
eo generatur: 7 temperetur cui⁹ cordis p̄mo ap-
paret situs 7 locus: q̄ est in medio anterioris 7 po-
sterioris dextri 7 sinistri q̄tum ad cuspidē eius de-
clinās versus sinistrum: q̄tum vero ad radicez ei⁹
versus dextrum: vt possit bene insufflare calorez
et spiritum versus dexteram partem: que calidi-
or esse debuit sinistra. Est etiam in medio su-
perioris 7 inferioris amotis 7 extremis: sic fuit lo-
catum: quia sicut princeps 7 p̄ma radix omnium
membrorum. Que sit colligantia eius consequen-
ter apparebit sicut apparebit q̄tita eius: q̄ non
nimis magnum neq̄ paruum: maius tamen est in
homine q̄ in aliquo alio animali eiusdem q̄tita-
tis: quia plus habet de calore in q̄to: sicut figura
tibi apparebit: q̄ est figure pinealis vel piramida-
lis: q̄ huiusmodi figure debet esse omne quod est
excedentis caliditatis: q̄ propria figura p̄mi ca-
lidi est figura pyramidalis. Et etiam alia ratio: vi-
sicio ventriculorum eius 7 ortorū ab ipso. Quar-
to debes videre numez partium eius: 7 ex hoc ti-
bi apparebit que sit substātia ei⁹: 7 cōplexio 7 iuu-
mētum. Numerus x̄o partiū ei⁹ est: q̄ p̄tium eius
q̄dā sunt extra substātia ei⁹. Quedā x̄o sunt d̄ sub-
stātia ei⁹. Extra substātia ei⁹ sūt casula cordis: 7 or-
ta ab eo: que postea apparebūt. Casula ei⁹ neruea
sue pellicularis est dilatata multū: facta ad tuēdū



Is expeditis incipe excoziare ventrem mediū: vsq; ad pncipiū colli: q; vsq; ad pncipiū capitis sunt membra spiritalia. Et nota q; sicut prius: ita iste h3 duplices partes scilicet partes continentes 7 mēbra contenta: membra continentia sunt membra pectoris: 7 membra pectoris sunt duplices partes. scilicet intrinsece 7 extrinsece. Exteriores quedā sunt directe: 7 quedam laterales. directe sunt siue vocantur partes furcule: 7 iste sunt due furcule. scilicet superior 7 inferior. laterales vero partes vocantur latera pectoris dextrum. scilicet 7 sinistrum. Intrinsece autem partes sunt quinque. scilicet cutis: pinguedo: que nō te sunt mamille: musculi: ossa: 7 cartilagines.

De mammillis 7 earum figuris 7c.



Mammillarum primo videas figuram: quia figuram habent cucurbitę 7 rotundam: quia debent esse capaces sanguinis qui debet conuerti in lac. Item q; ut ibi ponit Salie. sunt scuta cordis: 7 ideo debuit habere figuram tutam a nocumentis: talis autem ē rotunda. Habuerunt autem ut papillas fetus nuper natus posse sugere lac. Ex his secūdo videas substantiam: quia ipse carnes habet glādosas: q; sanguis superfluous bene decoctus in eis debz cōuerti in lac. 7 ista conuersio est per infriagationez eius: 7 ideo carnem habuerunt glandosam. Tercio videas quantitatem: tamen primo scias q; i muliere sunt maiores q; in viro: quia in muliere sunt facie ppter duo. vnum est ut generet lac. in viro autem non. 7 ideo in muliere fuerunt magne. Item in muliere sunt facie magne vt caliditatem quam recipiunt a corde ad cor reducant reuerberando: 7 hoc est magis necessarium in mulieribus: q; minus habent de caliditate circa cor q; viri. Quarto nota numerum: quia due fuerunt in homine sicut in omni animali quod generat vnum vel duo. In animalibus autem poligenes siue plura generantibus plures sunt mamille. Quinto vide locum 7 colligantiam: primo locum: nam in homine sunt situate in pectore: in alijs animalibus non sunt situate in pectore: causa quare in alijs animalib; non sunt situate in pectore est vna quam dat Sal. capitulo pzeallegato: quia mamille sunt facie ppter generationem lactis. Lac autem generatur ex superfluitate sanguinis bene digesti. multa tamen quantitas talis superflui in alijs animalibus trāsit in cornibus seu in generationem cornuum 7 dēritium 7 huiusmodi. Aliam causam dat Aristotiles i libro de partibus animalium: quia alia animalia habent coeas. i. tibias anteriores quasi adinuices complicatas: 7 ideo pectus habent strictum ppter quod mamille eorum in pectore eorum non potuerunt locari: 7 ideo habuerunt iuxta anchas posteriores. Si sint animalia generantia vnum tantum vel dispersas per ventrem si generant: plura: vt in porcha 7 in cane. homo autem cum habeat pectus latum habuit mamillas locatas in pectore: quia cum hoc habuit iuuamenta. nam lac debet i eis generari ex sanguine subtiliato: 7 bene digesto: melior autem digestio fit circa pectus in mamillis ppter calorem existentem in eis fortiozem: q; in omnib;

alijs partibus 7 ppter eandem causam natura ordinauit venas: que veniunt ad matricem: vt ibidem dixit Sal. pcedere tortuose ad hoc vt sanguis continue subtilietur: 7 bene digeratur. Secundum iuuamentum fuit: quia sunt sicut scutum cordis 7 in homine cor debet bene tueri: quia est sine pelle. Tertium iuuamentum est: quia caliditatem siue calorem recipiunt a membris spiritualibus: 7 receptū reuerberant ad ipsum: sicut vestimentum: vt etiam ibi ponit Salie. Et ex his apparet colligantia earū q; ipse colligate sunt cum corde 7 epate per venam ascendentem a qua iuxta furculam ramificantur rami: qui descendunt supra dorsū: 7 inter costas tendunt ad mammillas. Colligantur etiam cum matrice medianibus venis que ascendunt a matrice ad mammillas de quibus dictum est supra. Ex iuuamenti autem potes videre nocumenta.

De quadam dīa muscutorū 7 eoz meatib; 7c.



Post mammillas sunt musculi: musculos autem omnes pectoris in anothomia ista discernere non potes: 7 tamen nō discernantur: q; sunt: tamē debes scire q; istorum muscutorum quidam sunt tantum dilatantes: 7 quidam dilatantes 7 constringentes. Dilatantes tantum sunt duo musculi dyaphragmatis: qui sunt in inferioribus pectoris: sunt et duo musculi qui sunt in collo. dyaphragma dilatatur in parte inferiori: vbi ē spaciositas magna: sed illi qui sūt in collo dilatant concauitatem superioriē que est parua. Sunt etiam musculi qui sunt in dorso vbi ē origo costarum: 7 incipiunt iuxta originem prime coste. Sūt 7 multi alij musculi parui. Musculi vero qui sunt dilatantes 7 constringentes sunt musculi qui inter costas sunt locati: q; iter quilibz duas costas sunt duo musculi: quorum vnus habz vtilos longitudinales: 7 alius transversales. Post musculos sunt ossa. Ossa autem pectoris fuerunt plura 7 non vnum continuum: vt possit dilatari 7 constringi: nam debet esse in continuo motu. Sed ad motum localem 7 voluntarium requiruntur musculi mouentes 7 requiruntur ossa que sunt sustentaculum motionum. Et hec est causa quare iste vter non fuit tantum musculosus vt primus: nec tantum ossuosus vt vltimus. Ista ergo ossa fuerūt duplicia. scilicet coste 7 ossa thoracis. Coste sunt duodecim Septeni vere: 7 quinque mendose. Vere sunt quę cū ossibus thoracis sunt continuate ad cooperiēdū 7 complendum pectus. Et causa quare vna costa non attingit alteram in extremitatibus: 7 est illa que dicta est: vt pectus possit melius dilatari 7 constringi: ossa tamen thoracis sunt septeni continuata septem costis veris. Intertamen ista ossa 7 costas sunt cartilagines continuantes vnū cum alio. Et ex his autem cartilaginibus cum ossibus suis componitur vnum membrum quod vocatur furcula pectoris: quia ad modum furcule est bifurcata 7 figurata: 7 in extremitate eius directa est quedā scutalis cartilago vocata pomū granatū. facta ad custodiēdū os stomachi a laterib; aut i costis mēdosis sūt cartilagines: vt mollis cū duro melior fiat pūctio: verū ē q; oia ista melius apparebūt si icidat pectus: vbi sunt teneritates costarū: a latere dextro

4 dypoll

et sinistro: et tunc apparebunt tibi omnia que sunt ibi.
De panniculis pectoris.

Membra autem contenta in pectore sunt panniculi: cor et pulmo: et orta ab eis. panniculi autem sunt tres. scilicet mediastinus qui diuidit concavitatem pectoris per medium ab anteriori ad posterius: propterea diuidit pulmones per medium. Et iste panniculus non est nervosus nec continuus et verum unus ut alij. Et iste est factus propter iuuamentum corde. scilicet ut si nocita fuerit pars dextra vel sinistra pulmonis non concitet nocuentium alteri parti: factus est etiam ut suspendat pulmonem ad pectus. Item est factus ut si propter causam aliquam fiat emphysema: hoc est quod aggreget sanies in pectore: ut illa sanies non regurgitet ad aliam partem: postea est pleura. Pleura autem est panniculus substantia durus et nervosus: in quantitate magnus: cooperiens omnes costas interius: et ideo colligantiam habet cum omnibus membris contentis in concavitate pectoris. **I**uuamenta sunt cooperire membra predicta: et ut ab ipso panniculi predictorum membrorum ortum habeant: ut ponit Aulic. Sen. prima. primi canon. capitulo de membris. Passiones omnium modorum et generum potest pati maxime tamē patitur passiones apostematosas que vocatur pleuresis: verum est quod pleuresis est duplex. scilicet vera. et non vera. Non vera est illa que fit in musculis qui sunt intra costas cuius acumen est versus cutim extrinsecam. Vera fit in hoc panniculo: et ex substantia eius potest videre quod illud apostema: ut plurimum est colericum propter quod ipsum persequitur febres acuta: febribus ratione loci persequitur: quod propter inquit et vicini? cordi fit febris illa acuta ratione humoris calidi. Uide etiam quod ad tale apostema propter sensibilitatem panniculi consequitur dolor pungitius et lateris: quod huic panniculo attrahunt magis latera quam pars anterior: sed pars anterior magis appropriatur panniculo mediastino et propterea dolor persequens peripneumoniam est anterior: iste lateralis fit etiam quod comprimit pulmonem: et impedit dilationem eius malicia anhelitus: tussis sequitur tunc: quod eminentia apostematis stimulat et aliqua virulencia et erugo que emanat ab hoc apostemate per porositates panniculi: et hec est causa quare in pleuresi fit creatus in principio rubeus: postea albus: aut saniosus secundum quod materia maturatur. Et ideo apparet in principio subrubeus ichor: autem abbreviat: ut ponit Ipo. primo amonismo: rum: paroxysmos et consistentias. et causa est: quod tunc significat quod materia est subtilis: panniculus est rarus et quod virtus est fortis. quomodo autem ista materia virulenta et saniosa per pulmonem expellatur et creatus in anothomia pulmonis declarabitur. Tercio panniculus est dyaphragma qui potest etiam dici musculus: eius situs in corpore est in fine pectoris: et costarum altius existens in parte anteriori quam posteriori. Nam quantum ad partem eius carnosam est continuatum cum cartilaginibus costarum mendostrarum. Et in parte posteriori cum spondili duodecima ex spondilibus renum: et eius utilitas fuit ex situ eius. Primo ut diuideret spiritualia a naturalibus: ne a cibo hora digestio et a fece vapores elevati pervenirent ad membra spiritualia: quod impedirent mentem et rationem. Et ex hoc satis apparet: quod quia egritudine pati: ut apostema leditur mens: ideo ratio non

mine vocatur est eufrenus: quod frenum est mentis: si autem vocatum est dyazonona ab Aristotile: quod zona tingens per medium: non quod directe latitudinaliter circumgatur. sed oblique: ut dicitur: et causa siue utilitas huius obliquitatis fuit illud quod dicitur fuit capitulo de anothomia mirach: quod ex hoc cum mirach comprimuntur hora compulsionis supfluitates in intestinis ac si esset inter assides torcularis cuiusdam. Quantum vero ad partem mediam eius: que est nervosa et panniculosa colligatum est cum pulmone: ut ipsum moueat motu anhelitus medianibus nervis: quod ad ipsum veniunt a cerebro et nucha. Et ex hoc apparet quare diuersificatum est dyaphragma ab alijs musculis: quod alij musculi in loco ubi ossibus applicantur sunt chordosi: et in alijs carnosii. dyaphragma vero est econtrario. causa est: quod dyaphragma principaliter habet mouere pulmonem et non costas: nunc autem omnis musculus quantum ad chordas eius debet esse prunatiuus cum membro quo debet mouere: et cum alio quantum ad partem eius carnosam. Et ex his apparet quod sit figura eius: quod rotunda oblonga. apparet etiam que sit substantia eius: quod musculosa et chondrosa: apparet etiam quantitas eius. **I**uuamenta sunt tria que declarata patent ex dictis. Primum est ut sit principium motus anhelitus. Secundum est ut diuidat inter membra spiritualia et naturalia. Tercium est ut iuuat intestina et mirach ad expellendum: que in intestinis sunt contenta. Et ex secundo iuuamento apparet quod ad apostema eius sequitur alienatio mentis: sicut ad frenesim. Signa distinctiua perquire a Hali. quinto de interioribus. capitulo de passionibus dyaphragmatis.

De corde et operatione eius.

Elevatis panniculis apparebit tibi pulmo in cuius medio existit cor velatum pennulis pulmonis: ut ab ipso aere attracto refrigeretur calor et spiritus qui eo generatur: et temperetur cuius cordis primo apparet situs et locus: quod est in medio anterioris et posterioris dextri et sinistri quantum ad cuspides eius declinans versus sinistram: quantum vero ad radices eius versus dextrum: ut possit bene insufflare calorem et spiritum versus dexteram partem: que calidior esse debuit sinistra. Est etiam in medio superioris et inferioris amotis et extremis: et sic fuit locatum: quia sicut princeps et prima radix omnium membrorum. Que sit colligantia eius consequenter apparebit sicut apparebit quantitas eius: quod non nimis magnum neque paruum: maius tamen est in homine quam in aliquo alio animali eiusdem quantitate: quia plus habet de calore in quanto: sicut figura tibi apparebit: quod est figure pinealis vel pyramidalis: quod huiusmodi figure debet esse omne quod est excedentis caliditatis: quod propria figura primi calidi est figura pyramidalis. Et etiam alia ratio: distictio ventriculorum eius et ortorum ab ipso. Quarta debes videre numerum partium eius: et ex hoc tibi apparebit que sit substantia eius: et complexio et iuuamentum. Numerus vero partium eius est: quod primum eius quodam sunt extra substantiam eius. Quedam vero sunt in substantia eius. Extra substantiam eius sunt calula cordis: et orta ab eoque postea apparebunt. Calula eius nervosa siue pellicularis est dilatata multum: facta ad tuendum

cora nociuis: et ne contrahatur ab alijs membris in hora sue expansionis. Et cā quare non est continua cum corde fuit ne cor in sui motu impediret ppter aggregatōem. fuit etiā alia cā vt contineret quādam aquositate: qua humectaret cor: et roza- ret ne ppter supflūū et continuū ei⁹ motum exicaref. et ideo semp in hac casula repitur aquositas: et ideo si exicaref hec casula vel priuaf tali aquositate ad mariscū deuenit: sicut si sit supflua in iectigantiaz et tremorem et tardiacā passionem cadit cor: vt ponit Gal. qnto de inferiorib⁹ caplo. ij. ptes aut essen- tiales cordis: quedam sunt extrinsece: quedā intrin- sece. Extrinsece sunt pinguedo additamēta cordis: siue auricule cordis: et orta ab eo pinguedo statim apparet in superficie exteriori cordis ppter fines po- tius q̄ existat ex parte agentis: q̄ pinguedo gene- ratur a frigido aut calido diminuto. cor aut cali- dissimū: sed generata est ppter finem: vt cor ppter vehemētē et continuū motum non excecetur. Ad- ditamēta cordis sunt q̄dam ptes pellicularē: apte ad dilatādū et restringēdū: genite ad hoc: vt qñ in corpe nro generat multū de sanguine vel d̄ spi- ritu in ventriculo sinistro dilatef: vt contineant san- guinem multū vel spūm multū q̄ interdū generat. Sed tu obides sicut obijcit Gal. loco pallegato. Quare natura non fecit cor ita magnū q̄ posset continere omnem multitudinem sanguis et spūs: s̄ fecit illa additamenta: dico q̄ causa fuit: quia si cor fuisset valde magnū esset cā debilitatis virtutis ppter dispersionē spiritus: Et ppterea aialia que ha- bent corda magna sunt timida: vt lepus et ceruus. Secūda causa fuit: q̄ cum non semp generef in no- bis multa quātitas spiritus et etiam sanguinis cum cor fuisset magnū: vt plurimū concauitas cordis extindisset vacua: sed q̄ iste auricule pñt faciliter cō- trahi qñ non sunt replere: ibi nō erit vacuitas. Itē- cuitas pōderositas. Que aut sit orta a corde sub- sequenter apparebit. partes aut intrinsece cordis sunt ventriculi cordis: dexter. s. et sinister et medi⁹. Scinde igit cor primo in pte dextra et incipe a cu- spide ei⁹: sic q̄ alium parietem non tangas: sed a latere ventriculi medij oīuidas: et tunc occurret ti- bi statim vētriculus dexter: et videbis in eo duo ozi- ficia: quoz vnus est versus epatē: et est ozificium per quod ingredit vena chilis: et est ozificiū maximū: q̄ p hoc ozificiū cor trahit sanguinem ab epate: et spm expellit ad oīa alia mēbra: et q̄ p istud ozifici- um h̄ plus trahere q̄ expellere: ordinauit natura vt clauderet hora cōstrictionis: qñ d̄ expellere: et aperire qñ cor dilatatur et attrahit tria hostilia: que apertūf ab extra ad intra: et q̄ p idē ozificiū sit et expulsio sanguinis pfecte decocti: et h̄ non totus expellatur: q̄ aliqua portio eius expellitur ad pul- monem: alia p̄ eius transit in spiritum: ordinauit natura ne illa hostilia essent multum depressa: et vt pfecta clausione nō claudaf. Nota tamē duo. Pri- mo q̄ sensus tibi declarat q̄ vena chilis h̄ origi- nem suam corde: q̄ cū substantia cordis est conti- nua: et spm nō ptransit: est maxima iuxta cor sicut stirps arboris. Et scdo aduerte q̄ ab ista vena an- te q̄ concauitatem cordis ingrediat oritur vena q̄ circūcūctā radicem cordis circulat et ab ea oriunt rami dispersi per substantiam cordis: et ex hac vena nutritur cor. i. ex sanguine huius vene: postea vero

versus pulmonem est aliud ozificium verse arteria- lis que portat sanguinem ad pulmonem a corde: q̄ cum pulmo deseruiat cordi s̄m modum dictum vt ei recompēset: cor ei trāsmittit sanguinem: p hāc venam: que vocaf vena arterialis: quia portat san- guinem arterialē: q̄ habet duas tunicas: et habuit duas tunicas. primo q̄ vadit ad mēbrū q̄ exi- stit in continuo motu: et secundo q̄ portat sangui- nem valde subtilem et colericum: vt igitur non eua- poret: et vt nō scindatur hec vena: ipsa habet duas tunicas quare est dicta vena arterialis: et in ozificio isto vel istius vene sunt tria hostilia que aperiuntur ab intra ad extra: et clauduntur ab extra ad intra perfecta clausione: quia per hoc ozificium cor t̄- tum d̄ expellere a se hora cōstrictionis: et non d̄ retrahere aliqd hora dilatationis. Hoc viso scide ventriculum sinistrum: ita q̄ in medio remaneat ptes in quo est ventriculus medius: et tunc statim tibi apparebit concauitas ventriculi sinistri cui⁹ ptes est densior et spissior pariete ventriculi dextri. Et hoc fecit natura ppter tria. Primo q̄ hic ventri- culus d̄ continere spiritū. dexter vero sanguinem: sanguis aut grauior est spiritu ppter q̄d rōne con- tentoz plus aggrauaret pars dextra q̄ sinistra: et ideo cor nō fuisset equalis stature: vt illa esset eq̄- lis ponderis fecit parietem sinistram grossiorem: vt recompēset sua grauitate grauitati sanguis. Alia causa est q̄ d̄ continere spūs: q̄ facile est reso- lubilis. Ut igitur nō resoluaf paries fuit spissus. Tercia cā ē: q̄ hic ventriculus generare d̄ spūm ex sanguine. spūs aut generatur ex sanguine a for- ti caliditate subtiliante: et euaporante. fortior autē est caliditas: qñ est in mā: et subo densiori quare pa- rietes hui⁹ vētriculi sunt spissus et densus. In conca- uitate autē eius circa radicē sunt duo ozificia: vnum est ozificium arterie adorti q̄ d̄ adorti: q̄ imediate a corde orta: vel q̄ est pncipiū ozigis oīum arte- riaz q̄ sunt in corpe: et p istā trāsmittit cor spūm su- pra sanguinē in ipso generat ad oīa mēbra: qñ cō- stringitur: et ppterea ordinauit pncipio istius ozi- ficij tria hostiola densa valde que pfecta clausione clauduntur ab extra ad intus: et apiuntur ab intus ad extra: et ozificium hoc est valde pfundum. Aliud ē ozificium arterie venalis q̄ d̄ arteria: q̄ vaporem portat. d̄ venalis q̄ tñ h̄ vna tunicā: q̄ natura nō fuit multum sollicita de custodia ei⁹ q̄ per ipsas trāsit q̄d est vapor capinosus vel aer q̄ attrahit cor a pulmone: et q̄ p istā venā cor attrahit et expellit nā i ozificio: hic posuit tñ duo hostiola: que perfecta clausione nō clauduntur. Et sunt hostiola ista mul- tum eleuata: vt apodient parietē cordis qñ expel- lit et trāsmittit spūm ne p ipsum spiritus expella- tur. Et ista sunt mirabilia opera nature sicut mira- bile est opus ventriculi medij. Naziste vētriculus nō ē vna cōcauitas: sed ē plures cōcauitates pue- late magis in parte dextra q̄ in sinistra ad hoc: vt sanguis q̄ vadit ad ventriculum sinistrū a dextro: cū debeat fieri spūs cōtinue subtiliē: q̄ subtiliatio eius est preparatio ad generationē spūs: et natura trāsmittēdo aliqd p mēbra vel viam aliquā nūq̄ trāsmittit illud ociose: sed pparādo illd ad formā quā d̄ suscipere: vt frequenter ponit Gal. in libro de iuuamentis: vt in qnto de venis miseratis. Et hoc de partibus substantialibus cordis. Alie sunt

partes: que sunt oris: et illa sunt quattuor. scilicet. vena chilis: vena arterialis: arteria ad os: et arteria venalis. Et duo vadunt ad pulmonem: cuius anothomiam statim videas.

¶ De pulmonis substantia et numero partium eius et ex quot vasis componitur.



Pulmonis aliquantulum apparere potest substantia pulmonis et numerus partium eius: nam ipse compositus est ex triplici vase: ex carne molli et panniculis: et vase triplici. scilicet. ex vena arteriali: que oritur ex dextro ventriculo cordis: que portat sanguinem nutritum pulmonem. Secundo ex arteria venali que oritur ex sinistro ventriculo portans vapores capinosos ad pulmonem: et apporans aere ad cor a pulmone. Tertio et trachea arteria: que ad pulmonem portat aerem: et ab ipso ad extra ducit: et hec vasa perveniunt omnia in hoc quod primo quando ad pulmonem evenerit in duos ramos dividuntur. Unus vadit ad partem dextram eius: alter ad sinistram. Et quilibet eorum iterum dividitur in duos ramos magnos: quorum unus vadit ad partem superiorem pulmonis: et alter ad partem inferiorem: postea omnes vadunt se dividendo usque ad ramos capillares et minimos et ad invicem continuantur et interturbantur sicut rete: et componunt sicut rete substantiam pulmonis: sicut vene hepatis substantiam eius: et scias quod rami trachee arterie sunt iuxta ramos vene arteriales: ut videntur ab ea et iuxta ramos arterie venalis ut aeres transmittant ad arterias venales: ut cum portet ad cor: et a corde ducat ad arterias tracheas. Iste tamen vie vel rami qui sunt inter has sunt ita stricti ut sint inuij sanguis: et pulvis aeris intrati et exeat: et ideo si dilatant superflue potest fieri exitus sanguinis sine ruptura a pulmone. Concauitates et vacuitates huius retis replet caro mollis ipsius pulmonis: et hec est pars secunda eius. Tertia vero pars eius est panniculus eius rarus: ad quem terminantur orificia horum vasorum: verum est quod orificia vasorum trachee arterie sunt maiora orificiis aliorum vasorum et aptiora. Primo quia ora sunt ex stipite maiori et latiori. Secundo quia sunt cartilaginosa et non pelliculosa: et ideo cum sint duriora magis possunt stare aperta. Et ex his nota ulterius via per quam a pectore ad pulmonem et tracheam arteriam expellitur creatus vel sanies siue sanguis emanans a pectore: ut in pleuresi vel a concavitate eius: ut in emothoica passione et empima: et quia quando materia in his locis est congregata ipsa dividitur ad minima: et ex fortitudine pectoris expellitur ad pulmonem quando pulmo dilatatur orificia trachee arterie magis aperiuntur: et pilla expugat materiam predictam: et non paria orificia aliorum vasorum: quia non sic sunt lata: neque dilatant ora anhelitus et tunc ex vasio illis ille humor vel liquor expellitur ad vias latiores. Et ex illis ad minores donec ad originem perveniat canne pulmonis: et tunc cum tussis extra expellitur: et tussis est adiuuat ad penetrandum hunc catarrum in canales iam dictos. Et ex his apparet quod expurgatur hec materia: et dato quod non perveniat ad cor: sed si expurgaretur per alia duo vasa bene de necessitate pervenit ad cor. Hec omnia habet a Galieno quanto de interioribus capitulo. item. sic igitur pars numerus partium integrantium pulmonem. Partes eius quantitate sunt quatuor. scilicet. due in parte sinistra et tres in dextra: quarum tertia dicitur pomum granatum siue

culcitra: quia super ipsam sedet vena chilis: et arteria indirecto cordis in loco ubi vena ascendit ad cor: et ex hoc potes videre quantitates pulmonis: quia si sit parvus non inflatus: si tamen inflando ipsum inflaveris videbis ipsum magnificari: maior tamen est quantitas eius in dextra quam sinistra. quia in sinistra est color locatum ibi occupans locum. Figura eius pars: quia ad figuram elibani figuratus est: in parte posteriori longior et habet magnitudines quam anteriori eius: colligantia pars ex predictis. Et iuamentum et egritudines eius satis sunt note: nisi quod debes et corticare ramos trachee arterie: et videre annulos rotundos: quos expuit peripleumonius vel pueri: quia illi sunt rotundi: sed habens vlcus in cana pulmonis (de cuius anothomia statim persequendum) non expuit annulos: sed cortices: et si annulos expueret non tamen rotundos cuius causa dicemus.

¶ De anothomia trachee arterie etc.



Predicta anothomia pulmonis: oritur videtur anothomia trachee arterie que est via ad pulmonem: sed ut eius anothomiam videas perfecte oportet promittere anothomiam quorundam que cum ea colligantia habet. Oportet igitur ut excarnes collum siue gulam et videbis musculos longitudinales super ipsam quos notabis venas quidem ex utroque latere unam quod fuit iuamentum horum dicitur in anothomia pectoris. Illis elevatis invenias duas amigdalas ex utroque latere unam que sunt carnes glandose facte ad formam et figuram duarum amigdalarum: quarum iuamentum fuit ut humiditatem quam generant et congregant humectet tracheam ne exerceatur propter motum. Secundo iuamentum fuit ut repleret et equarent locum gule: quia gula propter epiglottum in parte superiori est valde tumida: et in parte inferiori propter stricturam trachee est valde gracilis. Amigdale igitur ille posite sunt infra epiglottum ut adequet. Tertium iuamentum est ut sint scutum venarum et arteriarum appoplecticarum: que portant sanguinem ad caput et arterie portant spiritum: qui postea in rete quod preterunt conflato sub cerebro fit animalis: et iste vene vocantur appoplectice: quia ex plenitudine earum frequenter fit appoplexia. Vocatur etiam vena somni: quia ex naturali opilatione facta in rete iam dicto causatur somnus. Vocantur etiam profundae: quia sunt locate in profundo iuxta siue super musculos spondilium colli. Et ut eius originem videas scinde furculam et accipe truncum arterie ad os ascendentem et vene ascendentis. Et videbis quod antequam egrediatur furculam ramificatur. Primo in duos ramos quorum unus vadit ad partem sinistram: et alter ad dextram: et ante quam ad subassellam perveniant alter istorum vel ab alterutro descendet vena per spondiles dorsum ad nutriendum octo costas: et partes superiores pectoris: postea penetrat per assellam quilibet predictorum: et vadit ad domesticum brachium: et in cubito apparet. curvatura cubiti dicitur basilica: et est inferior. Et ex his potes videre quomodo basilica habet continuitatem cum vena que nutrit partes pectoris superiores. Etiam apparet que est causa quare in pleuresi in qua dolor ascendit superius usque ad furculam compedit fleubotomia basilica: ut ponit Hippocrates secundo regiminis acuto: ubi. et Galienus ibidem.

Postea vero egreditur furculam: et ramificat in ramos quorū duo obliquant: et vnus eorū vadit ad brachij dextrū: et alter ad sinistrum et vadit ad sinistrem partē brachij: et apparet in curuatura brachij et dicitur cephalica: et hanc euacuare a capite: quia continua est cum venis duabus directe precedentibus superius ad caput. Et iste dicunt vene predictae appoplecticę et sicut dixi de venis: ita eodē modo pcedunt arterie. Postea iuxta istas arterias et venas appoplicas inuenies neruos duos magnos descendentes a cerebro a sexto pari neruorum: vnus a latere sinistro et altera a dextro: et ex utroque formant et ramificant nerui reuerſiui: quod sunt nerui vocis: quos videbis suo loco: residuū autē dextri cum yfophago p maiori parte coniungitur: et in os stomachi ramificat: et tendit vsq ad fundum: et aliqua pars eius in furculā cum venis et arterijs cassule coniungat: et sinister pro maiori parte cum mēbris spūalibus cōplicat. Et quoniam ad aliq d eum cum naturalibus coniungitur: his mēbris excarnatis eleua similis tracheas arteria et yfophagus: sed hoc nō poteris nisi alia membra. scilicet eleues. Incide ergo et eleua mandibulas inferiores a superioribus: et hec faciēdo notes anothomiā oris.

De anathomia oris et multis circūstātijs circa h.
Am ipsius oris primo occurrūt labia inferius et superius: et huiusmodi labia sūt cōposita ex neruis: carne et cute: mira cōmixtiōe: ita quod cutis a carne neque caro a neruis pōt sepearari: neque panniculus ab eisdem. Et hoc fuit quod labia debebant moueri versus oēs differentias positionis. scilicet sursum et deorsum: ante et retro: a dextris: et a sinistris. Veligitur oportuit quod haberent diuersos et plures musculos quod est impossibile ppter grauedinē: vel igitur oportuit quod carnem et neruos p omē diuisionē haberent permixtos: cooperiunt etiam labia panniculo quod oritur a tunica intrinseca meri continuata: cum tunica intrinseca stomachi: sicut et oia membra oris. Ut sit sensus eius: cuius est stomachus: ppter hoc conuenit quod in omni vomitu futuro tremūt labia inferiora. Post labia sunt dentes numero. xxxij. duo duales inferiores: duo incisui: duo canini: quattuor maxillares: et sex molares: et totidem superiores. Et dentes principaliter sunt facti ppter contritionem et digestionem sicut cibi. Secūda ratio ppter vocem et distinctionem loquele: sicut et labia: et ideo carentes dentibus vel labijs nō bene loquuntur: post dentes est lingua cuius anothomiā referua. Post vide pallatum habens cōcauitatem in cacumine superioris: vt fiat intonatio vocis: et reuolutio agilis ipsius cibi quando dentibus cōteritur. In fine palati videbis vneā pendētem ad modū granī vneę: et ideo vocata est vneā in substantia existēs rara: spongiosa: quod principaliter ē facta vt supfluitatē descendētem a capite hora reumatismi recipiat: ne ad membra inferiora descēdat: et ppterea frequēter apostemat. Est et formata vt vocem moduleri in frangēdo aerē: quod est materia vocis. Sed iuuamētum ei⁹ ē vt ipm aerem quod ad pulmonē vadit et attrahitur p nares et os reputiēdo aliquādiu in ore retineat et ne frigidus sed alteratus pueniat ad pulmonē. Et ppterea contingit quod habentes abscissā vuulā multum sunt catarrōsi: et ideo phibetur ab auctoribus ne incidat. Sed si sit putrida aut apostemata debet

aduri. Est etiam alia causa: quia ppter situm et substantiam eius quā incidit raro cōsolidatur: sed sanies ibi aggregatur putrida. et semp sentitur fetor oris: et ideo melius ē vt cauterizetur ferro ignito. Modus autē ē vt habeat cauilla ferrea vel lingua lintra luto sapie: siue creta: vt ponit Auicē. qrtā. sen. primi can. caplo de cura p cauteriū et aperto ore et interposito inter maxillas ligno rotundo in vna extremitate cauille imponatur vuula postea ferrum ignitum p cōcauitatē cauille intromittat: et attingat vuula et cauterizetur. Post vuulam vero sunt fauces: et sunt loca ampla glandosa: apta suscipere supfluitates. Et ideo frequēter apostemant: et apostema eorū lz extra nō emineat. eminet tamē intus. Et ideo si os aperiat et in pfundo aspiciatur apparet tumor: et ideo fit ibi squinātia i scda specie et vocāt vulgares gotum: et in fine siue termino existit pncipium cāne: et meri: et ibi videbis membrū vnū cartilagineum cum magna sapia a natura fabricatus: quod vocatur cooptoriū: quia hora trāsglutinis cibi claudit forā mē epiglōtis: ad hoc vt aliqd cibi vel potus nō descendat ad pulmonē: quod possit esse cā suffocatiōis. Et ideo euenit quod si aliquis ridendo trāsglutiat: quod tūc vadit aliqd ad pulmonem: quia hora risus stat epiglōtis aperta: quia tunc videt suffocari.

De meri cum trachea.

Is expeditis eleua vt agilius et leuius videas anothomiā residuorū meri cum trachea: et his eleuatis nota primo substantiam eorū: nam substantia meri ē pellicularis et mollis: substantia trachee ē pellicularis et cartilaginosa et causa fuit quia meri ē via cibi: qui interdum diglutiunt in magna quantitate ppter quod oportet via eius interdū dilatarī: sed trachea est via aeris penetrantis ad pulmonē: quia cum leuis sit et non solidus per viam penetrat que stat aperta. Via autem pellicularis ppter molliē non stat aperta: sed paries vnus cadit supra alterę. non fuit hec cāna ossuosa: quia dē esse flexibilis ppter formationem vocis. Item impediret trāsitum cibi multi: et solidi per meri. Et ppter banc cām nō fuit tota cartilago vna. sed fuerunt plures cartilaginee continuatę per pelliculas simul. et isti sunt circuli quidam non tamē cōpleti sed in figura. scilicet residuū autem cartilagineis continuata substantia pellicularis in directo meri et hoc nec substantia dura cartilaginosa comprimat meri et impediat trāsitum cibi. Et ideo scire debes quod a parte anteriori cāna ē cartilaginosa: quia versus partē illaz nō cōtangit meri. Item tūc tūc magis a nociuis: sed versus partes posteriorē est pellicularis: et hoc vsq ad epiglōtis: que tota est cartilaginosa ppter cām que dicitur. Et sic apparet substantia cāne. Sed substantia meri ē cōposita ex duplici pāniculo: siue tunica intrinseca: que villos longitudinales ad attrahendū hanc et extrinseca que villos hanc latitudinales aptos ad expellēdum illud quod attrahitur ab intrinseca. verum ē quod prima principalior ē scda. Et ex his pars iuuamētū hōis et numerus partium eius. pp partes trachee: quod partē quandā principalē hnt: que dicitur epiglōtis cuius anothomiā postea ponā. Tercio videas oriam ex parte quā sitatis: nam meri ē lōgius et maior cāna: quia tendit vsq ad dyaphragma: et infra ipm cōtinuat cum ore stomachi: sed canna pulmonis non descendit

nisi vsq; ad furculam. Et cā p; q; pulmo statim est sub furcula: sed os stomachi est immediate sub oya fraginate. differunt quarto in situ sine loco: nā meri est positum magis in pfundo: versus spondiles colli: et dorsū: s; trachea arteria magis est posita anteriū: et cā fuit triplex: vna fuit q; cum trachea sit magis dura cartilaginosa et meri piculosus potest magis tueri canna ab intrinsecis alterābus q; meri q; magis fuit posita exterius. Secūda cā fuit q; p tracheam attrahit aer: cuius p;tinuus d; esse in gressus: et ideo ipse debuit habere situm directū ad qd;: et sic h; q; ponitur anteriū sicut os. Tercia cā fuit q; si meri fuisset positus anteriū versus gulam vel oportuisset q; post finē trachee meri obliquasset versus dorsum vel q; a fine canne vsq; ad principiu oris stomachi fuisset vacuitas: s; vtrūq; est inconueniens: nam secundū est impossibile: p;tinuus aut pareret nocuenti et ipedimentum in actu transglutendi. His visis eleua meri incipiēdo a parte inferiori cū sollicitudine ne tangas aliquē neruū reuersū: verū est q; facilliter sepatur a trachea vsq; ad epiglottim: ibi vero difficulter. Propterea q; tunica meri dispersa est i epigloto: et iō ab eo non facile sepatur: et hoc fecit natura sagaciter ad hoc: vt in hora transglutionis cū meri eleuatur ad os: ad attrahendū cibum epiglottis etiā eleuet ne sui duricie et soliditate ipediat transitum cibi. Et ista continuatio nō fuit necessaria i tota trachea: q; ipa fm totum p;ter epiglottim non est cartilaginosa: et ex hac anothomia manifestatur snia Hal. in libro de motibus liquidis: q; epiglottis hora transglutionis non mouetur sursum: q; ab aliquo moueat: neq; ex se: s; q; trahit ab yfophago ppter p;tinuationem dictam. Et hic sufficiat de anothomia yfophagi meri et cause pulmonis.

De pulmonis extremitate grossa et solida q; nominatur epiglottis etc.



Leuato meri videbis extremitates pulmonis grossas et solidas que nominantur epiglottis. Et hic epiglottis est compositus ex quadruplici substantia. scilicet pelliculari: q; velat ppter cām dictā et ex musculis: et neruis et cartilaginibus. Musculi vt dicit Galienus octauo de inuamentis sunt. xx. inter cartilaginei: et octo inter epiglottim et membra circumiacentia: nō tamē perfecte oēs possunt discerni. Neros aut inuenies ascendētes: ab vnoquoq; latere trachee arterie vnū: et isti sunt nerui orti cū neruis suprapositis descendētib; supradictis: et oriuntur ab eis iuxta cor: et superius reuertuntur. Et ideo isti vocati sunt nerui reuersi: siue nerui vocis: q; proprie sunt p;ncipium motus vocis. Et cā quare h; nerui reuersi ui fuerunt et nō directe ad epiglottim veniunt a cerebro: fuit quadruplex: vt ibidem ponit Galienus in libro de motibus liquidis. Vna cā est: quia isti nerui sunt principium magni motus et fortis et spissi: propter quod debuerūt esse fortes: quare sicci: q; nerui motui quāto sicciōres tanto fortiores. Nunc aut sūt sicciōres quāto a cerebro magis remotiores: q; iuxta cerebrum et originē eorū nerui sunt valde molles. Propter quod vt essent remoti a cerebro natura transmittit eos vsq; ad cor. Postea reflexit superius et reflexit iuxta loca calida vt cor. et ad arteriam adorti vt fierent sicciōres. Secūda cā fuit q;

cū vox sit motus qdāz voluntarius: vel facta a motu voluntario: eius principium d; esse cerebrum. Et q; cerebrū non pōt multū moueri: taliter ordinauit natura istos neruos: vt cerebro modice motu moueretur epiglottis fm imperium voluntatis ipsius. modo hoc fit per hoc q; nerui illi sunt situi ad modum freni et habenarum. Et ideo ibi dicit Galienus q; cerebrum vtitur his neruis ad mouendū epiglottim: sicut miles vtitur freno et habenis. Tercia causa est ista: q; l; vox dependat a cerebro tanq; a principio voluntarij motus dependet etiā a corde tanq; ab eo in quo formatur conceptus: et ideo cum sit operatio cōis cerebri et cordis: nerui q; sunt in strictura vocis debent cōdicare cordi et cerebro: et ideo cum ortum habeant a cerebro transitū debuerunt habere iuxta cor. Quarta cā fuit: quia nerui ad musculos debent peruenire iuxta principium eorū et non finē. Principiū aut musculorum epiglottis est versus partes inferiores quare nerui ad eos venientes ab inferiori pte ad eos debent peruenire: quare fuerunt reuersi: et isti nerui l; manifeste appareant tū duo. tamē multiplicat postea fm multiplicationem musculorū. Et ex his pōt videri quō ex incisione neruorū reuersuorū pōt accidere lesio et amissio vocis. Item q; qñ inciduntur nerui descendētes simul amittit vox et alie operationes: et imo cum ictu quando incidunt soli reuersi amittitur tantū vox et alie operationes non impediuntur. Post neruorū anothomiam eleua neruos et musculos et cōspice tres cartilagineas. Prima anterior maior est oibus clipealis appellata siue scutalis: ad similitudinē scuti siue clipei. Item posita ad exterius ad defendendum vt clipeus. Secūda vero est ad complendū totū qd deficit ex prima. et hoc vocat nomen nō hñs: et cā quare fuit facta epiglottis cōplete cartilaginosa est vt sit magis sonora vt ad ipsam fiat melior refractio: et nō impediat cum hoc transglutionem: q; eleuat hora transglutendi ad superiora cū meri ppter cās supra dictas. Tercia est que existit in medio et vocat cimbalaris. In medio aut eius est lingua fistule dicta fistula: ad similitudinē fistule artificialis. Et ista sic nominata est ad similitudinē istius fistule naturalis: et est conuenientius dictum.

De lingua et narratis circa eam hic etc.



Expeditis his que circa pulmonē et cannam eius et epiglottim tunc remanet lingua que fabricata est in osse facto ad figuram lre laude. Habuit. n. in suo fundamento os: vt ab eo sustentet et etiā q; diuersis et varijs motibus d; moueri: vt ei inuitatur: et eidez affigatur: q; omis motus localis d; esse ad aliquod fixum. Et hec est cā quare os istud fuit figure laude: q; si fuisset totum vnū oblongum: aut pcessisset recte deorsum: et tunc penetrasset epiglottim vel meri vel stetisset a latere vno: et tunc lingua nō existeret directa sed ad idem latus plicata. Postea sci de linguam per medium et videbis magnas et plures arterias ad eam venientes vt facilliter moueatur et magnificetur: videbis etiam duo pla neruorū motiuorum qui magis profundan in profundo radice lingue: et sensitiuorū qui in superficie et panniculo eius expanduntur ad dandum sensum gustus et tactus: et sic iam peruenisti ad anothomiaz vnus

nerui motui oris a cerebro ad dandum motum.
z vnus sensui ad dandum sensum.

De capite continente mēbra animata.



Is expeditis assume caput qđ est ven-
ter posterior vel postremus continens
mēbra animata z spāliter cerebrū qđ
est in imobile: z ideo caruit musculis. si-
tus ei⁹ est pars supior corporis. Lā autē
ei⁹ situs est supra dicta. Et ex his apparet p̄mū. s.
substantia ei⁹: qz de se ossuosum est poti⁹ q̄ muscu-
losum. Apparet scđo situs z locus ei⁹ z ex superio-
rib⁹ z sequētib⁹ apparebit colligantia eius. Appa-
ret tertio q̄ntitas ei⁹: qz hic venter in homie est ma-
gne q̄ntitatis respectu alioz maioris q̄ in alio aia-
li eiusdem q̄ntitatis cum hoie. qz hz continere cere-
brum qđ maius in hoie q̄ in aliquo aiali eiusdem
q̄ntitatis. Et d3 habere ventriculos maiores etiam
magis distinctos. Figura autē capitis z forma appa-
ret: qz est figure sperice leuiter p̄esse ex vtraqz parte:
ita qđ fm anteriora z posteriora tuberositates q̄-
dam: fm dextrū vero z sinistrū habeat planities.
Lā autē quare fuit figure rotunde: sed leuiter com-
presse ex vtraqz parte est: qz talis est oim aliaz ca-
pacissima: z qz ipsa non pōt tangi nisi in puncto. z
p consequēs a reb⁹ exteriorib⁹ tuta. His duob⁹ in-
diguē caput: qz d3 esse capacissimū pp cerebrū. z
qz valde dispositum intrinsecus alterantib⁹ d3 esse
tutū ab eis. quare figure fuit spice: non tñ fuit p̄se-
cte figure rotunde. sed de p̄sse ex vtraqz parte pp vē-
triculoz cerebri distinctionē. z pp ortū sensuū par-
ticulariū a pte anteriori. quare fuit figure p̄dicta.
Et ex his apparet q̄ntum qđ cōsuevit ingri in ano-
thomia cuiusqz mēbri. s. iuuamētum eius: qđ ē cōe-
z generale qđ est continere mēbra aiata z spāliter
cerebrū z orta ab eo. Sequit̄ sexto z vltimo videre
numex partiū ei⁹: partes autē capitis fm Alucē. in
tertia. fen. prima. caplo p̄mo. sunt. x. f. capilli cutis:
taro: pāniculus exterior: craneū: pāniculi intrinseci
duo: cerebrū: duo pāniculi inferiores: recte mirabi-
le os basilare: z adde. xj. vt orta. Capilli in capite
fuerunt generati z ex necessitate materie z ex neces-
sitate finis. Ex necessitate materie qz cū caput sit ca-
minum totius corpis recipit fumosas supfluitates
a toto corpe que materia piloz: z ideo p cutem eis
egrediūtur z formātur pili magni q dicūtur capil-
li. Necessitas finis fuit: qz cū caput sit expositū re-
b⁹ exteriorib⁹ alterantib⁹ habuit capillos: vt per
eos tueretur a nociuis extrinsecis alterantibus.
Cutis capitis grossa est: quia capilli debent esse fir-
mati z infixi in ea q debēt habere radices magnas
z grossas: z ideo cutis grossa fuit z etiam qz est ve-
lamē z scutum ossis z cerebri. cum super craneum
non sit musculus. Caro autem apparet in fronte
temporibus z circa mandibulas. Elevatione cuti cra-
nei apparebit tibi panniculus exterior: factus pro-
pter tria iuuamenta: vnū vt craneum acuti z cutis a
craneo siue medio non tangitur. Scđm vt craneū
per hunc panniculum sentiat. Tertium vt per hūc
panniculum dura mater suspendatur a craneo. qz
hic panniculus generatur ex neruis z ligamentis
oris a dura matre penetrantibus per coniūcturas
z poros cerebri extra craneū ex quibus contextur
panniculus his exterior.

De craneo quid sit zc.



Craneū est os magnum circūdās cere-
brū exteri⁹. in cōcavitate existit cerebz
locatū. z iō magnū ē h os in hoie sicut
z cerebrū. ei⁹ situs ē: qz velatū est pti-
bus p̄dictis pp necessitatē dictā. z velat ē cerebrū
pp necessitatē eandē. Istud craneū nō fuit vnū z cō-
tinuū: sed ptes habuit. z h pp multa. P̄rio vt si fie-
ret nocumētū in vna pte alteri nō cōicaret vel totū.
Scđo vt fumositates possent p iūcturas ex crane-
um expelli. Tertio vt vtus medicaminū tpe neces-
satis possit ad substantiā cerebri penetrā. Iste ptes
cōtinuate sunt iūcturis: q vocant̄ adoze. s. serati-
les. nō. n. fuerūt nodatiles: qz nō debēt moveri illa
ossa: sed fuerūt seratiles vt firmiorē facerēt colligā-
tiā: z iō dentales sunt. z fuerūt duplices. s. vere z mē-
dose: mēdose sunt due. s. in vtroqz tpe vna: z dicunt̄
mēdose: qz nō penetrāt interi⁹: sed tñ aperiūt exte-
rius. vere hō sunt tres sicut tres sunt vētriculi. s. co-
ronalis facta ad modū corone. sagittal p̄ūpens
fm lōgitudinē ad modum sagitte vel linee. z tertio
adoze. lauda q cōtinuat craneū posteriori. qđ ē fi-
gure laude. z fuit figure istius os posteri⁹. qz cere-
brū posteriori ē figure pyramidalis q sit cā isti⁹ ap-
parebit in anothomia substantie cerebri posterioris
Et ex his apparet q in genere qnqz sunt ossa capi-
tis. s. os frōis: duo parietes cranei: os lauda: z ba-
silare qđ statim videbis. Et ex his p3 q sit iuuamē-
tū cranei z partiū ei⁹. z egritudies eius sunt oīuz ge-
nex. Pōt. n. pati malā cōplexionē: apostema z so-
lutionē cōtinuitatis: in qua nota q ipsa ē periculo-
sa qz discooptū est aeri z appropinquē exteri⁹ alterā-
tib⁹ z maxime si fiat in loco iūcturay z spāl in loco
q d3 bregma z ē ps mollior z gracilior q sit in cra-
neo z tardius indurat in pueris: z hoc est qz ibi sit
cōiūctio siue vnio duay coniūcturarum.

De cura matre z pia.



Exposito craneo videbis duos pānicu-
los sub eo. s. durā matrē: z piā matrem
factos vt velēt cerebz: z vt cerebz non
cōtangāt a craneo qđ est valde durū.
z iō iuxta craneū immediate existit dura mater q sol-
da z dura ē iuxta cerebz ē pia mater: q mollis z hu-
mida est vt nō ledat cerebz. Et qz in ipsa cōtinēntē
siue cōtexte sunt vene: qb⁹ mediātib⁹ nutrit cerebz
z ex hoc apparet qre duo fuerūt pāniculi. qz h fuit
vt ne durus cōtangeret cerebz. z vt mollis nō con-
tāgeret craneū. Est ēt alia cā. s. vt si nocumētū nō
cōtingeret vni: adhuc nō cōicaret cerebz: z dura
mater magis ē alligata craneo vt suspendit ei. z iō
p ipm siue suas p̄ficaces trāsmittit nerulos z li-
gamēta. hz ēt dura mater cōtinuitatē cū cerebro.
vñ penetrat p ipm diuidēs ipm p mediū in dextrū
z sinistrū vsqz ad vētriculū anteriorē. z diuidit etiā
ipm in anteri⁹ z posteri⁹. Et ideo diuidit anteri⁹ ce-
rebri a posteriori: fuit hoc necessariū: qz vnū ē di-
uerse cōplexiōis ab alio: z sicut diuidit dura mater
ita etiā z pia mater: imo magis: qz cū pia mater sit
sustētaculū venay nutriētū cerebrū diuisa est per
cauernositates cerebri z nutritiū tribuat cerebro:
sicut penetravit vsqz ad vētriculos cerebri: circū
circa velati sunt: vt pāniculo subtilissimo vsqz ad fi-
nē medij. nā vētriculus posteri⁹ pāniculo nō idia-
gnit ppter siccitatem eius respectu anterioris.

De cerebro in hoie qre maius in quāitate q̄

In aliquo animali eiusdem quantitatis etc.

Panniculis eleuatis appetit cerebrum in boie maius in quantitate quam in aliquo alio animalis eiusdem quantitatis: quia cor habet calidius eisdem: et idiget per operationem intellectus pluribus spiritibus animalibus. Et hoc cerebrum duas partes habet anteriorem et posteriorem: pars anterior diuisa est secundum dextram et sinistram: et hec diuisio appetit in substantia maxime cerebrum: et ex consequenti in ventriculis eius substantia medullaris frigida et humida diuersa ab alijs medullis: quoniam non est perfecta: ut craneum nutriat: sed potius craneum nutrit: ut contineat cerebrum: et eius iuuamentum est ut spiritum vitalem sine operatione contemperet ut fiat animalis. Postea vero vade scindendo leuiter per medium donec puenias ad ventriculum anteriorem magnum. Et antequam perfundes usque ad lacunam: nota ventriculum esse diuisum in dextram et sinistram ut dixi: et parietes hinc inde sunt descendentes usque ad basim. et diuides dextram a sinistro: et tunc statim videbis amplitudinem vniuersumque ventriculorum in anteriori parte eius. scilicet in angulo anteriori locata est fantasia que retentiva est spiritus sensibilis particularibus receptis. In angulo posteriori est imaginatiua que apprehensiva est harum spirituum in fantasia retentis. et eas apprehendit componendo: et diuidendo: discernendo habere esse hoc. In medio vero huius est sensus communis que apprehendens spiritus delectas a sensibus particularibus. et id sensitiva hic terminatur ad illud locum: ut rursus ad fontem ut videbis. Et hec diuisa sunt tres finis. Huius de virtutibus animalium: et huius finem Aristoteles. et Galienus tamen fit sensus communis: qui diuersimode potest dici et fantasia: et imaginatio ut alius declarauit. Et ex his potest patere iuuamenta huius ventriculi: quia iuuamenta sunt: ut imaginatio fantasie deseruiat et sensui communis: ut omnibus sensitiuis siue organis sensus spiritum tribuat animalis ut sentiatur. Et ex his appareret nocumenta que in hoc ventriculo et cerebro anteriori contingunt: quia in eo possunt omnes egritudines fieri. Solo continuatis mala complexio: que si sunt in paniculo dolore canit: et si totum circundat paniculum vocat omni siue dolor oualis: si media parte emigranea. potest et parte egritudine que est apostema: et si sit in paniculo calidum vocat sirsen. quod frequenter contingit si sit frigidum vocat litargia. Si vero sit in substantia cerebri pessimum est mortiferum: potest et parte egritudine oppositionalis: que si est oppilatio non ex toto aut est substantia vaporosa. et sic est rigore et schotomia: aut humoralis: et sic est stupor paralisis: et hemiplegia. Si sit oppilatio ex toto aut oppilat ventriculos et substantia similat ventriculos tamen: si ventriculos tamen sic est epilepsia. Verum est quod hec oppilatio est oppilatio alios ventriculos: sed non tamen quantum anteriorem. Melancholia est de genere complexionis male. antequam autem procedas ad medium ventriculum considera iter media iter huius et medium. et sunt tria. scilicet anche. que sunt sicut basis huius anterioris ventriculi dextri et sinistri. et sunt de substantia cerebri ad formam figuram anchorarum et a latere vniuersi cuiusque iter ventriculos iam dictos est substantia vna rubra sanguinea. facta ad modum vermis oblongi siue subterranei: ligata ligamentis et nervulis alterutrique que ad sui elongationem stringitur: et claudit anchoras: et via siue transitu ab anteriori ad medium. et est. Et quando homo vult cessare a cogitatione et sui consideratione eleuat parietes: et dilatatur anchoras ut possit spiritus transire de vno ventriculo ad alios. et propterea vocat huius:

tum quia assimilatur huius subterraneo in substantia et figura. et est in motu actiuo: et extensiuo. Et post hoc descende inferius paulatim. et primo tibi occurret lacuna que est quadam prauitas rotunda. et oblonga: cuius medio est foramen tendens inferius ad palatum dragona liter. et ei occurrit via directa que a medio ventriculo descendunt directe ad collatoriu: et hec lacuna habet circumquaque eminentias rotundas magnas: factas ad sustentandum venas vel arterias ad ascendendum a rebus mirabili ad ventriculos dictos: et id in basi eius apparent glandule que sunt iuxta rete mirabile eminentes: et pistas lacunam ventriculi anteriores et cerebrum quantum ad medium eius expurgant suas supfluitates. sed cerebrum quantum ad partes anteriores magis expurgat suas supfluitates per collatoria narium. His expeditis statim tibi apparet ventriculus medius que est sicut quadam via et transitus ab anteriori ad posteriorem. et in isto locata est huius cogitativa: et merito quia hec huius operatur componendo fantasiata et memorata ut ex sensibus eliciat non sensata. Itaque ipsa est huius regitiua totius animalis. regimem autem totius animalis consistit in apprehensione presentium: memoria preteritorum: et pronosticatione futurorum. Et id debuit esse in medio harum virtutum apprehensiuarum et rememorative. fuit et in medio horum ventriculorum ut sit huius in directo ad cor: eo quod huius est huius immediate deseruiens intellectui: que debuit esse in medio ventriculo: post istum procedendo tibi apparet ventriculus posterior que est cerebro posteriori situatus et locatus: et hoc cerebrum est velatum et distinctum a primo duobus paniculis iam dictis. quia hoc est molle. scilicet anteriori et posteriori duorum. Istud cerebrum posteriori est locatum: quia est principium nuche. et quia est principium plurimum nervorum motiuorum. Non autem sit per nervos motiuos que quanto duriores tanto fortiores sunt. Istud cerebrum est figure pyramidalis: quia ventriculus locatus in eo: et est figure pyramidalis: et causa que illius figure est ventriculus posterior est: quia per partem inferiorem eius que est basis eius dextre recipe et id dextre latitudine. per partem superiorem dextre terminetur id acumen et stricturam dextre in cacumine: quia spiritus melius reseruantur in stricto loco quam in amplo: et id fuit talis figure. Et ex his patet operatio siue iuuamentum istius cerebri posterioris: quia vnum est ut sit principium motiuorum et nuche. Aliud est ut sit instrumentum virtutis memoratiue. Et ex his patet passio propria huic est quando lesa est memoria sicut quando lesa est cogitativa. Egritudo propria est ventriculo medio: et quando lesa est imaginatiua passio est in ventriculo anteriori: sicut quando passio est commota toti cerebro omnes lesa sunt virtutes: et operationes harum virtutum omnium. Sed tu dices que est causa que ventriculus medius non habuit cerebrum medium distinctum sic alij ventriculi. dicendum quod causa fuit: quia iste ventriculus est sic via et transitus istorum aliorum duorum: et id non debet esse distinctus ab eis secundum cerebrum: et hoc de anothomia cerebri etc.

De eleuatione cerebri quod inde apparebit.

Ex expeditis ostendit eleuare cerebrum leuiter: ita ut non rupatur aliquis nervus et incipit eleuare a parte anteriori: et tunc statim tibi apparebit due caruncule siles capitibus maxillarum: et suba appareret siles sub cerebri: id a medullare suba sunt ortu: velate subtilissimo paniculo quod est pia mater: et id fragiles sunt satis: quia non debebant in boie ex penetrare: et hoc quia cerebrum ex odoribus perficitur et fortificatur: quia cerebrum est complexionis frigide et humide excederet odorem autem cuius sit humilis euaporata

tio: vel nō sit sine fumali euaporatiōe h3 exticare & calefacere q̄re remittere h3 lapsū cerebri: & iō ip̄s h3 inuare: q̄re nō ordinatū vt nō elōgare: a cerebri: sed itra craneuz remanentia cōcauitate emō: torij siue collatorij nariuz: & per porositates ossis nariū recipiunt vapores: & odores representāt vsq; ad ventriculū an̄iozez cerebri: pcede postea & videbis nernos duos maiores: q̄ sunt i corpore n̄ro vocatos opticos: q̄z origo ē a suba cerebri: & si bñ pcedebas: videbis q̄ cōtinuate sunt cerebri sube i vētriculū an̄iozibz: & ex p̄niculū piā m̄fēz cerebri an̄q; craneuz egrediant̄ iungunt̄: q̄z adiūices ap̄ plicanti: vlt̄ q̄z cruciant̄ exites perforati i loco cruciatōis & vniōis ip̄oz: vt eis fiat vn̄ loc̄ cōis: vt spēs vnī rei recepta a duobz oculis & delata per duos nervos ad vnitates redeat: vt vna res nō videant̄ due: s; vna sicut d̄z: & p̄ cruciatōez eoz egrediunt̄ craneuz: & qlibet eoz ad p̄p̄iuz venit oculuz cui⁹ anothomia: postea declarabit̄. Post illos eleua m̄ cerebry & medietatez ei⁹ & videbis sc̄dz par nervoz subtiliuz & duroz: q̄ vadunt ad oculos ad monēduz ip̄os motū volūtario. Postea ē tertiū par nervoz cui⁹ vna pr̄s vadit ad mēbra faciei ad dādūz & sensum & motū volūtariū: & alia p̄s ei⁹ ad m̄scet̄ q̄to pari: & istud q̄tū par sit cū eo q̄d ei⁹ ad m̄scet̄ ex t̄rio pari descendit inferi⁹ ad loca dyasfragmatis: & dat sensūz mēbris inferiōzibz & visceribus. Et isti veniūt ad stomachū: & ex eis oriunt̄ reuerſi: tui: q̄z iuuamēta oca sunt supra: & isti p̄mi nerui sunt voca. Postea sunt nerui q̄nti paris q̄ vadūt ad os petrosū: q̄d ē i radice auris: & ei⁹ foramē ē p̄niculū p̄textū ex filis hoz nervoz: sic sūt i n̄st̄z audit⁹. Postea sunt nerui vīgiti paris subtilēs q̄ vadūt ad palatū ad dādū sensūz palato. Ultio ē septimū par nervoz q̄ vadūt ad ligūā ad dādū sensūz gustus & motū lingue. Et ex his p̄cedēdo eleua totū cerebry & tūc appēbunt duo p̄niculi inferiores exites supra os basilare q̄d ē basis & fundamētūz cerebri: & totū caput: & tūc eleua hos p̄niculos duos ab osse: & in medio basilar̄ i directo collatorij iuenies rete mirabile: p̄textū textura fortissima: & miraculose duplicata vel multiplicata ex arterijs subtilissimis: adiūicē p̄textis q̄ sunt rami arteriaz apopleticaz: ascēdētū & i isto reti siue i venis isti reti p̄tinet spūs v̄talis ascēdēs a corde ad cerebry: ad h̄ vt fiat aial: & q̄z sp̄ir̄ h̄ meli⁹ alterat̄ diuisus ad minia: & tūc maxie diuidit̄ ad mima: q̄n̄ ē p̄tēt̄ i arterijs puilissimis & subtilissimis: iō istud rete fuit p̄textū ex venulis siue arterijs minimis & subtilissimis: vt spūs i eis p̄tēt̄ a cerebro facili⁹ alteret̄: & t̄patur⁹ ad formā aialis spūs p̄uertet̄: s; formā p̄fectiōē acq̄rat̄ in ventriculū cerebri: sicut s̄guis i vētriculū cordis: & hec ē vna ex cāz q̄reret̄ mirabile fuit p̄flatūz sub cerebro vt ponit Gal. & iuuamēt̄: & in libro d̄ vtilitate pulsus. Est ēt alia cā: q̄z mēbz h̄ est oīgnū multa custodia: q̄re sp̄m natura locauit i loco tutissimo & forte ēt h̄ fecit natura: vt ex vaporibz ciboz & potūz p̄dēsatis a p̄plexiōe cerebri & cadētibz deorsum: vt aliq̄ oppilatio ad tēp̄ fieret in h̄ ret mirabili ex q̄ oppilatōne causat̄ sōn̄: & istud rete sustētat due carnes glādose facte principalr̄ ad ipsūz sustentandūz duas venas ascendentes ad cerebrum & duas arterias ascendentes ad ventriculos cerebri.

De oris q̄d durius est ceteris basilatione.



Post hec oia videbis os basilare q̄d durius ē ceteris: q̄z d̄z ēē basis & fundamētū & sustētaculū oīum alioz q̄d aut̄ d̄z alia sustentare d̄z esse d̄z. Dup̄ fuit ei⁹ vt a sup̄fluitatibz q̄b⁹ submitit̄ nō putrefiat: sed putrefactiōē resistat. Istud os diuisū est in ossa patrosā nariū: & oculoꝝ & ossa duo lateralialia: q̄ vocant̄ ossa paris: & sic sunt q̄nc̄: & h̄ melius discernes si decoques t̄m̄: n̄ est q̄ ossa nariū sunt multū cauerna: sa porosa. vt sup̄fluitates p̄nt descendere & vapor subiect⁹ odori ascendere ad cerebry: postea scinde alterutraq; ossa oculoꝝ: & videbis locū oculi & colligatiā ei⁹ cū nervo optico: & colligatiā ei⁹ cū nervis mor⁹ oculi. appet̄ ēt locus ei⁹: q̄z nō est positus multū in p̄fundo: q̄z d̄z recipe spēs in medio ext̄tes: nō eminet ēt multū ex facie: ne ab exterioribus leda: cum eos h̄eat valde molles & passibiles: & iō ad ei⁹ siue eoz tutelā in hoīe nā ordinant̄ sup̄cilia vt a rebus descendētibz custodiant̄. & palpebras vt a rebus interioribus occurrentibz etiam custodiant̄. ordinant̄ etiaz tuberositatem maxillaz: vt custodiatur a rebus ab inferioribus ascendētibz & a latere obuiantibz: sicut ab alio latere obuiant nares.


De oculorum tunicis &c.



N oculo aut̄ sunt. vij. tunice: & tres humores. tunicas videbis diuidēdo oculū i duas ptes: plane & leuē. s. in an̄io rez & posteriorē. Et i an̄iozi sunt quatuor tunice: q̄z tres p̄tinuant̄ & correspondēt tribz tunicis intrinsecis: q̄z vni illaz. s. corneē nō p̄tinuat̄ aliq̄ in p̄fundo siue interi⁹. sicut igit̄ p̄ma est cornea: q̄ d̄r cornea: q̄z assimilāt̄ cornū i suba & colore q̄ trāspārēs ē: & fuit trāspārēs q̄stū ad colozēz vni null⁹ esset colozis: ne ip̄ediret receptionem ois colozis: fuit ēt sube solide: q̄z rebz exterioribz est p̄pingssi: ma. Sc̄da est p̄iunctua q̄z p̄ter corneā exteri⁹ est cōiūgens & velās & coopiens totū oculū: & huic i pte posteriori siue iterio: est sclerotica p̄tinuata cū ea & iteri⁹ circūdans totū oculū: postea subiūctua i pte an̄iozi est vnea dicta sic: q̄z simulāt̄ medio folliculo graui vne nigre i cui⁹ medio & sus corneā ē foramē q̄d d̄r pupilla: sc̄a vt spēs visibilis possit puenire vsq; ad cristallinā: & nō ip̄ediat̄ p̄ obfcuritatem vne: & cā q̄re nō fuit totus discooperit̄ hac tunica vnea ē triplex: vna est q̄z ab ea suo colore viridi & puniceo siue azuro p̄fortat̄ spūs visuū cū sint mediū inter extremos colozes. Sc̄da cā est: q̄z nimis si ipsa nō esset spūs visu⁹ a lumie exteriori resolveretur. Et iō vt stare vnit⁹ i vno loco i directo cristallino fuit hec tunica h̄ns vnū foramē q̄d foramē pupilla vocat̄: & iō p̄tigit q̄ si h̄ foramen dilatat̄ a nā: vlt̄ alr q̄ ip̄edit̄ visu⁹: & maḡ ip̄edit̄ q̄z si p̄stringat̄ a nā. Tertia cā ē: q̄z ois spēs rei q̄ v̄r puenit ad oculūz in figura pyramidale: cui⁹ basis est res visa: & ei⁹ con⁹ est oculus siue ei⁹ angulus est i cristallina: q̄re o3 q̄ h̄ foramē sit strictū. d̄r vnea: q̄z hec tunica p̄tinet hūiozez vneū ḡnatū ad humectādū oculū: ad h̄ vt sit mediūz intrinsecū receptiū spēs: & q̄z tale mediū nō p̄de esse nisi aer⁹ vel aq̄ a d̄no & aer nō p̄t̄ ibi p̄seruari. iō nō fuit ibi aer: s; aq̄. Itēz q̄z illuc currit spūs visibilis aeris a d̄no: & hic humor p̄tinet̄ i vnea vt phibeat cristallinā appropinquare aeri exteriori: vt corneā faciat distare a cristallina: etiaz vt foramen pupille stēto dilatātū: & p̄pterea egredit̄ f o s

ramen vultu et intumescit cornea. Et tunc contingit quod in appropinquatibus mortis cum exerceat hic humor quod cornea cadit et applanatur. Et tunc a vulgaribus dicitur quod appertella ante oculos: et est signum infallibile mortis. Continuitur et per eum exiccatione restrictio pupille: et iam potuit fieri videre noticiam passionum quod occulte sunt: quod sunt in oculo ratione huius vultu nisi quod restat aliud dicitur de cataracta. Cataracta autem fit quando vapor generatur aut descendit a cerebro aut ascendit a stomacho et pervenit idirecto pupille ad humorem hunc exis inter cristallinam et pupillam impedit receptionem spiritus. Et quod vapor in principio est mobilis spiritus repulsi cum motu. Item cum de se sit coloratus movet cristallinam secundum suum colorem: cum spiritus pervenerit eum rei extrinsece quod movet visum iudicat utrum visiva res exterior est motas: et ideo iudicat muscas aut cunicos vel formicas super pupillam ambulare. Postea vero hic vapor in aqua pervertitur: quod dicitur et cataracta ita fit confirmata: quod si tota pupilla coopertur prohibet omnino visum. Si autem non oppilat ex toto aut existit a latere foramis aut in medio. Si a latere diminuta videtur et iudicat rem. Si vero in medio sit iudicat rem et perforata: quod per quam videre non potest iudicat esse foramen. Et ex his nota modum curationis cataracte confirmate: quod sit per manuales operationes: quod sit: quod ista cataracta penitus exhalat quod antequam possit attrahi egredietur humor albigineus si huius sit: quod acui ponunt perforando corneam longe a pupilla: et profunda obliqua cornea: donec sit indirecto pupille: postea ducunt acui ad locum cataracte vel a quo descendit: tunc ipsam impellunt infra ad locum istum: et tunc cum suffocantur aliis rebus prohibet ipsa reascendere: et ideo tale acui non vocatur cataracte curativum: sed vocatur abattere. id est deprimere cataractas: et sic appetit tibi quarta tunica: quod dicitur vultu cum ista in parte posteriori seu interiori oculi est tunica quinta quod dicitur secundina: vel quod scilicet est a sclerotica: vel quod secundum assilata. Post istas est tunica aranea circumdans cristallinam versus partem anteriorem: cum in parte posteriori continuatur tunica retina: et in medio istorum continetur humor vitreus et in medio eius est humor cristallinus rotundus sue figure spherice cum quadam planicie in parte anteriori: hic humor est magis versus partem anteriorem quod humor vitreus in quo locatur: et ideo hic humor factus est ad cristallinam locandum: et ad ipsam nutriendum. Et ex his completa est anothomia oculi.

De loco aurium in capite etc.

 Is expeditis videbis aure positam a latere capitis: quod sonus percipitur et a dextris et a sinistris: et ante et retro: et sursum et deorsum. Et ideo in istis illi potuit locari in dextra et sinistra. non autem in parte anteriori: quod ibi erant in ista aliorum sensuum. Auris autem fuit figure rotunde in homine vel circularis: ut esset plurimum capacissima: et cartilaginosa. Cartilaginosa autem fuit: ut esset ab alterantibus extrinsecus tuta. Et ut esset sonora cuius foramen est lorum terminatum ad os petrosum in cuius cavitate est spiritus plantatus quod est implatur: quod est in istis auditus: et eius foramen vel cavernositates cooperit poniculus subtilis cortex ex villis nervorum auditus iam supradictorum ut hic est. Ossa autem alia que sunt infra basilare: non bene ad sensum apparent. Nam ossa illa decoquantur: sed per perfringere dimittuntur: vix est quod mandibularum ossibus potes videre principium et finem. Incipiunt nam commissura sue ad os rea que est inter cranium et basilare in loco quod est in fine supercilij et frontis: percedit versus partem posteriorem iuxta os petrosum et auriculam terminatur: aut ad

dentes: quorum anothomiam supra dixi.

De divisione totius corporis etc.



Capite expedito divide secundum longitudines totum corpus in duas partes: incipiens a collo usque ad caudam ut tibi primo occurrat collum secundum per pulmonem et tracheam arteriam in aialibus respirantibus: in quod sunt. viginti. spodiales: et he spodiales sunt graciles: et subtiliores alijs: quod ab alijs dunt sustineri et potari: delatus autem dicitur esse levis deferere: et sic. n. sunt subtiliores alijs foramen huius maius: quod nucha est grossior in collo quod in alioque parte spodiali: quod ibi est principium eius: et quod sunt graciles he spodiales fuerunt dure et firmis continue ut non accideret dislocatio et lesio ab obuiantibus extrinsecus. Post istos sunt spodiales costarum quod sunt. xij. sic sunt costae. xii. septem vere et. v. menses. Postea sunt spodiales renium quod sunt. v. et sunt valde grosse et magne cum sint sic fundamentum et sustentamentum omnium aliarum et basis: postea sunt spodiales aliarum quod sunt implicatura: quod est a dorso ad caudam: et sunt tres minores pedes: quod dicitur continuari cum ossibus siue spodialibus caude quod sunt pueri: vltimo sunt spodiales caude vix est quod hic debes notare dicitur has spodiales: quod sunt in foraminibus eorum per quod transiunt pua nervorum et diversitates et eorum in alijs siue additamentis siue sementis ut notat Avicenna. Sed he diversitates magis sunt note in corpore decocto vel perfecte exiccato: et ideo non cures: sed forte alia facia anothomia in tali: et scribitur quod ad sensum videbo: ut propositum a principio: in quolibet tamen spodiali est nucha que est medulla filis sub cerebri: nisi quod viscosior est et solidior scilicet ut ab ipsa tribuat sensum et motum toti corpori a capite inferius: et quod orta est a cerebro diviso per dexteram et sinistram: hic est quod in superficie eius apparet filum vultus eam per medium. s. dexteram et sinistram tamen non penetrat in visum vel separat in profundum: quod nucha est orta a parte posteriori cerebri: quod non est depressa sed profunda: et ex hac dicitur visio sine separatione nuche tibi potest appere causa que operatio potest contingere in media parte nuche: et non erit alia parte: et ideo palpis potest in una parte ut dextra vel sinistra contingere et non in alia. Nucha autem quolibet spodiali oritur unum par nervorum quod vadit ad dandum sensum et motum membris determinatis. Que autem sunt membra ad quod perveniunt nervi illi non potest bene in tali anothomia videri: sed oportet aial liquere in aqua pluviali: et sic non spectat ad primum: et si vis hec membra cognoscere lege in prima sententia canonis. summa scilicet capitulo de anothomia nervorum ortorum a nucha: et quod spodiales sunt. xxx. paria: nervorum sunt. xxx. paria: et quod a cauda oritur unum erunt. xxxi. paria.

De excoinatione brachiorum et pedum etc.



Is expeditis excoincta brachium et pedem: et incipe a brachio et excoincta lenius: ut videas venas supradictas: quod veniunt ad curvaturam brachij: et tunc videbis venas supradictas: quod penetrat per subscapula ad brachium: et percedit per domesticam partem brachij: et in parte inferiori cubiti appetit vocatur basilica. Et in superiori parte cubiti est cephalica: quod evacuat a capite: et ad brachium venit supra furcula morte a vena ascendente ad caput: ut supra dixi. Et in medio istarum est vnum ramum continuatum in curvatura brachij cum abbas: et hec vocatur media quod media est: vel alio nomine vocatur cois: quod libet tamen barum duarum percedit ulterius usque ad manum et in sinuistri parte manum apparet: et illa que est inter auricularem et anulare dicitur sylen et nunc det basilice. Que vero est inter pollicem et indicem dicitur saluatella et fleubothoma loco cephalice.

Que ho est in medio di funis brachij et retinet lo-
cum cois siue basilice p^o venas multos multos
notabis: et chordeas multas magnas et grossas q^u
anothomia pfecta in tali corpe no labores inueni-
re: s; in corpe exiccato ad sole p^o trienuz vt als mo-
strauit et numez eoz pfecte declarauit et anothomia
taliuz: et musculoꝝ brachij et man^o et peduz scripsi in
lectura qua feci sup pmo scdo et tto et q^uto d^o iuu-
menis. Eleua igit carnositate tota vsq ad ossa: et p^o
mo inuenies os qd vocat adiutoriu: vep e^o tñ q^u su-
pra dorsum siue pect^o a latere posteriori spatula
hñs figurā silez ad moduz spatule lignee: qd ossa
tuū ē inferi^o: vt pect^o et costas no ipediat: strictuz ho
ē superi^o vt adiutorio pfirmet: et io in ei^o extremo su-
piori hz aliq^u pcauitate superficialē ad moduz pca-
uitatis rotunde: in q^u vt reuoluat adiutoriu: situata
ē extremitas rotunda adiutorii: cui^o caput p^omuū ē
rotunduz locatu: in p^oside ossis spatule: postea i me-
dio obliq^u x^o sus domesticā pte vt plicatio et aplexio
reꝝ sit possibilior. Extremuz at hz qñ duas eminē-
tias: q^u duob^o focilib^o d^o p^oiungit in medio priuz
eminētiā hñtiuz hz mag^u supra quādā pcauitatem
in quā ingredit^u extremitas focillis inferioris: q^u scā ē
ad moduz instrū hauriedlaquā: vt firmior sit p^ouictio
et colligantia: et io dillocatio raro et difficulter fit in
hac iūctura. Et qñ sit raro ē q^u bñ possit restaurari:
et facile inferi^o ē lōgi^o supioris: q^u pueniēti^o ē q^u illd
qd sustētat alter sit lōgi^o: et mai^o: eo q^u sustētat: abo-
tū pueniūt: q^u sunt grossiora in extrēis q^u in medio
q^u ab extremis debēt oziri ligamēta: et iūcture: et in
medio debēt situari musculi: facile supi^o n^o pcedit
directe: sic inferi^o: vt sit cā p^olicatōis manus et bra-
chij: p^o ista duo focilia ē raseta: cui^o ossa fuerūt pu-
rificata: vt possit man^o in plāta ei^o p^olicari et p^obi ad
p^otinēdū res fluidas et currētes: et fuesit ossa ei^o octo
in duab^o aciebus: in q^ulibet acie q^utuor. postea sunt os-
sa pectinis denoiata sic a forma et figura pectinis.
et sic sunt q^utuor: q^u corrdēt q^utuor digit^u: nā pollici
nō rñdet aliqd os pectinis q^u pollex nō est in eadē
acie cū alijs digit^u: postea sunt digit^u qñq^u in q^u q^u
cūq^u videbis carnez in parte domestica vt possit cō-
plicari ad capiēdū: et ex duricie ossiuz eoz nō ledā-
tur pp^o fricadōez. Et laterib^o ē eoz ē mltā caro vt in
ter ipos p^olicatos nō accidat vacuitas aliq^u. Et pte
ho siluestri nō ē tāta multitudo carnis: q^u digit^u nō
p^oiungunt x^o sus partē siluestre. Post carnē ho sunt
chorde q^u vnaqueq^u p^oba ad p^opria venit iūcturā
et illa q^u ad supiorē venit iūcturā igredit^u p^o mediu
inferioris chorde: q^u egtateā nō pōt: vt sit tuta a
nocuiis: et pp^o h^o superior mag^u est p^ofundior infe-
rior: q^u lōgi^o h^o pcedere. Itē nō egtat eā ne tumō
et inepitudo fiat in digit^u: nō aut pcedit aliq^u lateꝝ:
q^u ossi p^oprio d^o p^oiungi in medio directe: nō a latē.

De esse ossium et q^u in locis dirigunt et c.



Ultimo at deueniē^o ad ossa q^u sunt fun-
damēta totū et supportatā oia: et sunt
ossa inferiora: aū tñ q^u ad ossa peruenia-
mus excozia cutē subtilissime vt iueni-
as venas duas descēdētes: q^u ramificate sunt a trū-
co vene chilis descēdētes: q^u qñ erit in fine spōdiliū
renuz mūdicat in duos ramos: q^u vñ trāsbū ad
tibiā dextrā: et alter ad sinistrā qd pōt videre ad sen-
suz: et eodē mō ramificat arteria descēdēs: postea
q^ulibet illoꝝ tunicoꝝ ramificat in duos magnoꝝ ra-

mos: quoz vñ^o directe descendit per domesticā p-
teꝝ tibiē vsq ad digitos pedis: et hec vocat saphē-
na q^u pp^o directōez suā fleubothomata euacuat a
mēbris nālib^o: et genitalib^o: vt a matrice renib^o te-
sticulis et hñōi et appet supra genu et infra supra ca-
uiculā: et infra in calcaneo: et appet in pectine pedis
ali^o ramus obliq^uat et ingredit^u iuxta iūcturā scie:
et io vocat sciatica: et pp^o obliq^uōez quā hz circa has
iūcturas fleubothomata mag^u euacuat in passio-
nib^o iūcturay: et appet in oib^o p^odict^u locis. In pte
tñ siluestri: postea eleua musculos et chordeas: et vi-
de ossa. Et p^omuū est os femoris supra qd fabricati
sunt spōdiles doꝝ: et p^o p^ois totū corpe. In pte infe-
riori hz p^osidē quādā: in cui^o p^ocauitate locata est ex-
tremitas rotunda cane core q^u vertebꝝ vocat: et in
medio aboz in pte āteriori est qd dā ligamētuz qd
alio noīe pōt vocari x^o rebꝝ: et qñ h^o vel p^omuū resilit
foras: tunc necesse ē hoīez claudicare: q^u crus hoc
elōgat et firmari nō pōt nec totuz pōt bñ supporta-
ri: necesse est vt crus tabescat: q^u vene q^u p^orasunt
inferi^o p^o opp^ossionez: et obliq^uōez qd dā mō oppilant^u
lz nō perfecte et iūctura hec istoꝝ ossiū vocat scia:
vñ dolor ei^o vocat sciaticus: postea videbis os qd
noīat cāna core qd est mai^o oib^o ossis: q^u sunt i cor-
pore: q^u d^o esse sustētamētū totū corpiuz: qd p^ocaui-
tatez habuit magnā: vt esset leue: et vt multū medul-
lā retineret: et q^u meli^o sustētare pōt qñ nō stat per-
pendiculā: qñ fm extrema plicatū est x^o sus dome-
sticā: et in medio p^olicatū est et p^onextū: hinc est qd nō
est rectū oio: s; fm modū dictū post ipm in iūctura
genu s; duo focilia tibiē x^o sustū pteꝝ āteriorē in
iūctura illa est os qd vocat patella factū ad mo-
duz patelle vt iūctura sit fortior scā ex ligamentis
ac si p^o modū fuissent ligata: et facile mai^o est in do-
mestico et grossius: q^u illud hz mag^u onus coꝝporis
sustentat: min^o aut et subtili^o est in pte siluestri nō
perueniēs ad iūcturā: q^u scñ est tñ vt sit appodia-
mentū maioris. Post ista duo focilia est os cui ista
p^otinant^u p iūcturā cayb siue canicule noīate ab os-
se illo qd cayb nominat^u: et est os calcanei fabricatū
dep^ossuz et grossuz qd drāgulatū: vt possit bene figi et
figere totū: et pp^o fixationē bonā et vt qñ figit cutim
ad terrā nō atterat. nā cutiz grossa et callosa mul-
ta sub ipso posuit. Postea est nauticula qd est fa-
ctū ad modū nauticule qd drāgulat obliq^u. Postea
est raseta pedis qd p^opositū est ex trib^o ossib^o: non
ex octo sicut raseta man^o: q^u pes nō d^o ita plib^o mo-
rib^o moueri ad aliqd retinēdū vt man^o: s; pp^o fixio-
nez bñt tñ trā: Postea ē pectē qd p^opositum est ex
qñq^u: q^u pollex posit^u est in eadē pte cū alijs: post
hec sunt ossa digitoz q^utuor: decz: q^u q^ulibet eoz digi-
toꝝ hz tria ossa: et pollex hz duo: et tūc erūt ossa pe-
dis: xlvij. Quot at et q^u sūt musculi et chorde mag^u
pōt videri in hoīe exiccato q^u recent^u suspēso: sicut
als dclaraui ad sensuz qñ legi libz d^o iuuam^u mē-
broꝝ tñ: nā scias q^u chorde extendentes digitos pe-
dis oriunt^u a muscul^u q^u sunt in tibia in pte siluestri
s; p^obentes digitos oriunt^u a muscul^u: q^u sunt in plāta
pedis: nā p^o inferior pedis fuit carnosā multū pro-
pterea vt pes mag^u figeret et cut^u ab ossib^o ad terrā
nō alteret: et io in plāta peduz rōnabit^u musculi p^o-
bentes digitos fuerūt locati: s; extendentes digi-
tos nō potuerūt locari i pte superiori: q^u p^o superi-
rior d^o esse ex carnata ne aggrauet pedem. Sinto.

Incipit tractatus Rasis de egritudinibus puerorum et earum cura qui appellatur pratica puerorum.

De sabafati puerorum.

Sabafati accidit pueris et forte accidit in facie et in capite et gnatio eius est propter multitudinem sanguinis et humiditatem cutis et signum eius est vulnera pura ex quibus exit humor qui expanditur in facie et in capite: et cum eis accidit pruritus quare puer plagit vigilare et querere: et incipe in eorum cura corrigendo cibum nutritis: deinde tonda caput pueri cum pilotro: deinde suppone desuper folia attriplicis: quoniam forte curatur per hoc tantum quoniam ista folia sugunt venenum: aut pone desuper istud unguentum. **U**nguentum valens ad sabafati quod accidit in capitibus puerorum. Redi. ceruse litargiri. 3. v. lixiij de cineribus vitii. 3. iij. olei ro. 3. j. cere. 3. 5. li. quassiat cera cum oleo ro. et terantur medicamine: et perficiantur cum vitellis duorum ouorum assis. Deinde ungetur eo caput pueri.

De fauositate puerorum.

Passio quod dicitur fauositas mellis est species sabafati: tunc super vulnera apparet quidam squame et scalpitis cutis cum magno pruritu: et exit ex eis quod est quod mel: et cura eius est ut quotidie tondatur caput et abluatur cum aqua mentastri et maiorane et saturegie: deinde ungetur cum isto unguento. Accipe litargiri ceruse. ana. aure. iij. sulfuris et argenti viui: aureum. j. olei rosati partes duas: aceti partem unam misceantur et perficiantur cum oleo rosato et aceto donec fiat unguentum: et unge cum eo sero et maneat caput ablue cum illa aqua.

De magnitudine capitis puerorum.

Accidit quibusdam pueris quod exeat cum magno capite: post exitum augmentatur ultra mensuram debitam. Et ego vidi puerum cuius caput adeo augmentabatur in longitudine et latitudine quod corpus eius sufferre non poterat et non cessauit augmentari quousque mortuus est puer. **M**agnitudo autem capitis aut erit ex ventositate generata in ossibus capitis: aut ex aggregatione aque incluse in eo quod non inuenit viam exitus: et incipe in cura eius purgando caput nutritis cum yeris magnis et caueat ab omnibus cibis generantibus ventositatem. et superflua grossa: deinde incipias in eius cura cum eis quod mittuntur in naribus pueri: sicut de oleo amigdalorum amararum: aut de oleo anetino aut de ben optimo: aut de aqua maiorane: et si sic sit curatus sufficit. Sin autem pone super caput emplastrum de olibano: sarcacolla serapino gummi amigdalorum: si sanatus fuerit sic sufficit: sin autem accipe alium vel alium abum et pistam cum testa sua donec fiat quasi unguentum. misce cum eo parum olibani et pone super totum caput post rasuram: et permittit aliquot diebus. Ista medicina restringit caput et redire facit ad mensuram debitam: deinde mitte in naribus eius fel lupi vel cerebri et parum mirre vel ambrie et fac hoc in quolibet mense. Paruitas capitis si fuerit naturalis non curatur.

De inflatione ventris puerorum.

Multoties accidit eis cum magnitudine capitis Inflatione ventris: et cura eius est quod accipiat mirram et aloem et crocum et perficiantur cum aqua saralliarum: et pone super caput et si cum inflatione ventris in magnitudine capitis manifestatur crescit corpus. Accipe aniules. 3. v. auellanarum. 3. vij. amigdalorum. et feniculi aurei. j. terantur et exibat ab eis oleum deinde in mitte naribus usque ad. 3. iij. et unge caput et mitte in naribus: et da bibere nutriti cum lasca.

De sternutatione puerorum.

Sternutatio accidit in cerebro vel in tunica eius:

et signum eius est quod oculi profundantur et superuenit febris. Cura eius est quod ponas super cerebrum folia portulacae: aut rasuram cucurbitae cum oleo ro. et farina ordei: aut unge cum apertum vitello oui et oleo.

De vigiliis puerorum.

Cligille accidit pueris in prima etate ex corruptione lactis. Et cura eius est ut mittatur in naribus pueri oleum violatum cum croco aut oleum anetinum cum succo latuce: et unge caput et stomachum cum istis oleis et sit sollicitudo nostra in correctione lactis. et da sugere syrupum papaueris et unge tempora et frontem cum oleo opij et croco.

De epilepsia puerorum.

Epilepsia accidit duobus modis: aut nascitur puer cum ea: et ex malitia complexionis naturalis in cerebro humide aut frigide. Aliut erit eis accidentalis. Et si naturalis est quoniam cum ea nascitur. Signum accidentalis est quoniam aduenit post partum. Et cura naturalis est obfuitatio diente: quoniam cum mutauerit etatem sanabitur ab ea: si autem non fuerit sanus sectabitur eum usque ad mortem. Et curatio accidentalis est sollicitudo circa corruptionem lactis: ut caput et corpus nutritis purgetur: caueat ab omnibus cibis generantibus flegma: et non lactetur puer nisi in ea quantitate quod possit digerere vel minus: et mitte in naribus medicinas calidas: et odor et assam fetidam et rutam et unge cum oleis calidis et suspende peoniam in collo eius: et liga ad collum eius lapidem smaragdum: et non accidet eis epilepsia et si durauerit per hoc a tiriaca magna.

De quadam passione quod dicitur mater puerorum.

De quadam passione que dicitur mater puerorum: hec infirmitas accidit pueris in prima etate frequenter: et signum eius est plactus magnus multus timor in somno: et vigilia augmentatur calor: et ex ore eius egreditur odor fetidus: et causa huius egritudinis est acceptio lactis plus quam possit digerere. Et cura eius est in correctione lactis: et datur dyapyliris diaphanica quotidie sexta pars dragme. cum lacte: et specipua medicina est in hoc tiriaca magna.

De sanie aurium puerorum.

De humiditate fluente in pueris ab auriculis: hec infirmitas accidit pueris in prima etate ex humiditate cerebri. Et cura eius est ut mittatur in eis auriculis licinium bombacinum antiquum et cum fuerit humore plenum extrahatur et aliud intus mittatur: et forte cum hoc intus curatur. sin autem accipe alumen et dissolue cum vino et intinge in licinio et intromitte: humor. n. desiccabitur. aut accipe crocum et mirum committere cum aqua et aceto et intromitte.

De veneno fluente de aure.

De veneno: et hoc accidit pueris ex vesica vel plaga accidentem in auricula. sufficit eis intromittere mel bullitum cum aqua: purgat. n. venenum ab auriculis: aut accipe folia mirte aut galle et distemperetur cum aceto et intromittet.

De morbis oculorum in pueris.

De egritudinibus puerorum in oculis: accidit pueris in volis diuersitas egritudinum. et ex eis est Inflation et clausura palpebrarum: et forte hoc accidit ex medicinis stipticis: quos mulieres ponunt super capita puerorum: sicut alkanna et hmoi: quoniam superflua capitis puerunt ad oculos: et forte accidit eis ex fluxu materie calide et frigide. Et cura huius egritudinis est quoniam rubor est in facie et calor in fronte: ut accipias succum menthe et foliorum rosarum ana. 3. j. croci mirre ana. 3. j. et 7. 5. pulveriza et perfice cum aqua saralliarum et lacte mulierum et suppone oculis et fronti quotidie renouando quod

vsq; apianē oculi z ē exptus i pueris. **¶** Si autē in oculis nō fuerit rubedo nec calor in frōte. Accipe murraz z crocuz z aloez z folia rosaz pñice cū bono vino z sup oculos pone. **¶** Et pbarius ad hoc qđ sepe pbaui mitte in naribus paz ambze z distēpera cū lacte mulieris. Si autē accidat eis aliay egri tudinū aliq; sicut scabies z albedo z hmoi curenē cū medicis qđ dicunt in etatib⁹ adolescentiū z iuue nū z alioy: s; tñ cū leniozib⁹. **¶** De obligate vis⁹. **¶** De egritudine qñ qđ oblique aspiciat vel vider z hoc aut ē naturale aut accidit post partum: z cura eius ē qđ apponat de nocte candela ex pte pñia visui obliqui: z cū receptus vel erectus fuerit i lecto suspendat culre pulchze diuersoy colorū sup lectū quousq; corrigat visus. **¶** De morbis dentium. **¶** De egritudinibus qđ accidunt pueris circa natiuitate dentiu dixit Sal. qñ dentes nascunt cito natiuitas eoy leuior ē: z minozis doloris: s; dētes erūt obiliores: z cū tardauerit eoy natiuitas erit dolor fortis: s; dētes erūt fortiores: z duri: z si origo fuerit in vere nascunt statiz z sine dolore: z ecduerso: si fuerit in hyeme: s; gingiue nō inflabunt: z si fuerit in estate accidit eis puus dolor: z accidit eis in hoc tpe plurimū apostema in maxillis z gingiuis z glandule z pruritus in auriculis: z flux⁹ sanguinis z veneniz forte accidit qbusdaz febris z flux⁹ ventris: aut pñipatio. **¶** Et cura eius est qñ inflat gingiua vt scalpat paz cū digito z postea cū oleo vel pinguedine gallie aut cerebro leporis: aut lacte canis: z pone sup caput pueri aquā in qđ decocta fuerit camomilla z anetū: z sup eius mandibulas pone emplastra dissoluta: z si dolor augmentef post hoc apud originē. Accipe alcannā butir⁹ oleū z laurinū misce totū: z pone sup locuz. **¶** Vel accipe butirū vacce z medullā cruris z pone desup z si apparuerint capita dentiu pone sup caput totum z collūz lanā mundā z spargat quotidie sup lanāz aqua tepida. **¶** Et si acciderit fluxus ventris medicabit⁹ eoz eis que dicemus.

¶ De pustulis que accidunt in ore pueroy. **¶** Vesice que accidunt in orib⁹ pueroy in prima etate qñq; accidunt ex corruptione lactis: vel ex acuminē illa vesicatio aut erit nimis acuta aut paz. **¶** Signū acute ē rubedo z fortitudo doloris z fluxus saliuē z signū paz acute ē vt vesice declinent ad albedinē z sint parui doloris z humor qđ os descendit sit multus. **¶** Cura vesicay acutarū est corrigere lac nutricis cū cibo frigido z humido. de inde masticare parū de lenticulis z ponat mulier i ore pueri: aut accipe parū midī z distēpera cū aq rosaz z suppone z pone in ore pueri aquā macianoy vel maloy granatoy. **¶** Et si acuta fuerit z nimis colerica misce cū istis succū lactuce aut portulace aut yuecanine. **¶** Et cura vesicay parui acuminis z declinatīs ad albedinē est vt accipias: mirre croci. ana. 3. j. zuchari duplū pulueriza z mittant i os z si plage fuerit nigre aut putride medicabimur cū medicinis dictis i etatibus iuuenum.

¶ De vomitu in pueris.

¶ Accidit pueris i prima etate vomit⁹ multis causis: aut ppter lactis multitudinē magis qđ digerere possit: aut ppter corruptionē eius: z maxie si puer fuerit humidi z debilis stomachi. **¶** Et cura est vt vetes multitudinē lactis: z post pñidera in vomitu

tu si sentit odor acetosus z fuerint in eo humores al. Accipe olibani sextā partē. 3. j. z rute sicce tertiā partē. 3. j. pulueriza z misce cū siru. rosaz: z da puero: aut accipiat mater paz cimini z sumach z mastice: z ponat in ore pueri. **¶** Aut detur puero sirupus maloy granatoy cū menta. **¶** Aut qđ sepe pbaui: accipe ligni aloes z masticiis. 3. j. galle sextā partē. 3. j. Molle totū z pñice cū sirupo rosaz z modico algaliē z da puero anteq; sugat lac. z pone sup stomachū hoc emplastrū mastix: aloe acatia gal. la olibanū panis vsti. ana. pñice cū oleo rosato: et sirupo rosarū: z pone sup stomachū: est. n. exptus ad vomitū z saluā puerorū. **¶** Et si i vomitu nō fuerit odor acetosus s; acutus z calor declinet paz ad acumen: vel color ad palorē: ppina puero parū de rob agreste vel citoniorū vel coctanorūz aut de istis. **¶** Troscisci valentes ad vomitūz puerorū. **¶** Recipe rosaz spodiū. ana. 3. iij. galle. 3. ij. seminis portulace: seminis lapatii. ana. 3. j. z. s. carabe pñiciant cū aq agreste vel cū aq maloy granatorū ad pondus. 3. j. z da trosciscū vnūz puero cū sirupo rosaz: z pone sup stomachū istud emplastrū qđ valet vomitui z fluxui ventris q accidunt pueris. **¶** Recipe farine ordeī: rubi viridis: corticis mali granati. ana. pñice cū aq rosaz z pone sup stomachū.

¶ De fluxu ventris puerorum.

¶ Multotiens accidit fluxus ventris pueris ppter nationes dentiu: sicut dixim⁹. Vel ppter frig⁹ cūz ligat⁹ puer. Aut ppter corruptionēz lactis ex colera aut flegmate. **¶** Et signūz colere est qđ iueniat i egestione pueri citrinitas z acumen: z qđ exit sine morra. **¶** Et signūz frigoris z flegmatis est albedo in egestione z torio in ventre cūz egerit z nisi flegma sit viscosū exit statiz. **¶** Et cura ē vt de pueri sirupus rosaz vl macianoy vel mali granati cūz mēta z accipiat de spodio in aq posito ad bibendūz: aut accipiat fermētūz dissolutūz i aq z cola z mitte sextaz ptes. 3. spodiū z tres partes. 3. galle z. 3. s. croci z da bibere. **¶** Aliū accipe semen lapacy z violay z misce cūz vitello oui assati z da puero. **¶** Aut da ex hac medicia expta. **¶** Reci. semis lapacy: arilli vsti vuyaz passarūz. ana. 3. iij. glandiūz semis papaue ris albi. ana. 3. ij. croci aurea qttuoz pulueriza z de ex eo puero cūz rob de citongis vel sirupo rosaz: z pone sup stomachūz emplastra stiptica: z accipe aq decoctiōis sumach: z malassa cūz farina ordeī vel farina milij superpone: si cessauerit flux⁹ bonū ē. Sin autē accipe acatie ceruse. añ. 3. i. opij. viij. partē. 3. z forma liciniūz z superpone z statim cessabit flux⁹. **¶** Si autē fuerit ex frigore vel flegmate de pueri octaua pars. 3. galle cūz succo coctanoy vel deī pars q̄ta. 3. olibani. Emplastrūz pñipās ventris valz stomachis pueroy. Accipe crocuz: mirrā ceraz cōñice cūz vino z pone desuper.

¶ De constipatione puerorum.

¶ Multotiens accidit pueris cōstipatio. Et cura eius est vt des nutrici paz cucumeris asinini: dein de alia die lactet puez: aut accipe lacteridis terre et fac cerotūz: z pone desuper aut accipe mediā partēz stercois foricini z terre cūz pñguedie renus yrici z fac liciniūz parum z suppone: z si acciderit puero duoz mensiūz vt pñipet ei⁹ nā z alterefi calore z nō pōt vomere. Accipe sarcacolle fūā ptes. 3. vni⁹ z da cūz lacte matr⁹ ei⁹: aut fac clister cūz oleo viol.

De tussi puerorum.

Tussis accidit pueris in p̄ma etate. Lingue aut̄ eorū nō p̄nt claudere epiglottū: et sic ifrigidat̄ pect⁹ et ei⁹ inf̄ra: et cura ei⁹ ē cū eis q̄ sunt sicut cib⁹ et medicina. Isti. n. nō debēt curari cū forti v̄l vehemēti medicina. S̄ accipe amīgdalas dulces pista et cōfice cū aq̄ feniculi et coque cū ea: et ppina puero sero et mane. Aut accipe aquā feniculi et misce cū lacte et da puero. Et si cū tussi fuerit aspitas et siccitas. accipe semē citoniorū et resolue cū aq̄ calida et ex̄he viscositatē. coq̄ sup ignē cū penidys et oleo amig. et da. et si fuerit calor misce succū malignanati dulcis. **M**edicamē ad tussim puerorū cū calore. Reci. papaueris albi: dragaganti. añ. 3. s. seīs cucumeris 3. i. Cōfice cū aq̄ decoctiōis. sebestē. Aliud ad tussim puerorū. Reci. passas sine arillis fac bulire vase ferreo: s̄ caue ne adurant̄ pista et misce tātūdem penidiōrū: et da puero sero et mane ad modū nucis. Aliud ad tussim frigidā. Accipe mirrā et misce cū melle et cū oleo amig. et ppina. Et si pect⁹ pueri fuerit plectorici accipe dragatū galbanū: añ mirtē i vitello oui assati: et da. Et si acciderit stricture anhelit⁹ accipe se. lini pista cū melle: aut accipe se. bōbactis et cōfice cū vitello oui assati. Et si cū tussis fuerit fluxus vētris da sirupū mirti cū lacte coctū Aut coque dactilos cū farcacib⁹ et lacte et ppina.

De puritu et vesicis puerorū.

Puritus et vesice accidunt pueris i coris ex acuitate v̄neret qñq̄ accidunt diuersa vulnera in corpore puerorū ex corruptione lactis in stomacho pueri vel in se. Ex illis aut̄ vesicis qdā sunt albe qdāz rubee: qdā nigre: et qdā vehemētis doloris: et qdāz puri: Et si nigre fuerit cū febre significant mortē. Et cura gñalis est vt p̄mo incipiat in correctiōe lactis et ponat puer in caldario pleno aq̄ calida ad attrahendū supflua ab interiorib⁹ ad exteriora ad supficiē cutis vel corporis: et da puero medicinas ad expellendū supflua ab interiorib⁹ ad exteriora ad supficiē cutis sicut sunt corporis sicut est decoctio dactilorū aut ficū cū aqua feniculi. Et cū itellexeris qd oēs supfluitates sunt extra. balnea quotidie i aq̄ decoctiōnis: foliorū rosarū et mirti et huiusmodi. Cū aut̄ puer exierit ab aq̄ vngat oleo rosato. et si vulnera fuerint sica cū oleo violato. Si humida ex multitudie veneni pone desup cerusam mixtā cū cera et oleo rosato. Et si affuerit puritus et puer trāsierit sex vel septē mēses ip̄m balnea p̄mo in aq̄ decoctiōis violarū siccat et oz. excorticat: malua uisci: fenugreci: feniculi: cucurbite: sed nō vngues aliq̄ vngueto. et da nutriti succū sumiterre: mirabolanos: citri. et abstineat nutritrix ab oib⁹ dulcib⁹ et salis adurētib⁹ sanguinē: et si acciderit i crure aliq̄ vlnera post balneū supasperge puluere amidi spodiū alkanne: rosarū mirre: et farinā ordei.

De lumbricis puerorū.

Nō opz nos dare medicinas fortes pueris ad potandū s̄ hāc passiōe: sed eligemus ex eis q̄ apponunt̄ extra. **M**edicamē ex̄bens lūbricos ab intestinis. Accipe ciminū pista cum felle tauri recēt et pone ad vmblicum. Aliud. accipe lupinos asininos. 3. j. alipia di: et bacarū lauri. añ p̄ficiant̄ cū felle tauri recēt. et da q̄tidie ad bibēdū. 3. j. aut aquā sebestē: aut oleū oliue: aut comedat amīgdalas dul.

De inflatiōe vel eminetia vmblici puerorū.

Eminetia vmblici accidit pueris qñ multū plā-

gunt: vel vociferāt: aut ex tussi magna: aut forte accidit ex casu vel p̄cussioe. Et cura est vt accipias lupios et petias pāni linei: et pbure et p̄fice cū vino et iterpone stupas et pone sup vmblicū: et si fuerit flexibilis cauterizet in circuitu vmblici: et non in loco flexibili propter tenuitatē cutis et si indigueris fortioribus medicinis pone medicinas q̄s dicem⁹ in caplo crepature.

De crepatura puerorū.

Jam dixim⁹ supius q̄t modis accidit crepatura: sed mō nō idigem⁹ nisi medicinis pueris necessarijs. **E**mplm valēs crepature puerorū. Reci. aluminis aureos. xv. galle aureos. ij. terant et p̄ficiant̄ cū vino q̄usq̄ inspillet. et pone sup locū et suppone spōgiā intinctā i aceto mixto cū aq̄ et cū ceciderit aliud reponat. Aliud leue ponat sup pānū aliq̄ glutinū de corijs: et sup locū ponat: et p̄mitte quousq̄ adhereat. et si ceciderit aliud reponatur.

De lapide in vesicis puerorū.

Lapis q̄ generat i vesicis puerorū facit strāguri am: dolorē magnū et tenuitatē v̄neret et puritū i virga: et forte erit virga semp erecta. Et cura eius est in balneis vt balnees puer quotidie i aq̄ calida: et da ex̄ista medicina. **M**edicamē puocās v̄nā: et frāgens lapidē. Reci. olibani yncheni ana cōfice cū melle: et detur ad modū anellane mane et sero. **M**edicamē exptum ad grauitatē lapidis et difficultatem v̄nē. Accipe septē nuces virides et pista cū coriice exteriori: et accipe manipulū vnū porrorū nō loto: et ex̄he succū ex vitro q̄ i vase vitreo et cola et da puero oī mane septē dieb⁹: et qñ ibit dormitū vnge virgā et testiculos oleo antiquo vel oleo de ben.

De relaxatione puerorū.

Relaxatio accidit pueris: vel in vno mēbro vel toto corpore: et phibet ip̄m ab ambulatione et motu: et puenit ppter viscosum humorē relaxantē nervos. Et cura eius est si nō fuerit naturalis vt des nutriti sirup⁹ factum de medicinis subtilib⁹. Et sit eius cibus siccus: sicut res assate et non comedat lac nec carnes duras: ouinas: nec pisces: nec vinūz limphatum: et anteq̄ lactetur puer ponatur in balneo: et inunge eius iuncturas cum oleo de costo vel de castoreo: et vtatur quotidie isto electuario.

Electuariū quod cōposuit Galienus cuidaz puerorū q̄ pariebatur spasmū in toto corpore. **R**ecipe mentastri rosa. cinamomi. masticijs. fu. men. amos. dozonidi. zedoarie. gariofilorum ana. aureum ynum. sandalorū ligni aloes. ana. 3. j. musci. 3. s. vnge omnes medinos balsamorū: et confice cum melle: et da quotidie quartam partem. 3. j. vel. 5. et si spasmus fuerit in toto corpore: pone super spondiles dorsī emplastrum euforbij. quod sic fit. Accipe cere. 3. j. euforbij. 3. j. olei quod sufficit et c.

ExPLICIT fasciculus medicine in quo continent⁹ v3.

Primo iudicia v̄nārum cum suis accidentijs.

Secundo tractatus de flobotomia.

Tertio de cyrogia.

Quarto de matrice mulierū et impregnatione.

Quinto concilia vtilissima contra epidimiam.

Sexto de anothomia mūdini toti⁹ corporis humāi.

Septimo de egritudinibus puerorum.

Impressum Venetijs per Joannem et Gregoriū de Gregorijs fratres. Anno domini. M. cccc. die xxvij. Martij.

II/88

10 ganz. Holz.

34 n.n. Bl.

Ohne Lage e² + e⁵

Shown in *Dream Anatomies Exhibition*
At 5-10 footcandles (no UV) for 10 months
Pages 6+7

